

mellari media parte auriculato-dilatato, auriculo rotundato-rectangulo.

Alt. $14\frac{1}{2}$ —15, diam. min. 12, maj. $15\frac{1}{2}$ mm; alt. apert. c. perist. $10\frac{3}{4}$ —11, lat. apert. $10\frac{1}{2}$ mm.

Fundort: Halmahera, 2 todt gesammelte Stücke.

Bemerkungen. Diese merkwürdige Schnecke nähert sich zwar dem *C. vitreum* Less. in der Form, Skulptur und einfach weissen Farbe, unterscheidet sich aber scharf durch die dicke Schale, die weniger gewölbten Umgänge und den am ganzen Aussenrande 2 mm weit ausgebreiteten Mundsaum, sowie durch die eigenthümlichen, deutlichen, radialen Einkerbungen auf dessen Rückseite und den viel breiter und schärfer nach links gezogenen Columellarwinkel. Von dem ebenfalls verwandten *L. halmahericum* trennt es sich durch die weisse Farbe, dicke Schale, das Fehlen der Spiralkielchen, namentlich aber durch den trompetenförmig aufsteigenden Oberrand der Mündung und die Kerben auf der Rückseite des Peristoms.

D i a g n o s e n n e u e r A r t e n.

Von

H. Rolle.

1. *Ennea (Uniplicaria) Kendigiana* n.

Testa parva, rimata, cylindrica apice obtusulo, hyalina, nitida, vitrea, striis obliquis ad suturam et pone aperaturam et vitro fortiore tantum conspicuis sculpta. Anfractus 6, superi lentissime crescentes, convexiusculi, inferi plani, sutura impressa profunda discreti, subaequales, ultimus penultimo haud latior et vix altior, basi levissime compressus, antice leviter arcuatim ascendens. Apertura ovata, supra oblique truncata, plica unica in pariete aperturali armata; peristoma expansum, margine externo strictiusculo, columellari leviter arcuato.

Alt. 3,5, diam. 1,5 mm.

Hab. Njaning Senegambiae, leg. cl. H. de Maltzan.

Var. *goreensis* n., differt testa paululum majore, lutescente, anfr. 7 nec 6, striis ad suturas distinctioribus.

Hab. Gorée Senegambiae.

Meinem Freunde Rev. A. B. Kendig in Brooklyn gewidmet.

2. *Pisania Scholvieni* n.

Testa fusiformis, solida, vix nitens, fuscescens vel nigro-fusca, in medio anfractus ultimi obsolete albofasciata; spira conico-turrita apice acuto, albido, plerumque fracto. Anfractus 8 leniter crescentes, sutura undulata impressa discreti, superi convexusculi, transversim ruditer plicati, liris spiralibus aequalibus interstitia aequantibus, ad plicas submoniliferis sculpti, interstitiis sub lente lineis incrementi striisque spiralibus reticulatis; ultimus multo major, interdum distinete angulatus, basi attenuatus lirisque distantioribus sculptus, lira minore intercedente; vestigia epidermidis in interstitiis plicarum tantum conservata. Apertura anguste ovata, basi in canalem angustata, intus carneo-violacea; labrum externum acutum, intus mox labro dentato incrassatum dentibus 6—8, superis 2 majoribus, columella callo tenui translucido armata, ad introitum canalis subuplicata.

Alt. ad 17, diam. $8\frac{1}{2}$ (plerumque alt. 15, diam. 7) mm.

Hab. Njaning Senegambiae leg. cl. de Maltzan.

Herrn Scholvien in Hamburg hochachtungsvoll dedicirt.

3. *Turritella Maltzani* n.

Testa turrita, medioeris, pallide rufescens, strigis fulguratis rufo-fuscis undique ornata. Anfractus numerosi, per-convexi, superi distinete biangulati, liris 2 spiralibus majoribus cariniformibus, interstitio excavato, cincti,

inferi liris minus prominentibus interstitio plano, omnes confertim et regulariter spiraliter lineati lineisque incrementi minus distinctis impressis signati. Anfractus ultimus penultimo vix major basi leviter planatus.

Apertura rotundata (peristome frasto).

Alt. 20, diam. 7,5 mm.

Hab. Gorée Senegambiae, leg. cl. de Maltzan.

In dankbarer Erinnerung an den um die Wissenschaft verdienten verstorbenen Freiherrn H. von Maltzan.

4. *Volutularpa Salmiana* n.

Testa inflato-ovato, quoad genus solidula, parum translucens, striata, in anfractibus superis spiraliter distincte lirata, in ultimo subtilissime et subundulatim striatula, spadiceo-rufa, in anfractus ultimi parte superiore interdum pulchre albo fulgurata, strigis suturioribus arcuatis sed haud fulguratis praesertim versus aperturam ornata; epidermidis tenuis vestigia aperturam versus tantum conservata. Anfractus 5 rapide crescentes, primi apicem planum intortum formantes, ultimus permagnus, inflatus, subtus vix contractus, periomphalo distincto ruditer ruguloso. Apertura permagna, irregulariter ovata, supra vix acuminata, basi emarginata, intus fuscescens albolumbata; labrum externum simplex, levissime albolumbiatum, bene arcuatum, infra supra columellae apicem productum; columella arcuata, medio leviter excisa, callo tenuissimo albido supra late expanso, infra distinctiore et subsoluto induita.

Alt. 31, diam. max. 23, alt. apert. 23 mm.

Hab. Japan. Duo specimina vidi.

Diffr. ab omnibus speciebus hucusque notis testa solidiore, sculptura spirali distincta, strigis albis fulguratis.

Sr. Durchlaucht dem Fürsten Leopold zu Salm-Salm in Ehrerbietung gewidmet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Rolle Franz Hermann

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten. 50-52](#)