© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

wir den Ausgangspunkt dieser Nacktschnecken fortwährend bei marinen Formen suchen, die eine Larvenschale besitzen, die sie dann abwerfen, um allerlei merkwürdige Umwandlungen durchzumachen? Ja noch mehr, das wir die Pleurommatophoren, v. Ihering's Mikronoten, von ebensolchen abweichenden Gestalten herleiten? Klingt das nicht geradezu abenteuerlich gegenüber allen unseren sonstigen onto- und phylogenetischen Theorien? Liegt es nicht viel näher, die Pleurommatophoren in direkter Linie von einer Urform abzuleiten, von der vielmehr die marinen Opisthobranchien einen weit aberranten Seitenzweig darstellen? Freilich müssen wir dann von e i n e r vorgefassten Meinung ablassen, von der nämlich, dass alle Landthiere von marinen abstammen; und da bin ich bei der Idee wieder angelangt, die ich kürzlich für die gesammte organische Schöpfung zu vertreten gesucht habe. Wenn die Stylommatophoren des Landes in ihren Schalen den embryonalen Habitus der Urform gewahrt haben, dann drängt es uns doch ordentlich, diese Urform auf dem Lande zu suchen oder höchstens am Strande, noch dazu, wo jeder palaeontologische Anhalt fehlt. (Selbstverständlich braucht dieselbe Schlussfolge nicht auch für die Operculaten oder Neurobranchien zu gelten).

Vielleicht tragen auch diese Zeilen, durch Herrn von Ihering's Einwände hervorgerufen, zu künftiger Klärung ein wenig bei.

L e i p z i g, 4. VI. 92.

L i t e r a t u r b e r i c h t.

Martens, Ed. von, neue Arten aus Uganda und dem Victoria Nyanza. — In Sitz.-Ber. Ges. nat. F. Berlin 1892. No. 2.

Neu Helix bellula, obenher mit Spiralleisten, sonst wie eine Pupa aussehend, Ennea Stuhlmanni, Limnaea nyansae, Physa trigona, Vivipara phthinotropis, V. trochlearis, V. costulata.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

The Journal of Conchology. Vol VII. No. 1.

p. 1. *Watson, Rev. R. Boog*, the Relation of the Land and Freshwater Mollusca of the Madeiran Islands to those known elsewhere.

p. 25. *Tomlin, J. R. Brockton*, Notes on the Marine Mollusca of the North Wales Coast with complete lists of the recorded Nudibranchs and Cephalopods.

p. 31. *Cockerell, T. D. A.*, Arion minimus = intermedius Norm.

p. 32. *Horsley, Rev. J. W.*, List of Mollusca found at Meiringen, Switzerland.

Journal de Conchyliologie. 1891. No. 4.

p. 305. *Fischer, P.*, sur la Faune conchyliologique de l'île du Lord Howe (Ocean pacifique). 24 Landarten, davon 3 zweifelhaft, alle, mit Ausnahme der Diplommatina chordata, die Pfeiffer von Neuseeland nennt, eigenthümlich; — und 76 marine, davon Purpura Smithii eigenthümlich. Der Artikel stützt sich auf eine mir noch nicht zugegangene Arbeit von Hedley.

p. 314. *Dall, W. H.*, Contributions à la Faune malacologique terrestre des îles Galapagos.

p. 216. *Morlet, L.*, Description d'un genre nouveau appartenant à la Famille des Helicinidae et provenant du Laos (Indo-Chine). — Calybium Massiei n. gen. et sp. mit Falten auf der Parietalwand.

p. 317. *Mayer-Eymar, C.*, Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires superieurs (suite). — Abgebildet sind Drillia Buffoni, Dr. Torcapeli, Genota austro-gallica, Clavatula evoluta, Mangilia consobrina, Conus Basteroti, C. Benoisti, C. Cazioti, C. clanculus, C. Falloti C. gallicus, C. granulato-cinctus, C. Larraldei, C. peregrinus, C. praecursor, C. Saucatensis, C. Vasseuri, Mitra Basteroti, M. cochlearella, M. facilis, M. multistriata, M. paulensis, M. praenigra, M. sallomacensis.

Hedley, C., the Land and Freshwater Shells of Lord Howe Island. — In Rec. Austral. Museum. I. 1891. p. 134—144, pl. 21. 22. — Non vidi.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1891. Part. II.

p. 310. *Pilsbry, Henry A.*, Land and Freshwater Mollusks collected in Yucatan and Mexico. With pl. XIV & XV.

Die neuen Arten sind zum Theil schon im Nautilus kurz beschrieben. Abgebildet werden: Streptostyla (Oryzosoma) Tabiensis t. 15 fig. 6. 7, Yucatan; — Patula intonsa t. 15 fig. 1—3; — Cylindrella speluncae Pfr. t. 15 fig. 15; nebst var. dubia n. fig. 14; — Cyl. Bourguignatiana Aucey t. 15 fig. 3; — Ortha-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

licus melanocheilus var. floridensis p. 517, mit Holzschnitt, auch von Florida; — Carychium exiguum var. mexicanum t. 14 fig. 7—9; var. jamaicensis t. 14 fig. 15. 16; — Physa oscalans var. patzcuarensis t. 15 fig 5; — Potamopyrgus Bakeri t. 15 fig. 9—11; — Pyrgulopsis patzcuarensis t. 15 fig. 8; — Cochliopa Tryomana t. 15 fig. 12.

p. 406. *Pilsbry, H. A.*, Mollusca from Nantucket, Mass.

Ihering, H. von, über die Beziehungen der chilenischen und südbrasilianischen Süsswasserfauna. In Verh. wissenschaftl. Ver. Santiago 1891.

Locard, A., l'influence des milieux sur le developpement des Mollusques. Etudes comparatives des diverses Faunes malacologiques de France, Mollusques terrestres, d'eau douces et marines. Lyon 1892. gr. 8°. 140 pg.

Monterosato, Marchese di, Molluschi terrestri della Isole adjacenti alla Sicilia. Estratto dal Vol. II Ser. III degli Atti R. Acad. Scienze. gr. 4°. 33 S.

Es werden sehr zahlreiche neue Arten und Untergattungen aufgestellt, aber die ersteren nach der Gewohnheit des sicilianischen Forschers nur kurz durch Vergleichung mit verwandten Arten charakterisirt. Die enggewundenen Hyalinen werden in drei Gruppen geschieden: Hyalocornea, Hyalofulgida und Hyalofusca. Für die sicilianische Leucochroa wird der Name L. sicula vorgeschlagen. Von Iberus werden als neu beschrieben: Florioi von Favignana, — inglorius von ebenda und Maritimo, — albinosus von Levanzo (= provincialis pars Ben. Ill. Sicul. t. 2 fig. 14); — indistinctus von Ustica; — Gregorioi von Caccamo; — commodus, die von den Toskanern für muralis gehaltene Schnecke von Florenz; — latebrosus von Caccamo; — consertus (= Alleryi Ad. mss.) von Sciacca; — tumefactus von Livona bei Girgenti; — agrigentinus Ad. mss. von Girgenti; — impervius aus den Madonien; — melanosus von Sciacca; — spoliatus von S. Onofrio an der Nordküste; — nebulosus von Mte. Nadorre; — floribundus von ebenda; — ferner von Xerophilen: Hel. edulis, eine weit verbreitete und seither falsch gedeutete Xerophile; — sanguinea von Favignana; — rusticana von Lampedusa; — fraudulenta von ebenda; — falsa von Levanzo; — maretima von Maretimo und Favignana; — liparota von Lipari; — exacta von Calatafimi; — speciosa von Salaparuta. — In der Untergattung Xerophila werden an 40 neue Gruppen aufgestellt: Xerofalsa, Typus Hel. idia; — Xerosecta, Typus Hel. explanata; Xeroplana, Typus Hel. Doumeti; — Xeroamanda, Typus Hel. amanda; — Xeromoesta, Typus Hel. moesta; — Xeroclausa, Typus Hel. Meda; — Xerolena, Typus Hel. Hamilcaris; —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Xerotringa, Typus Hel. tringa; — Xeroampulla, Typus Hel. Aradasii; — Xerofusca, Typus Hel. luctuosa; — Xerovaga, Typus Hel. caperata; — Xeroalbina, Typus Hel. candidula; — Xeromicra, Typus Hel. apicina; — Xerotricha, Typus Hel. conspurcata; — Xerocodia, Typus Hel. codia; — Xeroplexa, Typus Hel. setubalensis; — Xerotropis, Typus Hel. Gargottae; — Xerocrassa, Typus Hel. Seetzeni; — Xerolauta, Typus Hel. lauta; — Xerolincta, Typus Hel. arenarum; — Xerolaeta, Typus Hel. aegusae; — Xerovaria, Typus Hel. tergestina; — Xerambigua, Typus Hel. Dantei; — Xerolutea, Typus Hel. luteata; — Xeromagna, Tyus Hel. cespitum; — Xerolenta, Typus Hel. obvia; — Xerolaxa, Typus Hel. ericetorum; — Xerofriga, Typus Hel. nubigena; — Xerogyra, Typus Hel. Spadae; — Xeropicta, Typus Hel. Krynickii; — Xerobulla, Typus Hel. Bollenensis; — Xeromunda, Typus Hel turbinata; — Xerocauta, Typus Hel. cretica; — Xerovera, Typus Hel. subrostrata und oranensis; — Xerolissa, Typus Hel. acompsia; — Xerolivia = Turricula Beck nec Klein; — Xeronexa, Typus Hel. Cumia; — Xerocochlea, Typus Hel. Caroni; — Xeroptyca, Typus Hel. ptychodia; — Xeroacuta = Cochlicella Risso; — Ferner wird als neu beschrieben Mastus Lopadusae von Lampedusa; — Claus. familiaris nom nov. für die palermitaner bidens; — (Lopadusaria) nodulosa von Isoletta di Lampione bei Lampedusa. — In einem Nachtrag wird der Name Iberus auf Helix Gualtieriana beschränkt und für die anderen Arten der Name Transiberus vorgeschlagen.

Anzeige.

Marine Shells of South Africa

by **G. B. Sowerby,** F. L. S., F. Z. S.

A Catalogue of all the known species, with References to Figures in various Works, Descriptions of New Species, and Figures of such as are new, little known, or hitherto unfigured. Imperial 8. vo. cloth, price 12 Marck nett.

G. B. Sowerby invites correspondences for the sale, purchase, or exchange of Shells. Specimens sent on approval.

Address **121 Fulham Road**
London S.W.

Eingegangene Zahlungen.

Möllendorff, Manila Mk. 6.—; Brüller, Lindau 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Literaturbericht 149-152