

gekehrt, praktizirte er zuerst in Jenaz, dann in Davos, endlich in Zizers. Auf seinen oft weiten und mühsamen Gängen in die zerstreut liegenden Weiler beschäftigte er sich lebhaft mit dem Studium der Natur, speziell mit der Erforschung der Molluskenfauna. Die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungen hat er niedergelegt in seiner Schrift „Die Mollusken Graubündens“, Chur 1885, zu welcher 1890 ein Nachtrag erschien: „Beiträge zur Molluskenfauna Graubündens.“ Seine werthvollen Sammlungen werden wahrscheinlich von der Regierung des Kantons angekauft und dem Museum in Chur einverleibt werden.

Literaturbericht.

Smith, Edgar A., Descriptions of new Species of Shells from Mauritius and California. In Ann. Mag. N. H March 1892.

p. 256. (Pecten crouchi von Mauritius, Mitra fultoni von Nieder-Californien, mit Holzschnitten).

Smith, Edgar A., Descriptions of new Species of Shells from New South Wales, New Guinea, the Caroline and Solomon Islands. — In Pr. Zool. Soc. London 1891.

p. 487. pl. 40.

(Conus innotabilis t. 40 fig. 1, N. S. Wales; — Mitromorpha brazieri Port Jackson, fig. 2; — Littorina acutispira fig. 3, ibid; — L. infans fig. 4, ibid; — Papuina agnocheilus fig. 5, Douglas River, Neu Guinea; — Placostylus guppyi fig. 6, Salomonen; — Pl. calus fig. 7, Salomonen; — Pupina brenchleyi fig. 8, Carolinen; — Omphalotropis carolinensis fig. 9, Carolinen; — Donax brazieri fig. 10, N. S. Wales).

Westerlund, Dr. C. Ag., Spicilegium malacologicum. Neue Binnenconchylien in der paläarktischen Region. — Aus Verh. Zool. bot. Ges. Wien 1892. p. 25—48

Neu Hyalinia upsalensis aus dem botanischen Garten von Upsala; — H. bellis aus Sicilien; — Patula Chaperi aus dem Wadtland, Schweiz; — Xerophila patriarcharum von Hebron; —

X. clausella von Sevilla; — *X. bougzoulensis* Bgt. mss. Algerien; *X. batuensis* Poll. mss. Batua in Algerien (ob Batna?); — *X. marconi* Bgt. mss. Aumale, abgeb. Iconogr. 1291; — *X. promissa*, Sevilla; — *X. pinguis*, Alexandria; — *X. mastorella* Pech. mss., Sicilien; — *X. modestissima* Poll., Sardinien; — *X. neptuni* Poll. mss. Rom; — *X. euaxes*, Gibraltar; — *X. poichila*, Point Pescade bei Algier; — *X. ambla*, Sevilla; — *X. lampra*, Galvay, Irland; — *X. mescensis*, Egypten; — *Pomatia beilanica*, Syrien; — *Napaeus djurdjurenensis*, Djurdjura; — *Chondrulus montandoni*, Dobrudscha; — *Ch. movradi*, Angora; — *Petraeus granulatus*, Samarien; — *Torquilla domicella*, Lourdes; — *T. hetaera*, Ostpyrenäen; — *T. occidentalis* Fagot mss., Hautes-Pyrénées; — *T. magma*, Ostpyrenäen; — *T. appeliusi*, Dalmatien; — *Clausilia deubeli* Kim. mss., Siebenbürgen; — *Cl. calabacensis* Bttg. mss., Kalambata, Griechenland; — *Cl. calopleura* Let. mss., Libanon; — *Cl. vestigans*, Krain; — *Ferus-sacia extrema*, Marocco; — *F. stenophya*, Anspülungen des Harrasch, Algerien; — *F. bourlieri*, Algerien; — *Hohenwarthia disparata*, Barcelona; — *Hyalina senilis*, Sicilien; — *Mesomphix spratti*, Kreta; — *Helix (Cressa) medea*, Kreta; — *Jacosta hypsa*, Biserta, Tunis; — *Xeroleuca apaturia*, Lybien; — *Mastus mestus*, Sofrano; — *Chondrulus ponsonbyi*, Horzoom in Lycien.

The Conchologist, a quarterly Journal for Conchologists.
Vol. II. No. 1.

- p. 1. *Scharff, R. F.*, some Remarks on the Distribution of British Land and Freshwater Mollusca. (Der Autor cassirt die Eintheilung Englands in 10 Faunenbezirke, wie sie Forbes vorgenommen, und erkennt nur zwei an, von denen der eine die Hauptmasse von England und Wales, der andere die äussersten Südwestecken dieser Länder nebst Irland und Schottland umfasst).
- p. 6. *Smith, Edg. A.*, Note on a Variety and the Epidermis of *Cyclophorus zebrinus* Benson.
- p. 7. *Eyre, the Rev. William L. W.*, on the classification of Varieties.
- p. 10. *Crik, Walter D.*, Bibliography of the Land and Freshwater Mollusca of Northamptonshire.
- p. 14. *Scharff, R. F.*, on the affinities of the genera *Limax*, *Arion* and *Helix*.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1891. III. September-December.

- p. 456. *Pilsbry, H. A.*, the newest species of West Indian Land Land Shells. (*Plagiptycha Maynardi* und *Hemitrochus xanthophaës* von den Bahamas, ferner *Macrochlamys Stearnsi* von Kalgan in Nordchina, letztere t. 19 fig. 9—11 abgebildet).
p. 471. *Pilsbry, H. A.*, New and hitherto unfigured Japanese Mollusks (*Thylacodes medusae* t. 17, 18; — *Terebra Stearnsi* t. 19 fig. 5; — ferner *Siphonalia fuscolineata* Pease t. 19 fig. 4; — *Astralium japonicum* Dkr. t. 19 fig. 6—8, und *Vola puncticulata* Dkr. im ausgewachsenen Zustand, t. 19 fig. 1—3).

Ihering, H. von, über die Beziehungen der chilenischen und der südbrasilischen Süßwasserfauna. In Verh. des deutschen wissensch. Vereins Santiago. Vol. II. Heft. 3. Macht in populärer Form auf die Wichtigkeit der Verwandtschaft der Süßwasserfauna zu beiden Seiten der Anden aufmerksam und fordert die Deutschen in Chile zu deren genauerem Studium auf.

Drouët, H., et M. Chaper, Unionidae. In Voyage de M. Chaper à Borneo. Memoires Soc. Zoolog. France V. 1892. p. 145—155. pl. V. VI.

Die Zahl der aus Borneo bekannten Unioniden wird durch Chapers Sammlungen um 8 vermehrt: *Unio lugens* p. 147 t. 5 fig. 1—3; — *U. Sacculus* p. 148 t. 5 fig. 4—6; — *U. lingulatus* p. 149 t. 5 fig. 7—9; — *U. radulosus* p. 150 t. 5 fig. 10—12, eine hochinteressante, reich skulptirte Form; — *Pseudodon crassus* p. 151 t. 6 fig. 1—3; — *Ps. aeneolus* p. 152 t. 6 fig. 4—7; — *Unio Trompi* p. 153 t. 6 fig. 8—10; — *Unio fulvaster* p. 154 t. 6 fig. 11—13. Die beigegebenen Figuren sind ausgezeichnet.

Manual of Conchology, structural and systematic. With Illustrations of the Species. By George W. Tryon jr., Continuation by H. A. Pilsbry. Part. 49 (Vol. 13 pt. 1). Philadelphia 1892.

Enthält die Acmæidae mit den Gattungen *Pectinodonta* Dall, *Acmæa* Eschsch. und *Scurria* Gray. — Neu *Acmæa Dalliana* pl. 7 fig. 57—60, Californien; — *A. Ceciliiana* v. *subpersona* pl. 34 fig. 11—13, Valparaiso; — *A. Carpenteri* pl. 33 fig. 70—73, Westindien; — *A. cubensis* v. *simplex* pl. 4 fig. 63—68; —

A. Garrettii pl. 33 fig. 96—98, Viti-Inseln; — *A. saccharina v. perplexa* pl. 36 fig. 69—71, Australien; — *A. chathamensis* pl. 35 fig. 43—46, Chatham-Inseln. — Zahlreiche Arten, besonders von Carpenter, Dall und den australischen und neuseeländischen Autoren sind zum erstenmal abgebildet.

Stearns, Robert E. C., List of North American Land and Freshwater Shells received from the U. S. Department of Agriculture with notes and comments thereon. — In Pr. U. S. Nat. Mus. vol. 14 p. 35—106.

Enthält die Ausbeute des von der Division of Biological Explorations ausgesandten Dr. C. Hart Merriam und seiner Assistenten. Neue Arten werden nicht beschrieben.

Malakozoologische Blätter, neue Folge. Bd. XI.

- p. 1. *Suter, H.*, Beiträge zur schweizerischen Mollusken-Fauna.
- p. 27. *Szep, R.*, die Molluskenfauna der Umgebung von Güns.
- p. 89. *Böttger, Dr. O.*, drei neue mitteloligocäne Mollusken aus dem deutschen Rupelthon (*Natica Geinitzi*, *Calliostoma Jetschini*, *Yoldia Beyrichi*).
- p. 94. *Sandberger, F. von*, Verzeichniss der Conchylien des nördlichen badischen Schwarzwaldes.
- p. 100. *Suter, H.*, Conchyliologische Mittheilungen aus Neuseeland.
- p. 107. *Simroth, Dr. H.*, einige Bemerkungen über *Bithynel'a Dunkeri* Flld.
- p. 109. *Simroth, Dr. H.*, *Hesperarion*, eine neue amerikanische Landschneckengattung.
- p. 110. *Clessin, S.*, *Bythinella bosniensis* n. sp.
- p. 111. *Loëns, H.*, die Gasteropodenfauna des Münsterlandes.
- p. 158. *Heimburg, H. von*, Abbildung und Beschreibung einer neuen *Helix* (*Aggioi* n. von den Salomonen).

The Journal of Conchology. Vol. VI. No. 11 u. 12.

- p. 353. *Gain, W. A.*, Notes on the Food of some of the British Mollusks.
- p. 360. *Taylor, J. W.*, *Helix arbustorum* var. *canigonensis* Boub.
- p. 361. *Jenner, J. H. A.*, Notes on the Land- and Freshwater Mollusca of East Sussex.
- p. 365. *Watson, the Rev. R. Boog*, the Marine Mollusca of Madeira. (16 sp. werden der Mac Andrew'schen Liste hinzugefügt).
- p. 377. *Cox, C. Stanley B.*, Occurrence of *Helix elegans* at Dover.
- p. 380. *Cockerell, T. D. A.*, *Limnaea peregra* var. *ovaliformis*.

- p. 380. *Taylor, John W.*, *Limnaea peregra ovaliformis*.
- p. 399. *Marshall, J. T.*, the Habitat of *Mountacuta ferruginosa*.
- p. 404. *Melvill, J. C.*, *Calliostoma* (vel *Ziziphinus*) *haliarchus*. (Mit Abbildung).
- p. 405. *Melvill, J. C.*, Descriptions of eleven new Species belonging to the Genera *Columbarium*, *Pisania*, *Minolia*, *Liotia* and *Solarium*. (*Columbarium distephanotis* p. 405 t. 2 fig. 4, Torresstrasse; — *Pisania Gaskelli* p. 406 t. 2 fig. 5 hab.?; — *Minolia malcolmia* p. 406 t. 2 fig. 6; — *M. pompilioides* p. 407 t. 2 fig. 7; — *M. gilvosplendens* p. 407 t. 2 fig. 8; — *M. ceramica* p. 408 t. 2 fig. 11; — *M. Edithae* p. 408 t. 2 fig. 9; — *M. eilikrines* p. 409 t. 2 fig. 13, Queensland; — *M. henniana* p. 410 t. 2 fig. 14, sämmtlich von den Philippinen; — *Liotia calliglypta* p. 410 t. 2 fig. 10, Thursday Island; — *Solarium (Torinia) enoshimense* n. p. 411 t. 2 fig. 12, Japan).
- p. 412. *Milne, J. G.*, Contributions towards a List of Irish Mollusca. II. Notes on the Land and Freshwater Mollusks of Achill Island.
- p. 421. *Craven, A. E.* and *Edgar A. Smith*, Notes on the viviparous nature of *Balea*.
- p. 423. *Simroth, Dr. H.*, on some Testacellae.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1891. Part. I.

- p. 45. *Baker, Frank C.*, Notes on a Collection of Shells from Southern Mexico. Die aufgezählten Arten wurden bei Silam an der Nordküste von Yucatan, bei Campeche und bei Vera Cruz gesammelt. Neue Arten sind nicht darunter.
- p. 56. *Baker, Fr. C.*, Remarks on the Muricidae with descriptions of new species. Neu *Ocinebra Pilsbryana* von Ceylon; — *Ricinula rugosoplicata*, Untercalifornien; — *Eugina Harveyana*, Westafrika. Sämtliche Mabille'sche Arten von *Concholepas* werden eingezogen.
- p. 71. *Pilsbry, H. A.*, Note on the soft parts and dentition of *Stomatella*.
- p. 97. *Ford, John*, Description of new species of *Anctus* and *Oliva*. Neu *Anctus Pilsbryi* p. 97 fig. 1, Brasilien; — *Oliva cryptospira* fig. 3. 4, Molukken.
- p. 122. *Leidy, Jos. M. D.*, Note on the Boring Sponge of the Oyster.
- p. 136. *Heilprin, Prof. Angelo*, Geological Researches in Yucatan. Enthält Verzeichnisse von Versteinerungen aus dem Pliocän und Postpliocän.

- p. 165. *Dall and Pilsbry*, on some recent Japanese Brachiopoda, with a description of a species believed to be new.
 p. 172. *Dall, W. H.*, Notes on some recent Brachiopods.

Stearns, Robert E. C., List of Shells collected on the West Coast of South America, principally between lat. 7°30' S. and 80°49' north by Dr. W. H. Jones, U. S. Navy.
 — In Pr. U. S. Nat. Mus. vol. XIV. p. 307—335.

Es werden 211 Arten aufgeführt, meistens am Strande und oft nur in wenigen Exemplaren gesammelt, aber durch die genaue Fundortsangabe und sichere Bestimmung doch von grosser Wichtigkeit. Von neuen Arten wird nur *Tectarius atypus* genannt, aber nicht beschrieben, dagegen für *Pyrula anomala* Reeve eine neue Gattung *Solenosteira* errichtet, zu welcher auch *Fusus purpuroides* d'Orb. gehört.

The Nautilus. Vol. V. No. 10—12.

- p. 97. *Dall, Wm. H.*, Some Types new to the Fauna of the Galapagos Islands. (*Helicina nesiotica*, *Leptinaria chathamensis*, *Hyalinia Baueri*).
 p. 99. *Pilsbry, H. A.*, a new species of *Zonites* from Arkansas (*Z. Brittsii*).
 p. 100. *Sterki, Dr. V.*, some notes on North American Forms of *Vallonia*.
 p. 101. *Raymond, W. J.*, *Limax agrestis* L. in California.
 p. 102. *Pilsbry, H. A. and C. W. Johnson*, Catalogue of *Fissurellidae* of the United States (43 sp.).
 p. 109. *Vaughan, T. Wayland*, Mollusks of Dorcheat Bayou and Lake Bistineau, Louisiana.
 p. 111. *Rivers, J. J.*, a new volutoid shell from Monterey Bay (*Scaphella Arnheimi*).
 p. 112. *Dean, Geo. W.*, more about *Unio luteolus* and *U. radiatus*.
 p. 114. *Wood, Williard M.*, *Paludina japonica* Mart. for sale in the San Francisco Chinese Market.
 p. 115. *Winkley, Rev. H. W.*, do Mollusca show change of climate in New England?
 p. 116. *Wakefield, Edw.*, Antipodean Oysters.
 p. 121. In Memoriam — Dr. Wesley Newcomb.
 p. 124. *Wright, Berlin II*, a new Florida *Unio* (Oscari n.).
 p. 125. *Dall, W. H.*, on the species of *Donax* of Eastern North America.

- p. 127. *Adams, Chas. C.*, Mollusks as Catfish-food.
 p. 133. *Marshall, W. B.*, Notes on the colonization of Freshwater-Shells.
 p. 134. *Dall, W. H.*, on an undescribed Cytherea from the Gulf of Mexico (*C. texicana*).
 p. 135. *Sterki, Dr. V.*, a few observations concerning death of Freshwater Mollusca.
 p. 137. *Banks, Nathan*, the Land Mollusca of the Cayuga Lake Valley.
 p. 139. *Vaughan, T. Wayland*, a few queries and notes.
 p. 141. *Tarrer, W. J.*, Mortality in mussels at Orange, Va.
 p. 141. *Pilsbry, H. A.*, Littoral Land Shells of New Jersey.
 p. 142. *Pilsbry, H. A.*, Preliminary Notices of new forms of Fresh Water Mollusks (*Vivipara georgiana* var. *altior*, *Fluminicola meriami* aus Nevada).

The Nautilus. Vol. IV.

- p. 97. *Keep, Josiah*, Mollusks of the San Francisco Markets.
 p. 100. *Pilsbry, H. A.*, a new species of Limpet from Japan (*Heliconiscus Stearnsi*).
 p. 101. *Campbell, J. H.*, Mollusca of the United States.
 p. 109. *Pilsbry, H. A.*, Form of American Carychium. (Es werden zwei Varietäten, exile und occidentalis, von *Car. exiguum* abgetrennt).
 p. 110. *Simpson, Chas. F.*, Notes on Mr. Hemphills Catalogue.
 p. 112. *Winckley, Henry*, Edible Mollusks of Maine.
 p. 113. *Fox, Wm. J.*, List of Mollusca of Gloucester Co. N. J.
 p. 120. *Hemphill, Henry*, *Ariolimax californicus* var. *straminea* n.
 p. 120. *Pilsbry, H. A.*, Notes on certain species of Cepolis (*Hel. pimesonia* Pilsbry ist = *trizonaloides* A. Brown; — *Hel. squamosa* Fér. gehört nicht zu Cepolis, sondern zu *Jeanneretia*).

Le Naturaliste. Vol. 13.

- p. 183. *Jousseaume, Dr.*, Coquilles nouvelles (*Martesia roseotincta* und *Solen digitalis*, beide von Aden; — p. 207. *Lutraria Turneri* und *Sunettina* von ebenda; — p. 222. *Savignyarca* und *Modiola Sirahensis* von ebenda; — p. 231. *Oligotoma serpata*, p. 232. *Drillia Cecchii* von ebenda; — p. 201. *Pandora Edwardsi* und *Tugonia adenensis* von ebenda).
 p. 264. *Ancey, C. F.*, Doit on conserver le nom de *Tiphobia* appliqué à un genre de Mollusque?

p. 264. *Folin, Marquis de*, Sur un Mollusque nouveau. — Das Thier von Cryptazeca monodonta hat nach der Untersuchung durch Barrois eine Fussdrüsse wie Lowea, und muss mit dieser von Cionella und Azeca abgetrennt werden. Zwei neue Varietäten (var. hyalina und var. subcylindrica) werden beschrieben.

L'Echange. Revue Linnéenne. Septième Année. 1891.

p. 69. *Locard, A.*, Notices Conchyliologiques. XIV. Espèces nouvelles du groupe du Cytherea rudis Poli. Es werden als Arten abgetrennt *P. gracilenta*, *rugata*, *nitidula*.

— Huitième Année 1892.

p. 18. *Locard, A.*, Notices Conchyliologiques XVIII. Sur quelques Limnées françaises du groupe du Limnaea limosa. Neu *L. limosina* (Dupuy t. 22 fig. 13); — *L. conglobata* (M. Ch. II t. 2 fig. 21. 22); — *L. putriformis*; -- *L. laeta* (M. Ch. II t. 1 fig. 17); — *L. oppressa* (Icon. 1253).

Fischer, Dr. P., Catalogue et Distribution géographique des Mollusques terrestres, fluviatiles et marins d'une partie de l'Indo-Chine. (Siam, Laos, Cambodge, Cochinchine, Annam, Tonkin). — Autun 1891. 8°. 192 S. — (Extrait du Bull. Soc. Hist. nat. d'Autun IV).

Ein sehr werthvoller Beitrag zur Molluskengeographie, welcher die Faunen der französischen Besitzungen und Schuttländer in Hinterindien in eingehender Weise behandelt. Die geographischen Beziehungen zu den Nachbarländern werden erörtert und ein ausführliches Literaturverzeichniss gegeben. Für die Cyclotus aus Hinterindien wird, da Cyclotus Guildg. auf einen Pterocyclus gegründet, der Name *Procyclotus* eingeführt.

Le Naturaliste. Vol. XIV.

p. 178. *Ancey, C. F.*, Description de Mollusques nouveaux. (*Cyane Orbignyi*, *Nenia Orbignyi*, *Odontostomus Lemoinei*, sämmtlich von Sta. Cruz de la Sierra in Bolivia).

Coutagne, Georges, Note sur les petites Bythinidées des Environs d'Avignon. — Aus Bull. Soc. d'Agriculture. Lyon 1891.

Polemisiert gegen die Arbeiten von Nicolas und zieht die meisten von dessen Arten wieder ein, ebenso die Gattung *Avenionia*. Er erkennt auch an, dass sich Zwischenformen zwischen *Bythinella (sorgica)* und *Belgrandia (gibba)*, sowie zwischen *Bythinia* und *Digyreidum* finden, hält aber trotzdem die Gattungen aufrecht.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 176-183](#)