

## Diagnosen neuer palaearetischer Arten.

Von

Dr. W. Kobelt.

### 1. *Buliminus trojanus* n.

T. brevissime rimata, elongata, subfusiformis, nitida, subtranslucida, laeviuscula, sub lente subtilissime striatula, lutescenti-cornea. Spira elongata, apice conico obtusato. Anfractus 10 — 11 lentissime crescentes, sutura linearis discreti, superi convexusculi, inferi fere plani, ultimus leviter attenuatus, basi compressus, pone labrum planatus. Apertura obliqua, ovata, ad dextrum producta; peristoma subincerassatum, albolabiatum, vix brevissime expansum, margine externo medio incrassato, columellari multo breviore appresso, cum externo vix coniuncto.

Alt. 14, diam. max.  $3\frac{3}{4}$  mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1100.

Hab. Troas (Coll. Ponsonby).

### 2. *Buliminus priamus* n.

T. rimato-perforata, sinistrorsa, perelongata, fere cylindrica, ad apicem breviter conico-attenuata, apice obtusato, corneo-albida, laeviuscula, sub lente oblique et arcuatim striatula, nitida. Anfractus 12 lentissime crescentes, sutura linearis leviter albidiomarginata discreti, convexusculi, ultimus  $\frac{1}{4}$  altitudinis parum superans, basi vix compressus, pone labrum leviter planatus. Apertura obliqua, anguste et subirregulariter ovata, obsolete et profunde tridentata: dente parietali lamelliformi compresso intrante, altero ad medium marginis externi minimo, tercio ad basin columellae truncaturam simulante. Peristoma rectum, aenatum, labio albo

incrassatum, marginibus distantibus, vix callo tenuissimo junctis, columellari multo breviore dilatato, areuatim ascendentem, quasi truncata.

Alt. 13, 5, diam. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1101.

Hab. cum praecedente (Coll. Posonby).

3. *Bulininus goldfussi* n.

T. late et profunde rimata, sinistrorsa, cylindrica, apice breviter conica, solida, subtiliter irregulariterque striatula, rufo-brunnea apice lutescente. Aufractus 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lentissime crescentes, sutura albomarginata discreti, supremi 2 convexiusculi, sequentes fere plani, ultimus basi compressus, pone labrum planatus et lutescens, altitudinis <sup>1</sup>/<sub>3</sub> vix superans. Apertura obliqua, semiovalis; peristoma acutum, intus fortiter luteolabiatum, edentulum, marginibus vix conniventibus, callo tenui lutescente junctis, externo strictinculo, columellari multo breviore leviter dilatato et super rimam umbilicalem reflexo.

Alt. 10, diam 4 mm.

Cfr. Iconographie N. F. fig. 1102.

Hab. in montibus Alai Asiae centralis.

4. *Unio lapidosus* Villa in sched.

Concha subtriangulari-ovala, perinaequilatera, magna, solida, ponderosa, parum inflata, ruditer sulcato-striata, striis postice sublamellosis, cicatricibus irregularibus radiatibus munita, sub epidermide tenui viridi-fusca alba, in locis erosionis eleganter radiatim striata. Margo anticus compresso-rotundatus, superior ante umbones nullus, postice oblique descendens, posticus biangulatus, ventralis rotundatus. Umbones parum pone <sup>1</sup>/<sub>4</sub> longitudinis siti, depresso, leviter antrorsi, erosi, apicibus approximatis; lunula angusta; ligamentum

percrassum, magnum, sinulus brevis; area carinulis duabus ex umbone decurrentibus in utroque latere insignis. Cardo percrassus; valvula dextra dentibus cardinalibus tribus, foveolis profundis discretis et lamella crassa unica armata, sinistra dentibus duobus elongatis compressis fovea profundissima discretis et foveolis duabus minoribus extus marginatis, lamellis- que duabus fortibus armata, lamellis interstitio magna laevi pone dentes exciso a dentibus separatis. Impressiones musculares anticeae triplices, profundae, posticeae distinctae, magnae, infra lamellam intrantes; linea pallealis distincta, irregulariter crenata; margarita antice rosaceo-albida, incrassata, postice irisans. —

Long. 125, alt. 88, crass. 37 mm.

Hab. in fluvio Euphrates (Mus. Berolin.)

5. *Unio bithynicus* n.

Concha inaequilatera, perelongata, angulato-ovata, postice rostrata, subcompressa, striatula, striis antice distinctioribus, vix nitens, parum crassa, unicolor brunneo-virescens. Margo anterior brevissime rotundatus, cum dorsali arcuatim ascendentem angulum formans, ventralis strictus, versus posticum primum descendenter, dein rotundato-truncatum vix ascendens. Umbones ante  $\frac{1}{3}$  longitudinis siti, lati, depresso, vix prominuli, erosi; areola indistincta; ligamentum elongatum, angustum, sinulo longo; area compressa, cristis duabus vix conspicuis in utroque latere. Cardo ante umbones situs; dens valvulae dextrae elongatus, crassus, crenatus, a margine cardinali lamelliforme elevato vix divergens; dens posticus valvulae sinistrale conicus acutus, compressus, anticus subobsoletus, cristam elongatam humilem formans, usque ad marginem anticum productus; fos- sula lateralis, longa; lamellae elongatae, humiles, leviter

arenatae. Impressiones musculares anticae distinete trifidae, profundae, posticae distinctae; linea pallealis usque ad rostrum callo humerali marginata. Margarita coerulescens, hic illic salmonacea, postice irisans. —

Long. 57, alt. 27, crass. 17 mm.

Gfr. Iconographie N. F. Fig. 1128.

Hab. Asia minor.

## Die marinen Mollusken der Philippinen (II).

nach den Sammlungen des Herrn José Florencio Quadras in Manila.

Von

Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main).

(Fortsetzung zu Nachr.-Blatt d. d. Mal. Ges. 1893 pag. 97–115).

### III. Die Eulimiden.

Betreff's der Systematik dieser Familie verweise ich auf Tryon, Mammal of Conchology Bd. 8, 1886 pag. 258 ff., wo Literatur und alle Citate zu finden sind. Die Tryon'schen Untergattungen *Subularia* Monterosato und *Mucronalia* A. Adams habe ich als Gattungen behandelt, da es mir bis jetzt niemals schwer geworden ist, Vertreter dieser Formenkreise als solche zu erkennen, und da ich auch vermuthe, dass wenigstens *Mucronalia* infolge von Trennung der Geschlechter auch anatomisch von *Eulima* abweichen wird.

Die bis jetzt von den Philippinen bekannten Eulimiden lassen sich in 5 Gattungen unterbringen:

#### Gen. I. *Eulima* Risso.

Für die 12 mir vorliegenden Arten kann folgendes Schema gelten:

1. Rechte Schalenseite mit einer mehr oder weniger zusammenhängenden Reihe von eingedrückten Varices.
1. Querschnitt der Schale ein mehr oder weniger ausgesprochenes Oval.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Diagnosen neuer palaearetischer Arten 150-153](#)