

Conchylien-Preisliste Nr. VI.

Coquilles. Shells.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas.

Blasewitz bei Dresden.

Dezember 1891.

Preise in deutscher Reichswährung. Wo zwei Preise angegeben sind, verstehen sich die niedrigeren für kleinere oder weniger schöne Exemplare.

(Prix) 1 Mark = 1 Franc 25 cts. = 1 Shilling = 25 Cents U. S. A. (Prices).

Emballage und Porto wird angerechnet.

Es wird gebeten, die Desideraten-Liste auf ein besonderes Blatt zu schreiben, damit dieselbe gleich als Sendungsliste benützt werden kann.

On est prié de faire les listes des Désiderata sur des feuilles à part qui serviront comme listes d'envoi.

Please to write the list of Desirata according to the order of this list and on separate Papers.

Das Erscheinen dieser Liste bitten wir befreundeten Sammlern mitzuteilen.

Prière de faire circuler cette liste parmi les amateurs.

Please to communicate this list to known collectors.

Murex	Mark
Aciculatus Lm. Guernsey.	0,30—0,50
Adustus Lm. Philippinen.	0,75
Brandaris L. Spanien.	0,50—1,00
Calcitrata Lm. Ind. Ocean.	1,00
Erinacens L. Guernsey.	0,50—1,20

Pisania	
Maculosa Lm. Mittelmeer.	0,20—0,30
Striata Gm. Smyrna.	0,20—0,30

Pollia	
Orbigny Payr. Valencia.	0,20

Fusus	
Antiquus L. Nordsee.	1,00—1,50
Gracilis Cast. „	0,40—0,75

Pleurostoma	
Laevigata Ph. v. minor Commemara	0,50—1,00

Defrancia	
Linearis Mnt. Dalmatien.	0,30—0,40

Daphnella	
Vauquelini Payr. Mittelmeer.	0,40

Nassa	
Cornicula Ol. Malta.	0,15—0,20
Gemmulata Lm. Philippinen.	0,25
Incrassata Mll. Barcelona.	0,20
Variabilis Phl. Mittelmeer.	0,20

Cyclops	
Neritens L. Mittelmeer.	0,20

Purpura	
Biserialis Bln. Ecuador.	0,60
Haemastoma L. St. Catharina.	0,50

Ricimula	Mark
Adelaidensis Cr. S. Australien.	0,30
Mauritiana Chm. Massana.	0,25
Tuberculata Blv. Japan.	0,30—0,50

Agaronia	
Acuminata Lm. Senegal.	0,75

Oliva	
Biplicata Sw. Californien.	0,30—0,50
Dana Del. Mexico.	0,40—0,50
Elegans Lm. Ostindien.	0,40—0,50
Flammulata Lm. Westindien.	0,30—0,50
Nivea Gm. Antillen.	0,25
Oryza Lm. Cuba.	0,20
Reticularis Lm. Westindien.	0,30—0,50
Tigridella L. Philippinen.	0,50
Venulata Lm. Ostindien.	0,50

Voluta	
Vespertilio L. Ind. Ocean.	0,50—1,00

Mitra	
Episcopalis L. Ecuador.	1,25

Marginella	
Bivaricosa Lm. Senegal.	0,60—0,80
Clandestina Brch. Alger.	0,20—0,30
Minuta Pfr. Messina.	0,20

Volvaria	
Avena Val. Westindien.	0,20
Lactea Kn. „	0,20
Miliacea Lm. Alger.	0,35

Columbella	
Fulgurans L. Ind. Ocean.	0,20
Mercatoria L. Westindien.	0,20

	Mark.		Triphoris	Mark
Nitida Lm. Westindien	0,20	Perversus L. Scilly Isles	0,20—0,40	
Rustica L. Malta	0,20—0,30	Tympanotonos		
Scripta L. „	0,25	Fluviatilis P. M. Madras	0,20	
Harpa		Pyrasus		
Conoidalis Lm. Ceylon	1,50	Palustris L. Mauritius	0,50—1,50	
Nobilis Rmph. Ins. Ticao.	1,50	Cerithidea		
Ventricosa Lm. Ind. Ocean	1,25	Decollata L. Nossibé	0,25—0,50	
Cassis		Obtusa Wood. Malacca	0,30—0,60	
Rufa L. Ind. Ocean	1,60	Sacrata Gld. Mexico	0,50	
Tuberosa L. Westindien	2,00	Leptoxis		
Undata Mrt. Moluccen	1,50	Dilatata Cnr. Alabama	0,40	
Cassidaria		Praerosa Say Amer. bor	0,20—0,30	
Echinophora Lm. Mittelmeer	0,50	Rubiginosa Lea Alabama	0,20—0,30	
Dolium		Showalteri Lea Georgia	0,30—0,50	
Costatum Dsh. Philippinen	1,00—1,50	Taeniata Cnr. Alabama	0,30—0,40	
Sycotypes		Gyrotoma		
Ficoides Lm. Ind. Ozean	1,00	Continuens Lea Alabama	0,20—0,30	
Natica		Jo		
Alderi Frb. Channel Isles	0,50—0,50	Armigera Lea Tennessee	0,50—0,60	
Mamilla L. Nossibé	0,30—0,50	Melaria		
Scalaria		Affinis Lea Tennessee	0,50	
Communis Lm. England	0,30—0,50	Amurensis Gstfd. Amur	0,40—0,75	
Terebra		Annulifera Cnrr. Amer. bor.	0,60	
Maculata L. Ind. Ocean	1,50	Arachnoidea Anth. Tennessee	0,35—0,40	
Odostomia		Arata Lea Alabama	0,30—0,50	
Albella Lv. South-Wales	0,30—0,40	Bella Cnr. Georgia	0,25	
Conoidea Brch. Mittelmeer	0,20—0,30	Bicincta Anth. N. Carolina	0,35	
Rissoides Hnl. Cornwall	0,30—0,40	Brookei Rv. juv. Borneo	0,20	
Spiralis Mtg. Guernsey	0,20—0,40	Canaliculata Say Cincinnati	0,30—0,40	
Enlima		Canhyi Lea Florida	0,30—0,50	
Bilineata Ald. Scilly Isles	0,50	Carinifera Lm. Georgia	0,25	
Distorta Dr. Scilly Isles	0,50	Castanea Lea Tennessee	0,25	
Cerithiopsis		Confracta Lea Alabama	0,25	
Jadestinus Brs. Alger	0,30—0,40	Curta Hld. Tennessee	0,40	
Solarium		Cylindracea Cnrr. Alabama	0,35	
Perspectivum L. Davao	0,40—0,60	Decollata Lm. Liberia	0,30—0,50	
Conus		Foremani Lea Alabama	0,40	
Imperialis L. Philippinen	2,00	Funeralis Anth. Tennessee	0,20	
Millepunctatis Lm. Philippinen	1,60	Gracilior Anth. Tennessee	0,25—0,30	
Nicobaricus Brg. Nicobaren	2,50	Granifera Lm. Amboina	0,65	
Raphanus Brg. Ind. Ozean	2,50	Grosvenori Lea Indiana	0,40	
Pterocera		Haysiana Lea Alabama	0,40	
Chiragra L. Ind. Ocean	1,50	Hollandri Fer. Steiermark	0,10—0,20	
Aporrhais		v. Crassa Ktsch. Croatia	0,30	
Pes-pelikani L. Spanien	0,30—1,00	v. Laevigata Rm. Croatia	0,25	
Cypraea		v. Legitima Rm. Croatia	0,30	
Annulus L. Ind. Ocean	0,10—0,30	v. Letourneuxi Bgt. Bosnien	0,25	
Caurica L. Ind. Ocean	0,20—0,50	v. Semiplicata Brus. Croatia	0,30	
Cinerea Gm. Westindien	1,00	Hydei Cnr. Alabama	0,30—0,40	
Erosa L. Ile de France	0,10—0,30	Libertina Gld. Yokohama	0,30—0,75	
Helvola L. Tahiti	0,10—0,20	Lirata Bens. Perak	0,25—0,40	
Isabella L. Mauritius	0,25	Livescens Mke. Niagara	0,10—0,20	
Lynx L. Ind. Ocean	0,20—0,30	Loebbeckei Brt. Yokohama	0,60—1,00	
Tigris L. Ind. Ocean	0,80	Matoni Gray Gabun	0,75—1,60	
Vitellus L. Ind. Ocean	0,25—0,40	Monilifera Lea Amer. bor.	0,50—0,75	
Ovula		Nigritina Morl. Camerun	0,40—0,60	
Ovum L. Moluccen	0,50—1,00	do. var. Gabun	0,50	
Cerithium		Nobilis Lea Alabama	0,50	
Mediterraneum Dsh. Smyrna	0,15—0,25	Nupera Say Tennessee	0,30—0,40	
Reticulatum Cst. Weymouth	0,35	Olivula Cnr. Alabama	0,35	
Bittium		Ovalis Lea Alabama	0,30	
Granarium Kn. S.-Australien	0,30	Pernodosa Lea Tennessee	0,30—0,50	

	Mark		Mark
Proteus Lea pass. Alabama . . .	0,20	Rudis Don. Granville . . .	0,10—0,20
Pybasi Lea Alabama . . .	0,50	Scabra L. Nossibé . . .	0,20—0,40
Pyramis Bens. Perak & Madras . . .	0,25	2 sp. St. Catharina . . .	0,20—0,30
Rudicostis Mss. Amboina . . .	0,80	sp. Batjan . . .	0,20
Sargi Crss. Guatemala . . .	0,50	Lacuna	
Scabra Mll. Madras, Socotora und Mauritius . . .	0,30—0,40	Pallidula Cst. Devon . . .	0,20—0,40
Semicarinata Say Ohio . . .	0,30	Planaxis	
Setosa Sw. v. Minor Brt. Amboina . . .	0,75	Undulatus Lm. Java . . .	0,20—0,40
Shastaensis Lea Californien . . .	0,25	Litiopa	
Sumatrensis Brot. Sumatra . . .	0,50—1,20	Bombyx Rng. Sargassum-Meer . . .	0,20—0,30
Symmetrica Hld. Alabama . . .	0,20—0,30	Paludina	
Testudinaria v. d. B. Java . . .	0,50	Angularis Müll. Sumatra . . .	0,30—0,50
Thiarella Lam Nossi-bé . . .	0,40—0,75	Bengalensis Lam. Bengal . . .	0,30—0,50
Thorntoni Lea Alabama . . .	0,60	Burroughiana Lea Mindanao . . .	1,00
Torulosa Anth. Tennessee . . .	0,25—0,40	Contecta Mll. Sachsen . . .	0,10—0,20
Translucens Anth. Michigan . . .	0,30	Contectoides Bm. Amer. bor. . .	0,50
Troostii Lea Tennessee . . .	0,50	Dissimilis Mll. Bengal . . .	0,40
Tryoniana Lea Alabama . . .	0,50	Fasciata Mll. Sachsen . . .	0,10
Taberculata Mll. Sinai . . .	0,10—0,20	Japonica v. Selateri Frf. Yokoh. . .	0,50—1,00
v. Mauritiana Mss. Mauritius . . .	0,25	Javanica v. d. B. Java . . .	0,50
v. Parreyssi Brt. Java . . .	0,40	Melanostoma Bns. India . . .	0,30—0,50
Undosa Anth. Kentucky . . .	0,25	Obtusa Trsch. Madras . . .	0,25
Undulata Say Ohio . . .	0,50—0,75	Praerosa Grstf. Amur . . .	1,00—1,50
Verrucosa Huds. Tennessee . . .	0,30—0,50	Vivipara L. Sachsen . . .	0,10
Virginica Gm. Amer. bor. . .	0,20—0,30	Melantho	
Viridula Anth. Tennessee . . .	0,20—0,30	Decisa Say Amer. bor. . .	0,30—0,50
Vittata Anth. Alabama . . .	0,30	Integra Say Amer. bor. . .	0,60
sp. Davao (Philippinen) . . .	0,30—0,50	Tutotoma	
sp. Bolivien . . .	0,50	Angulata Lea Alabama . . .	0,35
Pachychilus		Magnifica Cmr. pass. Alabama . . .	0,35
Corvinus Morl. Guatemala . . .	0,50	Cleopatra	
Largillierii Phil. Guatemala . . .	0,40—0,60	Bulimoides Ol. Damiette . . .	0,20—0,30
Melanatria		Campeloma	
Madagascariensis Grtl. Nossibé . . .	0,50—0,80	Cyclostomatiformis Lea Alabama . . .	0,40—0,60
Hemisinus		Subcarinata Say Amer. bor. . .	0,50
Acicularis Fer. Sava . . .	0,10—0,20	Potamopyrgus	
Kochi Bernard. Peru . . .	0,75—1,25	Antipodum Gray N. Zealand . . .	0,50
Lineolatus Wood Jamaica . . .	0,50—0,75	do. gross N. Zealand . . .	0,75
Melanopsis		Cumingiana Fsch. N. Zealand . . .	1,00
d'Andebartii Prv. Vöslau . . .	0,25	Wiesemanni Brt. Tasmania . . .	0,70
Dufourii Fer. Krain . . .	0,10—0,20	Pyrgula	
Esperi Fer. Sava . . .	0,30	Annulata Jan. Garda-See . . .	0,20—0,30
Ferussaci Roth. Oran . . .	0,25	Nevadensis Stear. Nevada . . .	0,30
Graellsii Villa Valencia . . .	0,20—0,30	Thiesseana Gdt. Messolonghi . . .	0,50
Kotschy v. d. B. Cilicien . . .	0,35	Bithynia	
Marocana Chem. Oran . . .	0,25	Anapensis Ben. Syracus . . .	0,30
Moraldi Zgl. Ungarn . . .	0,20—0,30	Leachii Shpp. Cambridge . . .	0,25
Praerosa L. Oran . . .	0,10—0,20	v. Italica Paull. Toscana . . .	0,30
v. Buccinoidea Fer. Beyrut . . .	0,10	Marginata Chmn. Ceylon . . .	0,20
v. Sahariae Brgt. Oran . . .	0,25	Mouliata Morl. Madagascar . . .	0,30
Stussineri Btgg. Thessalien . . .	0,50	Orsinii Chrp. Lepaute . . .	0,35
Variabilis v. d. B. Syrien . . .	0,30	Pulchella Bens. India . . .	0,30
Littorina		Rubens Mke. Sicilien . . .	0,20
Angulifera Lm. Venezuela . . .	0,10—0,25	Stenothyroides Dhr. Ceylon . . .	0,30—0,50
Carinata Orb. Cuba . . .	0,25	Tentaculata L. Sachsen . . .	0,10
Debilis Phil. Nossibé . . .	0,20—0,30	Troschellii Mch. Berlin . . .	0,20
Intermedia Phil. Nossibé . . .	0,30	Ventricosa Gray. Danzig . . .	0,26
Littoralis L. England . . .	0,10—0,30	Stenothyra	
v. Obtusata Ch. Granville . . .	0,10—0,20	Blanfordiana Nev. Madras . . .	0,25
Neritoides L. Dalmatien . . .	0,15—0,20	Emmericia	
do. Malta . . .	0,10—0,20	Patula Bm. Croatien . . .	0,10—0,20
		v. Sclaris Neum. Croatien . . .	0,20

Lithoglyphus		Mark	Rissoa		Mark
Fluminensis Lng. Krain		0,20	Cancellata Cost. Guernsey		0,15
Fuscus Pfr. Croatien		0,25	Decorata Phil. Dalmatien		0,20
Lapidum d'Orb. Rio Grande do Sul		0,15—0,25	Dolium Nyst. Alger		0,30
Liliputanus Grd. China		0,25	Exigua Mich.		0,30
Naticoides Fer. Krain		0,10—0,20	Membranacea Lr. Weymouth		0,20
Pygmaeus Erf. Croatien		0,25	Mutabilis Schw. Alger		0,35
Gillia			Parva Cost. Jersey		0,10
Altilis Lea Washington		0,50	Pulchella Phil. Dalmatien		0,20
Crenata Hld.		0,30—0,40	Punctura Mtg. Scilly Isles		0,20
Somatogyrus			Similis Sachi Dalmatien und Alger		0,20
Integer Say. Cincinnati		0,10—0,20	Siriata Ad. Guernsey		0,20
Subglobosus Say. Cincinnati		0,35	Variabilis v. Costata Dsm. Dalmatien		0,20
Amnicola			„ v. Splendida Echw. Schwarzes Meer		0,20
Conovula Parr. Croatia		0,10—0,20	Ventricosa Dsm. Adria		0,20
Decisa Hld. Washington		0,20	Violacea Dsm. Galway		0,10—0,20
Emarginata Anth. Ohio		0,20—0,30	Cingula		
Grana Say Washington		0,20	Calathiscus Mtg. Alger		0,25
Limosa Say Vermont		0,50	Cingillus Mtg. Bretagne		0,10
Lustrica Say Cayuga Lac		0,20	v. Rupestris Frb. Weymouth		0,15
Marginata West. Nord-Enböa		0,20	Costulosa Ald. Weymouth		0,15
Monjei Brg. Mahon		0,25	Fulgida Ad. Weymouth		0,10
Pallida Hld. Washington		0,10—0,25	Suturata Erf. Petrovosele		0,10
Parva Say Illionis		0,20	Alvania		
Peracuta Walk. Texas		0,30	Cimex L. Dalmatien		0,10
Porata Say Washington		0,20	v. Lactea Brs. Dalmatien		0,15
Vestita Ben. Palermo		0,20	Lactea Mich. Adria		0,20
Hydrobia			Lantziae Cal. Alger		0,25
Acerosa Brg. Bône		0,25	Lineata Rss. Dalmatien		0,20
Achaja Ciss. Nord-Enböa		0,10—0,20	Montaguei Payr. Dalmatien & Alger		0,20
Acuta Drp. Montpellier		0,15	Skenea		
Arenaria Brg. Süd-Oran		0,25	Planorbis F. S. Ives		0,10
Australis Orb. La Plata		0,35	Potamiopsis		
Brondeli Brg. Tenes		0,25	Lapidaria Say Amer. bor.		0,10
Consociella Pfr. Salona		0,10—0,20	Assiminea		
Crystallina Prf. Cuba		0,20	Francessi Gray Calcutta		0,20
Jamaicensis Ad. Jamaica		0,25	Littorea Chg. Weymouth		0,25
Jenkinsi Sm. Plumstead		0,40—0,60	Rubella Blf. Andamanen		0,30—0,50
v. Carinata Mrs. River Thames		0,50	sp. Yohohama		0,30
Kutschigi Kst. Obbravazzo		0,20	Valvata		
Miliacea Nev. Calcutta		0,25	Alpestris Bl. Württemberg		0,20
Minuta Stp. Connecticut		0,25	Antiqua Sw. Westpreussen		0,20
Octona L. Guernsey		0,20	v. Lacustris Ciss. Bodensee		0,20
Salinarum Dör. Argentinien		0,25	Cristata Mll. Leipzig		0,10
Thermalis L. Albano		0,20	Depressa Bayern		0,15
Ventrosa Mut. Croatien		0,25	Fluviatilis Ch. Danzig		0,15
Bythinella			Macrostoma Stb. Danzig		0,10—0,20
Binnelyi Tryon Californien		0,15	v. Pulchella Wstl. Landsberg a. W.		0,20
Dunkeri Erf. Württemberg		0,10	Naticina Mke. Landsberg a. W.		0,25
Nickliniana Lea Ohio		0,30	Piscinalis Fer. Sachsen		0,10
Opaca Zgl. Serajevo		0,20	v. Discors Wstl. Landsberg a. W.		0,20
Parreyssi Pfr. Vöslau		0,10	v. Contorta Mke. Erzgebirge		0,20
Saxatilis Rn. Wesermündung		0,15	Tricarinata Say Ohio		0,20
Schmidtii Chrp. Bayern		0,10	„ minor. Illionis		0,15
Solidula Brnsk. Trencsin		0,20—0,30	Virens Trn. Californien		0,30
Valvataeformis Mldf. Serajevo		0,10—0,20	Ampullaria		
Vitrella			Aulanieri Hupé Amazon		1,50—3,00
Robici Ciss. Krain		1,25	Cecillei Phil. Nossibé		0,50—0,75
Rissoina			Celebensis Quoy Celebes		0,75—2,00
Brugnieri Payr. Croatien		0,10—0,20	Crassa Sws. Peru		0,50—1,00
Barleia			Flagellata Say Vera Cruz		1,00—1,50
Rubra Ld. Alger		0,10	Globosa Sw. Madras		0,60—1,50
			Javanica Ry. Java		0,60

	Mark		Mark
Largillierti Phil. Nossibé	1,00	Virinea Lam. Antillen	0,20—0,30
Layardi Rv. Ceylon	1,50	Viridis L. Antillen	0,10—0,20
Luzonica Rv. Mindoro	2,00	Ziezac Sw. Amboina	0,30
Nucleus Phil. Peru	0,35—0,50	Navicella	
Pyrum Phil. Venezuela	0,75—2,00	Elliptica Lam. Mauritius	0,10—0,60
Vitrea Born. Liberia	0,75—1,25	Phasianella	
Lanistes		Speciosa Mf. Malta	0,15—0,25
Libyca Morl. Gabun	1,00	Turbo	
do. var. Camerun	0,40—1,00	Marmoratus L. Ind. Ocean	1,50
Nerita		Adeorbis	
Albicilla L. Java	0,20—0,30	Subcarinata Mt. Alger	0,20—0,30
Chamaeleon L. Ind. Ocean	0,30—0,50	Rotella	
Melanotragns S.-Australien	0,30—0,50	Vestitaria L. Palawan	0,10
Ornata Sw. Ecuador	0,60	Clanculus	
Plicata L. Nossibé	0,20—0,40	Jussieu Payr. Malta	0,10 0,20
Neritina		Diloma	
Adansoniana Rel. Liberia	0,25 0,50	Adelaidae Wd. S. Australien	0,50
Anatolica Rel. Beirut	0,10—0,25	Zizyphinus	
Antiquata Ktsch. Rumin	0,25	Matoni Payr. Malta	0,20
Auriculata Lm. Adenare	0,30—0,50	Pyramidatus Jff. Scilly Isles	0,30
Bengalensis Chm. India	0,25	Scripuncatus Mts. Malta	0,20
Brevispina Lm. Amboina	0,30—0,60	Striatus L. Malta	0,10—0,20
Caffra Lm. Mauritius	0,20—0,50	Elenchus	
Carinata Kok. Krain	0,15—0,25	Badius Wood S. Australien	0,50
Cornucopia Bn. India	0,30—0,50	Bankivia	
Coromandelina Swb. Palawan	0,25—0,40	Purpurascens Bek. S. Australien	0,30—0,50
Crepidularia Lm. Ganges	0,30—0,50	Trochocochelea	
Dambialis Zgr. Passau	0,10—0,20	Constricta Lm. S. Australien	0,10—0,80
Diadema Rel. N. Guinea	0,50—0,75	Chlorostoma	
Dubia Ch. sup. Davao	0,40—0,60	Argyrostomum Gm. Australien	0,40—1,00
Fluviatilis L. Halle	0,10	Gibbula	
v. Baetica Lm. Spanien	0,20	Ardens Sals. Malta	0,15—0,20
Intertexta Vll. Gardasee	0,15	Cinerea Cost. Santander	0,25
Jordani Sw. Messolonghi	0,20—0,30	Nivosa Ads. Malta	0,30—0,40
Knorri Rel. Nossibé	0,40	Rarelineata Mich. Alger	0,30—0,50
Labiosa Sw. Mindanao	0,80—1,50	Richardi Payr. Spanien	0,20—0,40
Longispina Rel. Mauritius	0,40—1,00	Umbilicaris L. Malta	0,10—0,20
Manoeli Dhrn. Prinzen Ins. . . .	0,10	Haliotis	
Meridionalis Phl. Gallia mer. . . .	0,10—0,20	Lamellosa Lm. Mittelmeer	0,20—0,50
v. Anapensis Ph. Syracus	0,25	Emarginula	
Moluccensis Mts. Batugadja	0,30	Fissura L. Scilly Isles	0,30—0,50
Nigrina Ktsch. Podused	0,20	Rosea Bl. Guernsey	0,30—0,50
Olivacea Rlz. Amboina	0,35	Dentalium	
Oweniana Gray Gabun	0,50—0,60	9-costatum Lm. Bretagne	0,20—0,40
Peloponnesa Rel. Lepante	0,10—0,20	Tarentinum Lm. England	0,20—0,40
Penclinati Brg. Pyren. orient. . . .	0,25	Patelloidea	
Pferrottiana Pet. India	0,20—0,30	Testudinalis Mll. Schottland	0,20—0,30
Prevostiana Pfr. Vöslau	0,10	Patella	
Propinqua Mss. Ins. Samoa	0,30	Athletica Lm. England	0,30—0,50
Pulligera L. Palawan	0,20—0,40	Capensis Rv. Nossibé	0,30—0,50
do. var. Davao	0,40—0,60	Chiton	
Pupa L. Cuba	0,10—0,20	Discrepans Brw. Granville	0,60—1,00
Pyrenaica Moq. Pyrenäen	0,20—0,40	Tornatella	
Sargi Crss. Guatemala	0,25	Fasciata Lm. Mittelmeer	0,20—0,10
Squamosa Rlz. Batugadja	0,35	Utriculus	
Strangulata Mf. var. Krain	0,10—0,20	Obtusius Trst. England	0,10—0,20
v. Eremita Bosnien	0,15	Truncatulus Brw. Scilly Isles	0,30
Stumpfi Nossibé	0,40—0,50	Testacella	
Thermalis Bubé Pyrenäen	0,20—0,30	Maugei Fer. Azoren	0,40—0,50
Transversalis Zgr. Hermannstadt	0,10—0,20	Agriolimax	
Trifasciata Mke. Zrmanja	0,20	Agrestis L. Sachsen	0,25

	Mark		Mark
Subagrestis Smr. Kaukas (Alcohol)	1,00	Teneriffae Quoy Madeira	0,60—1,00
Melanocephalus Kal. „	0,75	Truncata Btgg. Krain	0,40
Paralimax		Helicaron	
Reibischi Smr. Kaukas. (Alcohol)	1,00	Flemingii Mar. Moulmein	1,25—2,00
Arion		Nanina	
Bourguignati Mb. Sachsen (Alcohol)	0,25	Amboinensis Mrts. Ins. Haruku	0,60
Hortensis Fer. „	0,25	Atrofusca Alb. pass Borneo	3,00
Dandebardia		Brookei Ad. Borneo	5,00—9,00
Rufa Drp. Dresden	1,50	do. var. Brunnei	4,50
Oleaciua		Citrina L. Amboina	0,50—1,00
Decussata Dkr. Guatemala	3,00—4,00	v. Dimidiata Fer. Amboina	1,20
Solidula Pfr. Cuba	0,40—0,60	Clypeus Mss. sup. Java	3,00
Subulata Pfr. „	0,50	Corrota Mss. Java	2,50
Glandina		Humphreysiana Lea todt Sumatra	0,50
Sandbergeri fossil N. Böhmen	0,50—0,60	Maxima Pfr. Mindanao	5,00—10,00
Streptaxis		Mindaiensis Bk. Mindanao	2,50
Apertus Mrt. Rio Grande do Sul	1,50—2,00	Mindanaensis Smp. Mindanao	2,00—3,00
Deformis Fer. Venezuela	0,50	Muelleri Pfr. Mindoro	2,50—3,50
Nobilis Gray Liberia	1,00—1,50	Ovum Val. sup. Mindoro	2,00
Ennea		Rareguttata Mss. Flory	2,50—3,00
Bicolor Htt. Philippinen	0,40	Renitens Mrl. Mayotte	2,50
Buchholtzi Mrt. Camerun	1,50	Schuhmacheriana Pfr. Palawan	2,00—3,50
Cavidens Mrt. „	1,00—1,50	Semiglobosa Pfr. Mindanao	1,00—1,50
„ var. an n. sp. Camerun	2,00	Semigranosa Rv. Luzon	1,00—2,00
Columellaris Mrt. „	1,00—1,50	Troglydites Mor. Camerun	2,00—3,00
Conica Mrt. „	1,50—2,00	v. Castanea Camerun	3,00
Insignis Pfr. „	2,50—4,00	n. sp. Camerun	2,00
v. Laevigata Mrt. „	2,50—3,50	Unbilicaria Gill. Java	1,50
Monodon Morl. „	1,75	Euplecta	
Mucronata Mrt. „	1,50—2,00	Cebuensis Mllf. Palawan	0,75
Stylodon Mrt. „	2,50	Trochouanina	
Trigonostoma Mrt. „	1,50—2,00	Conicoides Metc. Palawan	0,50—0,75
v. Complicata Mrt. „	2,00	Jenyssi Pfr. Mozambique	0,60—1,00
Streptostele		Percarinata Mts. „	1,00
Buchholtzi Mrt. Camerun	1,00—1,50	do. Camerun	0,50—1,00
Gibbulina		Subjenyssi Anc. Mozambique	1,25
Bacillus Pfr. Mauritius	0,75	Tumidula Mrt. Camerun	1,00—1,50
Barclayi Ad. „	0,75	Rotula	
Brevis Mrl. „	0,75	Basalis Dhm. Madagascar	0,25—0,40
Callifera Mrl. (todt) „	0,25	Zonitis	
Holostoma Mrl. „	0,60	Acies Ptsch. Dalmatien	0,20—0,40
Modiola Fer. Mauritius	0,75	Jalapensis Strb. Mexico	0,30—0,50
Mondraini Ad. „	0,75	Kobelti Btgg. Taygetos	2,50
Newtoni Ad. „	1,00	Oculus-capri Mll. Marseille	0,50—0,60
Palanga Fer. Mauritius	0,40—0,60	Pergranulatus God. Ins. Amorgo	0,60
Striaticostata Mrl. H.Q. Mauritius	0,30	Verticillus Fer. Krain	0,20—0,30
Sulcata Mll. „	0,80—1,20	v. Euboeicus Kob. Mte. Delphi	0,30—0,60
Helodes Mor. subfoss. „	0,40	Volutella Pf. Azoren	0,30—0,40
Lyonetiana Pll. „	2,00—3,00	Archeozonitis	
Pagoda Fer. „	1,00—1,50	Haidingeri fossil N. Böhmen	0,80
Vitrina		Hyalina	
Alpestris Clss. Tirol	0,30—0,40	Achlyophila Brg. Oran	0,30—0,50
Annularis Std. Krim	0,40	Aequata Mss. Chalkis	0,10—0,50
Brevis Fer. Heidelberg	0,20—0,30	Alhambra Kob. Alhambra	0,30—0,50
Brumalis Mrl. Azoren	0,50	Alleryi Paul. Palermo	0,60—0,80
Diaphana Drp. Sachsen	0,10	Arborea Say Indiana	0,25
Elongata Drp. Baiern	0,20	Atlantica Mrl. Azoren	0,35
Lamareki Fer. Madeira	0,60—0,75	Cellaria Mll. Sachsen	0,10—0,20
Major Fer. Rhône	0,25	Cheilia Brg. Oran	0,30—0,50
Pellucida Mll. Westfalen	0,10—0,20	Circumfirmata Rdf. Bermudas	0,40—0,75
Sowerbyana Pfr. mit Thier. Gabun	2,50	Crystallina Mll. Krain	0,10—0,20

	Mark		Mark
Dentata fossil. N. Böhmen	0,40	Balmei P. & M. Malta	0,75
Diaphanella Krm. Krim	0,50	Bianca Httm. N. Zealand	0,50
Draparnaldi Bck. Guernsey	0,20—0,30	Biconcava Pfr. N. Zealand	0,60
Exigua Stp. Nordost-Ohio	0,35	Bifrons Love Madeira	0,40
Farinesiana Brg. Barcelona	0,25—0,40	Buccinella Ry. N. Zealand	0,50
Fuliginosa Grff. Cincinnati	0,50—0,75	Coma Gray N. Zealand	0,50
Fulva Drp. Barcelona	0,15	Erdeli Roth. Beirut	0,50
Fulva Mll. Ohio	0,25	Fratercula Pse. Raiatea	0,20
Galra Std. Sachsen	0,15	Heynemanni Pfr. Tahiti	0,20
Gularis Say Georgia	0,50	Infecta Reeve N. Zealand	0,50
Hemipsorika Brg. Oran	0,20—0,40	Lucetta Httm.	0,50
Jebsuticia Rth. pass. Beirut	0,25	Nerissa	0,50
Incerta Drp. St. Sauveur	0,40—0,50	Panper Gld. Yokohama	0,50
Indentata Say Washington	0,40	Perspectiva Say Indiana	0,10—0,20
Libanica Naeg. Libanon	0,75—1,00	Pseudoleioda Sdr. N. Zealand	0,60
Ligera Say Missouri	0,30—0,50	Pygmaea Drp. Danzig	0,20
v. minor. Ohio	0,25	Rotundata Mll. Barcelona	0,15
Limatula Wrld. Washington	0,35	Rubiginosa Gld. Sandw. Ins.	0,30—0,50
Lineata Say Pennsylvanien	0,40	Ruderata Std. Tirol	0,10—0,20
Melitensis Kob. Malta	0,50—1,00	Rupestris Drp. Rigi	0,10
Milium Mrs. Nordost-Ohio	0,40	do. Barcelona	0,10
Niteus Mich. Croatien	0,10—0,20	v. Saxatilis Gr. Parnass	0,25
v. Resmanni Wstl. Tarvis	0,30	Solaria Muk. Graz	0,10—0,20
Nitida Mll. Barcelona	0,10	Solitaria Say Columbia	0,40—0,50
v. Lucida Drp. Sachsen	0,10	Striatella Anth. Indiana	0,20—0,30
Radiatula Gray Luttach	0,20	Tapirina Httm. N. Zealand	0,50
Subrimata Rnh.	0,10—0,20	Timandra Httm.	0,50
Suppressa Say Tennessee	0,35		
Suburbana Mnt. def. Palermo	0,30—0,50		
Testae Phl. Sicilien	0,40—0,60		
Villae Mrt. Bregenz	0,20—0,30		
Viridula Mke. New-Jersey	0,30		
Leucochroa			
Adanensis Naeg. Cilicien	0,75		
Argia Brg. Bône	0,40—0,50		
Candidissima Drp. Algier	0,10—0,20		
do. sup. Oran	0,20—0,30		
do. var. Barcelona	0,20		
Cariosa Ol. Beirut	0,20—0,30		
Cariosula Mich. Oran	0,20		
v. Depressa Forb. Oran	0,30		
Debeauxi Kob. Algier	0,30—0,40		
Jeannotiana Trv. Bougie	0,30		
Kobeltiana Deb. Oran	0,50—0,75		
Mayrani Gass. Oran	1,00		
Othiana Frb. Constantine	0,30—0,40		
Trochomorpha			
Beckiana Fer. Luzon	0,30—0,50		
Bicolor Mrt. Borneo	0,60		
Boholensis Sper. Palawan	0,50		
do. ?? Zamboanga	0,50—0,75		
Loocensis Hldg. Palawan	0,50		
Metcalfei Pfr. defect Luzon	0,20		
Rectangula Pfr. Marquesas	0,30		
Swainsoni Pfr. Tahiti	0,30—0,50		
Trochiformis Fer. Tahiti	0,25—0,40		
Punctum			
Pygmaeum Drp. Nordost-Ohio	0,25		
Patula			
Acetabulum Pse. Raiatea	0,20		
Alternata Say Ohio	0,25—0,40		
		Helix	
		Abjecta Lw. Madeira	0,30
		Abrolena Brg. Ins. Habibas	0,40—0,75
		v. Albida Brg. Ins. Habibas	0,60—0,80
		Abylensis Kob. Marocco	0,60
		Achatina Gray Monlmein	1,00—1,50
		Acompia Brg. Algier	0,25—0,40
		Aculeata Mll. Tirol	0,20
		Acuta Müll. Cabourg	0,10
		Adansonii Wbb. Caparen	0,50—0,60
		Advena Webb. Caperden	0,20—0,30
		Aegusae Kob. Sicilien	0,50
		Aemula Rssm. Tirol	0,20
		Alabastrites Mich. Oran	0,20—0,30
		v. Alba	0,40
		v. Depressa Mich. Nemours	0,30
		Alanda Fer. Cuba	0,30—0,50
		Albolabris Say Kentucky	0,30—0,40
		Ambigua Parr. Graecia	0,30—0,75
		Ammonis Schm. Verona	0,30
		Ambiclionia Pld. Paris	0,20
		Amoena Pfr. Luzon	0,75—1,00
		Apaloleno Brg. Barcelona	0,40
		Aperta Born Hyère	0,20
		Apicalis fossil N. Böhmen	0,30
		Apicina Lm. Rom	0,10
		Apiculus Rssm. Lampedusa	0,50
		Arbustorum L. Saalethal	0,10
		do. sup. N-Oesterreich	0,10
		v. Alpicola Andermatt	0,20
		do. sup. Seiseralpe	0,25
		v. Flavescens Dep. Isère	0,25
		v. Straminea Taminaschnucht	0,20
		v. Xatarti Far. Pyren. or.	0,50

	Mark		Mark
Arcadica Parr. Ins. Syra	0,40	Chottica Ancey Algier	1,00—1,50
Arcta Lw. Madeira	0,30	Ciliata Vnz. Alp. marit.	0,30
Arenarum Brg. Alger	0,30—0,50	Cineta Mll. Taurus	0,30—0,50
Argentea Rv. Mauritius	0,40—0,60	Cingulata Std.	
Argillacea Fer. Timor	0,50	v. Ananiniensis Btt. Bozen	0,20 0,30
Arigonis Rm. Barcelona	0,20—0,40	v. Minor Grdl. Bozen	0,20
Armillata Lw. Azoren	0,20	v. Planata Tirol	0,20 0,30
Arpatschaiana Mss. Persien	0,50	Cingulella Zgl. Carpathen	0,20 0,30
Arrosa Gld. Californien	1,75	„ f. minor. Brsk. Trencsin	0,25
Asennis Bgt. Cilicien	0,80—1,25	Clausa Say. Ohio	0,75
Aspersa Mll. Pola	0,10—0,20	Clotho Fer. Madagasear	2,50 4,50
do. v. Flava sup. Lyon	0,75	Cobresiana Alt. Landsberg	0,10
do. minor sup. Azoren	0,50	Codringtoni Gray sup. Taygetos	0,80—1,50
do. England	0,15	v. Aetolica Bttg. Veluchi	1,00
Atrolabiata Krm. Caucasus	0,80—1,20	v. Parnassica Rth. Parnass	0,40—0,60
Attaramensis Thb. Moulmein	0,80—1,00	Coelata Std. Bayern	0,20
Andouini Orb. H. Qual. Bolivien	3,00—4,00	Coerulans Mll. Krain und Croatien	0,20
Auricoma Fer. Cuba	0,50—1,00	Colomiesiana Brg. Oran	0,20—0,30
Axia Brg. Malaga	0,50—0,75	Colubrina Jan. Tirol	0,25—0,35
Balearica Zgl. Majorque	0,30—0,50	„ v. minor sup. Gardasee	0,40
Banatica Ptsch. Banat.	0,40—0,60	„ schöngezeichnet Valsabbia	0,50
Barbula Rssm. Azoren	0,30—0,40	Columbiana Lea S. Francisco	0,30—0,40
Bargesiana Brg. Beyrut	0,30—0,40	Compacta Lw. Madeira	0,30
Barneana Ancey Algier	1,00	Conoidea Drp. Alger	0,10—0,20
Bathylaena Brg. Mahon	0,35	Consors Lw. Madeira	0,30
Bathyomphala Chrp. Ascoli-Piceno	0,20	Conspurcata Drp. Barcelona	0,10—0,20
Bayamensis Pfr. Cuba	1,00	Constantina Forb. Constantine	0,30—0,40
Berlieri Mrl. Oran	0,30—0,40	Coquandi Mrl. Algesiras	0,30—0,50
Berytensis Fer. pass. Beyrut	0,50	v. Nahoni Kob. Tetuan	0,75—1,00
Bidens Ch. Sachsen	0,10	Coreyrensis Ptsch. Korfu	0,20—0,30
Bipartita Fer. Cooktown	2,00	Cornea v. Squammatina Pyren. or.	0,75
Bleicheri Pld. Tanger	0,60	Cossoni Let. Barcelona	0,25—0,40
Boghariensis Deb. Boghar	0,60—0,80	Costata Mll. Catalon. u. Westfalen	0,10
Bohemica fossil. N. Böhmen	0,30	„ Amur	0,15
Brevidens Sw. Mindoro	2,50	v. Pulchella Mll. Alger	0,10
Brocheri Gtr. Cuba	0,80—1,00	Cretia Fer. Ins. Syra	0,10—0,30
Buculenta Gld. Amer. bor.	0,30—0,50	v. Cauta Wstl. Attica	0,30—0,50
Bulweri Wd. Porto Santo	0,30—0,40	Cyclaria Mrl. subfoss. Mauritius	0,60—1,00
Calathus Lw. Madeira	0,40	Cyziciensis Gall. Mahon	0,25
Calculus Lw. Madeira	0,30—0,40	Dastuguei Brg. Oran	0,50—1,00
Caldwelli Bns. Mauritius	0,50	Dealbata Lw. Madeira	0,30
Californiensis Lea Californien	1,00	Delphinula Lw. subf. Madeira	0,50—0,60
Caloea Brg. Barcelona	0,35	Demissa Ben. Sicilien	0,60
Calva Lw. Madeira	0,30	Depilata Pfr. Königsberg	0,20
Calypso Ben. Sicilien	0,50	Depressula Par. Oran	0,20—0,40
Candicans Zgl. Dresden	0,10	Derbentina Krm. Taurus	0,20—0,40
v. Obvia Hrt. Parnass	0,20	v. Suprazonata Mss. „	0,30—0,60
v. Graeca Mss. „	0,20—0,30	Derogata R. v. Muricea Rm.	
Candidula Std. Mainz	0,10	Cartagena	0,30—0,40
Candiota Frv. Ins. Syra	0,25—0,50	Desertorum Frsk. Libysche	
Cantiana Mft. Cambridge	0,20	Wüste	0,20 0,30
Caperata Mtg. Lissabon	0,10—0,20	Desmoulinsii Far. Pyren. or.	0,50
Carascaloides Bgt. Amasia	0,40—0,50	Destituta Chrp. Ascoli-Piceno	0,20
Carpenteriana Bld. Florida	0,50	Devexa fossil. N. Böhmen	0,30
Carsoleana Fer. Italien	0,20—0,30	Dirphica Ble. Mte. Delphi	0,40—0,60
Carthaginensis Rss. Carthagera	0,40—0,80	Discina Lw. Madeira	0,30
Carthusiana Mll. Croatien u. Florenz	0,10	Divesta Gld. Arkansas	1,00
Caruanae Kob. Malta	0,60—1,00	Djebbarica Brg. Oran	0,50—0,75
Cepoides Lea Luzon	5,00—7,00	Discina Lw. Madeira	0,30
Cespitum Drp. Algier	0,20—0,30	Doubleti Brg. Oran	0,50—0,60
Chamaeleon Parr. Krain	0,20	Donneti Brg. pass. Algier	0,60
Cheiranthienla Lw. Madeira	0,30—0,40	Drepanensis Ht. Sicilien	1,00

	Mark		Mark
Dschulfensis Dub. Kurdistan . . .	2,00	Incarnata Mll. Dresden . . .	0,10
Edwardsi Bln. Californien . . .	1,00	Inflecta Say Indiana . . .	0,20—0,30
Ehrenberghi Rth. Arabische		Instabilis Zgl. Transsylv. . .	0,20—0,30
Wüste . . .	0,75—1,50	Intermedia Fer. Krain . . .	0,20
Elata Faur. Trapani . . .	0,20—0,30	Intersecta Poir. Pyrenäen . . .	0,20
Elegans Gm. Malaga . . .	0,10—0,20	Intumescens Mrts. Java . . .	0,75—1,00
Elevata Say Indiana . . .	0,40—0,50	Inversicolor Fer. Mauritius . . .	0,75—1,00
Eremophila Bss. Arab. Wüste	0,50—1,00	Interpres Westl. Boeotien . . .	0,40—0,50
Ericetorum Mll. Kösen . . .	0,10	Joppensis Rth. Beyrut . . .	0,30—0,40
Erinaceus Pfr. vera N. Guinea	1,50	Jourdaniana Brg. Tlemcen . . .	0,40—0,50
Erubescens Lw. Azoren . . .	0,50—0,80	Juiletti Terv. Oran . . .	0,30—0,40
Euphorca Brg. Alger . . .	0,20—0,30	Kelletti Frb. Californien . . .	1,00
Fallaciosa Fer. Madras . . .	0,30—0,50	Kreglinger Zel. Ins. Syra . . .	0,30—0,40
Fallax Say Tennessee . . .	0,40—0,50	Krynckii And Syrien . . .	0,30—0,40
Fasciolata Poir. Bruxelles . . .	0,20	v. Multinotata Mss. Taurus . . .	0,20—0,50
Faustina Zgl. Transsylvanien	0,20—0,30	Labyrinthica Say Illionis . . .	0,10—0,20
Febigeri Blnd. Florida . . .	0,50	Lactea Mll. Alger . . .	0,10—0,20
Fibula Brd. Luzon . . .	0,75—1,00	v. alba Oran . . .	0,35
Figulina Parr. Chalkis . . .	0,30—0,40	Lamellata Ifr. Yorkshire . . .	0,20—0,30
„ var. Taurus . . .	0,40	Lanx Lam. Madagascar . . .	2,00
Fleurati Brg. Tunis . . .	0,40—0,50	Lapicida L. Dresden . . .	0,10
v. albina Tunis . . .	0,50	Lasallei v. Globosa Drn. n.	
v. major Tunis . . .	0,60	var. Cottabato . . .	3,50—5,00
Foetens Std. Tirol . . .	0,10—0,20	Lasallei v. Mindanensis Dhr.	
v. Ichthyomma Hld. Brenner . . .	0,20	n. v. Mindanao . . .	3,50—5,00
Fontenillei Mich. Dep. Isère . . .	0,30	Ledereri Pfr. Beyrut . . .	0,20—0,40
Fruticum Mll. Kösen . . .	0,10	Lefeburiana Fer. Krain . . .	0,20—0,30
Furcillata Hp. Amazon . . .	5,00	Lens Fer Mte. Delphi . . .	0,10—0,20
Fusca Mtg. Yorkshire . . .	0,30—0,40	v. Callojuncta Ble. Lepante . . .	0,25
Fuscolabiata Poey Cuba . . .	0,60—1,00	v. Lentiformis Zgl. Mte. Delphi	0,10—0,20
Gargottae Phl. Sicilien . . .	0,40	Lenticula Fer. Madeira u. Span.	0,10—0,20
Gallopavonis Val. Bahama . . .	0,80	Lentiginosa Lw. Madeira . . .	0,20—0,30
Geryvillensis Brg. Oran . . .	0,40	Leptostyla Dohrn. Capverden . . .	0,40—0,50
Ghiesbreghti Pfr. Guatemala . . .	5,00	Leucozona Zgl. Kärnten . . .	0,20—0,30
Glasiana Sh. Canaren . . .	0,40—0,50	Leucostyla Pfr. Mauritius . . .	0,75—1,00
Globularis Zgl. H. Qual. Palermo	0,15	Lima Fer. Portorico . . .	0,80—1,20
Globuloidea Terv. Oran . . .	0,50	Listeri Gray Luzon . . .	1,00
Gobanzi Frfl. Tirol . . .	0,25—0,50	v. minor . . .	0,75
Godetiana Kob. Naxos . . .	2,50—3,00	do. Mindoro . . .	0,50—0,80
Gouini Deb. Oran . . .	0,60	v. ? Luzonica Luzon . . .	0,60—1,00
Graeseri Mouss. Amur . . .	1,50	Locheana Brg. Alger . . .	0,40—0,60
Granonensis Srv. Barcelona . . .	0,35	Loricata Gld. Californien . . .	0,30
Grata Mich. N. Guinea . . .	4,00—5,00	Lucasii Dsh. Oran . . .	0,30—0,40
Gratulator Blf. India . . .	1,25	Lucorum Mll. Gardasee u. Lyon	0,30—0,40
Guttata Ol. v. Maxima Hadjin	3,00—5,00	Lucubensis Crss. Nossibé . . .	3,00
Halophila Dbx. Oran . . .	0,30—0,50	Lugduniaca Mab. Lyon . . .	0,25
Harpa Say Ohio . . .	0,40—0,50	Luteata Parr. Gibraltar . . .	0,30—0,40
Hartwegi Pfr. Ecuador . . .	2,50	Lutescens Zgl. Transsylv. . .	0,30—0,40
Henoniana Bgt. Alger . . .	0,40—0,50	Maacki Grstf sup. Amur . . .	0,50—1,50
Hermesiana Pn. Mte. Presolano . . .	0,30	Macrostoma Mll. Sicilien . . .	0,30—0,40
Heripensis Mab. Lyon . . .	0,25	Maderensis Wood. Madeira . . .	0,20—0,30
Hieroglyphicula Mll. Oran . . .	0,20—0,30	v. Major Madeira . . .	0,40
Hirsuta Say Indiana . . .	0,20	Magnifica Pfr. Madagascar . . .	2,00—4,00
Hispida L. Sachsen . . .	0,10	Mamilla Fer. Celebes . . .	6,00
Hispidula Lm. Canaren . . .	0,40—0,60	Maresi Crss. Süd-Oran . . .	0,50
Holoserica Std. Sachsen . . .	0,10	Maritima Drp. Marseille . . .	0,10—0,20
Hortensis Mll. Kösen . . .	0,10	v. Major Dep. Var. . .	0,30
Hueti Ben. Sicilien . . .	0,30—0,50	Marmorata Fer. Gibraltar . . .	0,30
Hügeli Pfr. Luzon . . .	1,00—1,50	v. Rondensis Kob. Ronda . . .	0,75
Japonica Pfr. Yokohama . . .	0,80—1,20	Maroccana Mrl. Tetuan . . .	1,00—2,00
Illibata Parr. Oran . . .	0,30—0,60	Martensiana Tib. Abruzzen . . .	0,20—0,30
Implicata Nev. Mauritius . . .	0,75—1,00	Massylaea Mrl. Constantine . . .	1,50—2,00

	Mark.		Mark.
v. Zonatia Kob. Constant.	1,50—1,75	Pechaudi Brg. Oran	0,50
Mauritanica Brg. Mascara	0,20—0,30	Peliomphala Pfr. Yokohama	0,75—1,25
Mazzullii Jan. Sicilien	0,20—0,40	Penchinati Brg. Barcelona	0,25
Meda Porr. Malta	0,20—0,30	Pennsylvanica Grn. Indiana	0,30
Melanostoma Drp. Dep. Var.	0,20—0,30	Personata Lm. Savoyen	0,10—0,20
Melanotragns Brn. pass Ceylon	0,60	Phalerata Zgl. Krain	0,20—0,30
Melanthozona Caf. Barcelona	0,30—0,40	Phari Fag. Triest	0,15—0,25
Melitensis Fer. Malta	0,25	Philammia Brg. Arab. Wüste	0,50—0,75
Mendranoi Srv. Algier	0,40	Phleobophora Lw. Madeira	0,40—0,50
Meridionalis Parr. Oran	0,20—0,30	Picta Brn. sub. Cuba	1,00—1,50
Michaudi Dsh. Madeira	0,20	do. jung Cuba	0,20—0,50
Middendorfi Grst Amur	2,00—3,00	Pileus Mll. Aru Ins.	1,00—1,50
Mignelina Pfr. Azoren	0,40—0,60	Pisana Mll. u. var. Teneriffa	0,10
Minoriensis Mtr Mahon	0,50	do. v. minor Malta	0,20
Minuscula Bnn. Washington	0,35	do. var. Beirut	0,10—0,20
Misaro Brg. Barcelona	0,25	Planata Chm. Marocco	0,50—1,00
Mitchelliana Lea Ohio	0,30	Planospira v. Setulosa Brg.	
Modesta Fer Canaren	0,60—0,75	Ascoli	0,40—0,60
Monierana Brg. Nemours	0,50	Planulata Lam. Luzon	0,50—1,00
Monistrolensis Fag. Barcelona	0,40	Platycheila Mke. Palermo	0,25
Monodon Rekt. Ilionis	0,25	Plebeja Drp. Rhône	0,20
Moricandi Sow. Luzon	0,75—1,50	Plicata Brn. Venezuela	1,50
Mosthorella Pch. Palermo	1,00	Polymorpha Lw. Madeira	0,20—0,30
Multilineata Say Amer. bor.	0,30—0,40	Pomatia L. Dresden	0,10
Multizona Lss. N. Guinea	6,00	v. Lednicensis Brsk. Trencsin	0,40
Muralis Mll. Mahon	0,10	Ponsonbyi Kob. Oran	0,50
Muscicola Brg. Beirut	0,30—0,50	Portosantana Sw. Portosanto	0,40—0,60
Nautiliformis Prr. Lombardia	0,40—0,50	Poupillieri Brg. Alger	0,75
Nebrodensis Mdr. Nebrodi	0,30	Ponzolzii Dsh.	
v. Plana Castelbuona	0,20—0,40	v. Montenegrina Zgl. Dalmatien	0,40—0,50
Nemoralis L. Dresden	0,10	Praeclara Caf. Sicilien	0,35
do. Juraform	0,15	Preslii Schm. Berchtesgaden	0,20—0,30
do. Alpenform	0,10	v. Affinis Paul. Lucca	0,40—0,50
v. Albolabiata L. Basel	0,20	Profuga Schm. Toscana	0,10—0,20
v. Fuscolabiata Krainer Alpen	0,15	v. Meridionalis Mss. Ins. Syra	0,20
Niciensis Fer. u. var. Alp. mar.	0,20—0,30	v. Jonica Zante	0,20
Nitidiuscula Sw. Madeira	0,30—0,40	v. Smyrnensis Btg. Smyrna	0,20
Nivosa Sw. Madeira	0,75	Profunda Say Kentucky	0,40—0,50
Nonlifera Sht. Florida	0,40	Protea Zgl. Graecia	0,20—0,30
Nordmanni Prr. Caucasus	0,75	Provincialis Ben. Sicilien	0,50
Nubigena Sle. Ht. Pyrénées	0,40	Ptychodia Brg. Aegypten	0,50—0,75
Nummus Ebg. Beirut	0,15—0,25	Pulvinata Lw. Madeira	0,30—0,40
Nyeli Mts Balearen	0,40	Punctata Mll. Oran	0,20—0,30
Obscrata Lw. Madeira	0,20—0,30	v. major Tlemcen	0,50
Obvoluta Mll. Rhône	0,10	v. Albicans Brg. Oran	0,60
Obtusicarinata foss. N. Böhmen	0,80	v. Punctatissima Jen Mostag- hanem	0,30—0,40
Odopachya Brg. Algier	1,50	Punctulata Sw. Porto Santo	0,30—0,40
v. Duriezi Deb. Süd-Oran	1,50	Punica Mrl. Lambessa	0,80—1,00
Olivieri Fer. Rhodus	0,20	Pyramidata Drp. Alicante Ins. Syra	0,10
Oranensis Mrl. & var. Oran	0,20—0,30	Pyrenaica Drp. Pyrenäen	0,40
Oranica Bgt Nemours	0,35	Pyrostoma Fer. Halmahera	8,00—12,00
Oreas Koch Cauca	4,00	Quaesita Dsh. Yokohama	1,25—2,50
Orsinii Porr. Mt. Morrone	0,30—0,50	do. var. Castanea Yokohama	3,00
Osculum fossil N. Böhmen	0,25	Raymondi Moq. Boghar	0,80—1,00
Pachya Brg. subf. Beirut	0,75—1,25	Reboudiana Brg. Algier	0,30—0,40
Palawanica Pfr. Palawan	2,50—4,00	Reticulata Pfr. Californien	1,00—1,50
do. castanea Palawan	4,00—5,00	Rivoli Dsh. Ceylon	1,00
do. var ?? Palawan	4,00—5,00	Robusta fossil N. Böhmen	1,00
Pallata Say Ohio	0,40—0,50	Rothi Pfr. Cycladen	0,20—0,40
Papyracea Brd. Mindoro	3,00—4,00	Rotula Lw. Madeira	0,40
Parrajana Orb. Cuba	1,00—1,50	Rubella Rss. Lyon	0,20
Paupercula Lw. Madeira	0,20		

	Mark.		Mark.
Rubens Mrt. Turkestan	2,00	Thiarella Web. Madeira	0,20
Rufescens Pnn. Bayern	0,10—0,20	Thiesseana Kob. Enboea	0,60
v. Danubialis Clss. Regensburg	0,10—0,20	Thyroides Say Ohio	0,30—0,40
v. Montana St. Württemberg	0,10—0,20	Tigriana Brg. passab. Oran	0,45
Rufolabris Ben. Palermo	0,35	Tigrina Jan. Lombardei	0,20—0,30
Rufozonata Ad. Mauritius	0,50	Tineana Ben. var. Sicilien	0,30—0,40
Rugeli Shtl. Tennessee	0,50	Townsendiana Lea Californien	1,00—1,50
Rugosiuscula Meh. Würtemberg	0,15	Trailli Pfr. Palawan	3,50—6,00
Sadleriana Zgl. Görz	0,20	Tridentata Say Ilionis	0,40
Sagemon Beck. Cuba	1,00—2,00	Trochoides Poir. Lyon	0,10—0,20
do. Il. Qual.	0,50—1,00	Turbinata Jan. Ins. Syra	0,20—0,30
Sarcostoma Wbb. Ins. Lanzerotte	0,80—1,00	Umbilicaris Brm. Lombardei	0,20—0,30
Sarriensis Mtl. Barcelona	0,30	v. Stabilei Paul Tirol	0,35
Scenoma Bens. Moulmein	1,50	Umbrosa Prtsch. Sachsen	0,10—0,20
Selskyi Grst. sup. Amur	2,00—3,00	Undata Lw. Madeira	0,40—0,50
„ var.	2,50—3,00	Unidentata Drp. Bayern	0,15
Septemvolva Say Florida	0,25	Urmiensis Naeg. Persien	2,00
Secernenda Ssm. Mostar	0,30—0,40	Variabilis Drp. Balearen	0,10—0,20
Serica Drp. Dresden	0,10—0,20	v. Virgata Mtg. Cambridge	0,10—0,20
Serpentina Fer. St. Cyr.	0,20	Varians Mke. Bahama	0,20—0,30
Sepulcralis Fer. Madagascar	0,80—1,00	Vatonniana Brg. Boghari	0,50
Serta Alb. Capverden	0,30—0,40	Ventrosa Ver. Madeira, Cycladen	0,30
Schmidtii Zgl. Kärnthen	0,20—0,30	Vermiculata Mll. Italien	0,10—0,20
Sicana Fer. Sicilien	0,20—0,30	do. var. Ins. Syra	0,20
Sigensis Kob. Algier	1,00—1,50	v. albicans Malta	0,20
Silvestri Caf. Sicilien	0,60	Verrucosus Mont. Sicilien	2,00
Similaris Fer. St. Catharina	0,20	Versicolor Brn. Cuba	0,60—0,80
„ Luzon	0,15	Vindobonensis Pfr. Kärnthen	0,10—0,20
„ var. „	0,20	Vittata Mll. Madras	0,30—0,50
„ Mauritius	0,20	Volvoxia Parr. Texas	0,25
Soluta Mich. Oran	0,40—0,50	Vulgata Lw. Porto Santo	0,50
Souverbiana Fsch. Madagascar	3,00—4,00	Xalonica Sr. Barcelona	0,35
Spadae Cle. Mte. Sibilla	0,40	Zafferina Terv. Oran	0,20—0,40
Sphaeriostoma Brg. Chalkis	0,30—0,50	v. Zelleri Kob. Mascara	0,20—0,40
v. Enboea Kob. Mte. Delphi	0,50—0,50	Zaleta Say Ilionis	0,40—0,50
Sphaerita Mrl. Oran	0,20—0,30	v. Exoleta Bnn. Ohio	0,50—0,75
Spirorbis Lw. Madeira	0,20	Zonaria v. Fasciata Lss. Amboina	1,25
Splendida Drp. n. var. Dep.Var.	0,10—0,20	v. Nitidiuscula Bttg. Ins. Haruku	1,25
Spratti Pfr. Malta	0,35—0,50	Zonata v. Rhaetica Mss. Tirol	0,30—0,40
Stellaris Lw. Madeira	0,40	Zonitomaea Let. Algier	1,50—2,00
Stenostrema Fer. Indiana	0,75		
Striata Mll. Aschersleben	0,10—0,20	Corasia	
Subaquila Sh. Portorico	0,30—0,40	Aegrota Ry. Mindoro	2,50—3,50
Submaritima Brg. Algier	0,15—0,20	Lais Pfr. Sulu-Ins.	1,75
Submeridionalis Brg.	0,50—0,60	Tukanensis Pfr. Sulu-Ins.	2,00
Subplicata Sw. Ins. Baixo	2,50		
Subrostrata Fer. Oran	0,30—0,40	Cochlostyla	
Substrigatus Brg. Marsala	0,60	Alberti Brd. Luzon	5,00—7,50
Surrentina Schm. Sorrento	0,20	Aspersa Grt. „	1,50—2,00
Sylvatica Drp. Schaffhausen	0,20	Brachyodon Sw. Luzon	3,50—5,00
Syrensis Pfr. Ins. Syra	0,50	Cinerosa Pfr. sup. Palawan	2,50—4,00
Syriaca Ebg. Beirut	0,10—0,25	Circe Pfr. sup. Cottabato	2,50—3,50
Systropha Alb. Peru	2,00	v. brunnea „ „	4,00
Tabellata Lw. Madeira	0,30—0,40	Cretata Brd. „ Mindanao	5,00—8,00
Tagina Sw. Tanger	0,60	Curta Sw. Luzon	1,75—2,50
Taurica Krn. Tokat.	2,00	do. var. „	1,50—2,00
Tayloriana Ry. N. Guinea	4,00—5,00	Daetylus Brd. „	4,00
Tenuilabris Brn. Halle.	0,25	Depressa Spr. sup. Mindanao	2,50—3,50
Terrena Clss. Sachsen subfoss.	0,15	v. Obscuro „	3,00—4,00
Terveri Mich. Hyères	0,30	Florida Sw. & var. sup. Luzon	1,00—2,00
Thersites Brd. Mindoro	5,00	Fulgens Sw. Mindoro	1,50—2,50
Textrina Bnn. India	1,50	Fulgens var. sup. Mindoro	2,50—3,00
		Fulgetrum Brd. Philippinen	2,00

	Mark
Leucophaea Sw.	1,25
Melanocheila Val. Luzon	2,50—3,50
Metaformis	1,00—1,50
do. var.	1,50
do. var. ?	2,00
Mindoroensis Brd. Mindoro	1,00—2,00
Mirabilis Fer. Luzon	1,00—1,50
do. var.	1,50
Monozona Pfr.	2,50—4,00
Nebulosa Pfr.	1,50—2,50
Philippinensis Pf.	2,50—3,50
Pithogaster Fer. Mindoro	2,00—3,00
Polychroa Sw. Luzon	1,00—1,50
Reevei Brd. sup.	3,00—5,00
Royssiana Fer.	0,50—1,00
Rufogaster Lss.	2,00—3,50
Smaragdina Rv. Mindanao	2,00—4,00
v. Castanea	4,50
Speciosa Jay Philippinen	1,50—2,50
Villari Hid Luzon	4,00—6,00
Virgata Jay & var. Luzon	1,00—1,50
v. Flava	1,50
div. var. sup. Mindoro	1,50—2,50

Amphidromus

Contrarius Mll. Cooktown	0,75—1,00
Enobaptus Dhrn. Palawan	3,00—4,00
Maculiferus Sw. sup. Cottabato	1,50—2,50
do. var. ?? sup. Mindanao	3,00—4,00
Perversus L. sup. N. Guinea	1,00—1,50
Sinistralis Rv. Celebes	0,75—1,00

Bulimus

Achilles Pfr. S. Paul	3,00
Aconigastanus Dör. Argentinien	1,50
Alexander Css. II. Q. N. Caledonien	3,00
Auris-leporis Brg. Mncury	0,60—0,80
Blainvilleanus Pfr. Venezuela	1,00—1,50
Catharinae Pfr. St. Catharina	1,25
Crichtoni Brd. II. Q. Peru	4,50
Distortus Brg. P. Cabello	0,75—1,00
Doeringi Kob. Argentinien	1,75
Fibratus Mtn. II. Q. N. Caledonien	1,50
Glaber Gm. Venezuela	1,50
Glandiformis Rv. Bogota	2,00
Grayanus Pfr. St. Catharina	1,50—2,00
Huascari Trsch. Peru	6,00—8,00
Krennoicus Orb. II. Q. Bolivien	3,50
Lacunosus Orb. todt Bolivien	1,50
Lynciculus Dev. Peru	5,00
Moritzianus Pfr. Venezuela	2,00
do. jung	0,50
Oblongus Mll.	1,00
do. II. Qual.	0,40—0,60
Piperitus Sw. Peru	2,00—3,00
Popelairianus Nyst. Peru	6,00
Porphyrostomus Pfr. II. Q. N. Caledon.	1,00
Sangoae Tsch. Peru	4,00—6,00
Tupacii Orb. todt. Bolivien	1,75

Bulimulus

Affinis Brd. ? Südamerika	0,50
Altoperuvianus Rv. Peru	1,00—2,00
Andoicus Mor. Peru	1,00—1,50

	Mark
Attenuatus Pfr. Mexico	0,50—0,75
Brachysoma Orb. Bolivien	2,00
Dealbatus Say Texas	0,50
Decoratus Lea Bogota	1,00—1,50
Dentispira Bttg. Peru	1,50
Depictus Rv. Venezuela	0,40—0,60
v. flava	0,40—0,60
v. striata	1,00
Exilis Gm. Antillen	0,10—0,20
Felix Pfr. Cauca	1,00
Ghiesbreghtii Pfr. Guatemala	0,80
Gueinzii Pfr. Peru	2,00
Humboldti Rv. juv. Peru	0,30—0,60
Jonasi Pfr. Guatemala	0,80—1,00
Knorri Pfr. Venezuela	1,00—1,50
Lobbii Rv. Peru	2,00—3,50
Mariae Alb. Mexiko	0,50
Millegranus Mts. II. Q. Peru	1,50—2,50
Musivus Pfr. Amazon	0,75
Obliquus Rv. Bahia	1,00
n. sp. bei Poecilus Orb. Peru	1,50
Protractus Pfr. Amazon	1,00
Sachsei Alb. Ecuador	1,00
Scitulus Rv. Peru	1,00—1,25
Stenacme Pfr. Peru	0,50—0,75
Striatellus Bk. St. Croix	0,50
Virgultorum Mor. Peru	0,50—1,00

Porphyrobaphe

Jostoma Sw. Ecuador	1,50—2,50
Yatesi v. Sublabes Dhn. Peru	6,00—10,00
v. Albolabris Dhr. Peru	8,00

Orthalicus

Fasciatus Mll. II. Q. Cuba	0,60
Melanochilus Val. II. Q. Peru	1,60
Meobambensis Pfr. defekt	5,00
Obductus Shtl. Venezuela	0,75
Regina Fér Amazon	2,00—5,00
v. Incisus Hp. Amazon	5,00
v. Loroisianus Hp. Amazon	5,00

Limicolaria

Rubicunda Sh. Camerun	2,00
Tenebrica Rv. Sierra Leone	0,75—1,50
Turbinata Rv. Sierra Leone	0,50—1,50

Achatina

Calabarica Pfr. Camerun	2,00
Fulica Fer. Mauritius	0,75—1,25
Jostoma Pfr. Camerun	1,00
Marginata Sw. Camerun	1,00—2,00
Mollicella Morl Camerun	2,50
Panthera Fer. Madagascari	0,60—1,00
Purpurea Ch. Sierra Leone	1,00—1,50
Variegata Lm. Sierra Leone	1,00—2,50

Pseudachatina

Downesi Gr. Gabun	1,50—4,00
-----------------------------	-----------

Leia

Maugeri Wood Jamaica	0,20
--------------------------------	------

Macroceramus

Clandens Poey Cuba	0,30—0,50
Gossei Pfr. Jamaica	0,20—0,30
Turricula Pfr. Cuba	0,30
Unicariatus Lm. Cuba	0,50

	Mark
Cylindrella	
Brevis Fer. Jamaica	0,40
Chordata Pfr. Str. Croix	0,40
Elegans Pfr. Cuba	0,30
Gracilis Wd. Jamaica	0,50—0,75
Hanleyana Pfr. Pte. Cabello	0,60
Morini Mrl. Guatemala	0,50—0,75
Poeyana Orb. Cuba	0,30

Buliminus	
Albiplicatus Mrt. Turkestan	0,50
Asiaticus Mrt. Turkestan	0,50
v. Trigonochilus Anc. Turkestan	0,70
Badius Fer. Canaren	0,50
Bergeri Roth Boeotien	0,20—0,30
Caelebs Bns. Moulmein	0,75
Candelaris Pfr. Moulmein	0,60
Cirtanus Mrl. Alger	0,75
Clessini Ret. Krim	0,20—0,30
Cylindricus Mke Krim	0,50
Damarensis Ad. Lüderitzland	0,60
Delibutus Mrl. Azoren	0,60
Detritus Mll. Sachsen	0,10
do. Thessalien u. Persien	0,15
v. Radiatus Brg. Saaletal	0,10
Eburneus Pfr. Cilizien	0,30—0,40
Entodon Mrt. Turkestan	0,70
Episomus Brg. Syrien	0,60
Eremita v. Controversa KobTurkestan	0,60
Fasciellatus Ol Rhodus	0,25
Forbesianus Mor Azoren	0,30
Graecus Pfr. Morea	0,40—0,50
Haberhaueri Dhrn. Turkestan	1,50
Herzensteini Anc. Turkestan	0,60
Hohenackeri Kryn Achalzik	0,40
Jeannoti Trv. Bougie	0,75
Intumescens Mrt. Turkestan	0,50
Jordani Chrp. Beyrut	1,00—1,50
Kabylianus Let Alger	0,30—0,40
Kindermanni Par. Tokat	1,00
Kuschakewitzi Anc. Turkestan	0,60
Labiellus Mrt. Turkestan!	0,50
do. v. Albina Turkestan	0,60
Labrosus Ol. Beyrut	0,75—1,00
Lamelliferus Rssm. Kurdistan	0,20—0,30
Microtragus Rss. Thessalien	0,20—0,40
Montanus Drp. Bayern	0,10
v. Prolongatus Brsk. Trencsin	0,30
Monticola Roth. Parnass	0,50
Niso Riss. Dalmatien	0,20—0,30
Obscurus Mll. Bamberg	0,10
Obtusius Drp. Wien	0,40—0,50
Phasianus Düb. Caucasus	0,25
Planilabris Bttg. Thessalien	0,60
Potatinianus Anc. Turkestan	0,75
Pruninus Gld. Azoren	0,75
Przevalskii Anc. Turkestan	0,60
Pupa Morl. Oran u. Parnass	0,20
Purus Wst. Persien	1,00
Pusio Brd. Syra	0,30—0,40
Quadridentis Mll. Rhône	0,10
Quinquedentatus Mlf. Bergato	0,20—0,30

	Mark
Reversalus Blz. Transsylv.	0,40
v. Venerabilis Blz. Transsylv.	0,30—0,40
Rufostriatus Bns. Turkestan	0,60
do. var. Moulmein	0,75
Salicicola Bns. India	0,60
Scapus Pfr. Kurdistan	1,00
Septemdentatus Roth. Beyrut	0,35
Sidonensis Fer. Beyrut	0,30—0,50
Sindicus Bns. Moulmein	0,75
Sogdianus Mrt. v. major Turkestan	0,60
Spoliatus Prr. Attika	0,50
Spretus Mll. Dalmatien	0,30
Subulatus Rss. Krim	0,30—0,40
Syriacus Pfr. Beyrut	0,60
do. todt Beyrut	0,20
Tauricus v. Zebriola Clss. Krim	0,30
Thiesseanus Mss. Boeotien	0,20—0,30
v. Heliconius Wst. Parnass	0,40
Todillus Mrl. Oran	0,30—0,40
Tournefortianus Fer. Taurus	0,25
Transsylvanicus Kim	
v. Tenuis Blz. Transsylv.	0,60
Tridens Mll. Sachsen	0,10—0,20
v. major Caucasus	0,40
Turgidus Par Graecia	0,60
Ufjalovanus Anc. Turkestan	0,50
Vulgaris Morl. Azoren	0,75
Westerlundi Kob. Taygetos	0,60
Zebra Ol. Eleusis	0,10

Partula	
Inflata Rv. Sandwicks-Ins.	0,75
Otaheitana Brg. Tahiti	0,30—0,50

Prosopaeas	
Acutissimus Mss. Java	0,60

Stenogyra	
Decollata L. Dalmatien	0,10
do. Smyrna	0,15
v. Major Alger	0,30
Gracilis Htt. Adenare	0,20—0,35
do. Amboina	0,30—0,40
Haughtoni Bns. Andamanen	1,00—1,50
Haplostylus Pfr. Peru	0,75—1,50
Involuta Gld. Sierra Leone	0,75
Mamillata Crv. Nossibé	0,35
Oleona L. Venezuela	0,10
Oleata Mrts. Camerun	0,50—1,00
Pileata Mrts. Camerun	0,75—1,00
Striatella Rug. Gabun	0,75
sp. Mindanao	0,20
Terebraster Lm. Cuba	0,50

Rhodea	
Pfeifferi Crss. Columbien	2,00

Cionella	
Lubrica Mll. Sachsen	0,10
do. Amur	0,15
Maderensis Low. Madeira	0,20

Caccilianella	
Acicula Mll. Westfalen	0,10
Brondeli Brg. Alger	0,60
Eucharista Brg. Alger	0,50
Letourneuxi Brg. Alger	0,60

	Mark		Mark
Nanodea Brg. Algier	0,75	v. Titan Brsk. Br. Trencsin	0,35
Ponpillieri Brg. Algier	0,50	Edentula Drp. Marienbad	0,10—0,20
Rhaphidia Brg. Boghar	0,60	do. Nordost-Ohio	0,20
Thaumophila Brg. Alger	0,50	Exigua Ad. Mauritius	0,25
Fernsacia		Fallax Say Long Island	0,15
Agraecia Brg. Saïda	0,30	Fariniesii Dsm. Pyren. or.	0,20
Amblya Brg. Oran	0,20—0,30	Fasciolata Mrl. Azoren	0,50
Azorica Alb. Azoren	0,50	Ferrari Porr. Porto Santo	0,10—0,20
Charopia Brg. Boghar	0,50	Fordiana Strk. Kansas	0,60
Cylena Lw. Madeira	0,50	Frumentum Drp. Rhône	0,10
Dactylophila Iss. Algier	1,20	v. Elongata Rsm. Serajevo	0,10—0,20
Ennychia Brg. Bône	0,50	v. Illyrica Rsm. Makarska	0,10—0,20
Eremiophila Brg. Constantine	0,60—0,75	v. Pachygastris Zgl. Sebenico	0,20
Folliculus Grn. Barcelona	0,10	Granum Drp. Dep. Var.	0,10
do. Algier (Bongie)	0,15	Gularis Rsm. Krain	0,20
Gracilenta Mor. Algier	0,80	Hordeacella Pls. Texas	0,40
Hohenwarthi Rm. Trient	0,30—0,50	Leptocheilos Fgt. Pyren. or.	0,25
Lamellifera Mrl. Constantine	0,50	Marginata Drp. Wales	0,15
Microxia Brg. Orleansville	1,50	Megacheilos v. Avenoides Lombardei	0,25
Moitessieri Brg. Süd-Frankreich	0,80	v. Giganten Rsm. Hte. Pyren.	0,10—0,20
Montana Brg. Tunis	0,75	v. Transiens Gardasee	0,20
Subcylindrica Leach. Cincinnati	0,50	v. Gracilis Rsm. Schweiz	0,20
Terveri Brg. Barcelona	0,40	Michaudi Trv. Algier	0,30
Vescoi Brg. Süd-Frankreich	0,10—0,20	Minutissima Hrt. Landsberg a. W.	0,10—0,20
Azeca		Montserratica Fgt. Barcelona	0,25
Tridens Plt. Harz u. Lourdes	0,20—0,30	Moquiniana Kst. Ht. Pyrénées	0,25
v. Alzenensis Sim. Lourdes	0,35	Mühlfeltei Kst. Dalmatien	0,1
Triticea Lw. Madeira	0,40	Multidentata Ol. Dep. Var.	0,20
Tornatellina		v. Maxima Alp. mar.	0,30
Oblongata Pse. Raiotonga	0,30—0,50	Muscorum L. Halle	0,10
Peporum Gld. Sandwichs Ins.	0,50	Neozelanica Pfr. N. Zealand	0,50
Pupa		Ovata Say Maine	0,25
Aearus Bns. Capverden	0,30—0,40	Ovulum Strk. Florida	0,60
Affinis Rsm. Pyren. or.	0,30	Pagodula Dsm. Berchtesgaden	0,10
Amicta Par. Spezzia	0,30—0,40	Partioti Moq. Hte. Pyren.	0,20
Anceyi Fag. Marseille	0,50	Pellucida Pfr. Amer. bor.	0,15
Ancostoma Lw. Madeira	0,40	do. Portorico	0,20
Angustior Jff. Lauingen	0,10	Penchinatiana Brg. Barcelona	0,20
Antivertigo Drp. Landsberg a. W.	0,10	Pentodon Say Amer. bor.	0,20
Armifera Say Amer. bor.	0,20—0,30	Philippi Unt. Dalmatien	0,10
Avenacea Brg. Girona	0,10	Polyodon Drp. Pyren. or.	0,20
v. Duplicata Kst. Dep. Var.	0,25	v. Ringicula Mich. Barcelona	0,20
Bergamensis Chrp. Bergamo	0,10—0,20	Procera Gld. Washington	0,20
Bigorriensis Moq. Pyrenäen	0,20	Pusilla Mll. Trencsin	0,10—0,20
Bofilli Fgt. Barcelona	0,25	Pygmaea Drp. Dresden	0,10
Bollesiana Mrs. Nordost-Ohio	0,30	Pyrenaearia Bomb. Hte. Pyren.	0,20
Brauni Rm. Hte. Pyren.	0,25	Quinquedentata Brn. Florenz	0,10—0,20
Brondeli Brg. Alger	0,20—0,30	Rhodia Rth. Boeotien	0,10—0,20
Californica Row. S. Francisco	0,20—0,30	Ringens Mich. Hte. Pyren.	0,20
Cinerea Drp. Süd-Frankreich	0,20	Rossmässleri Schm. Krain	0,30—0,40
Contracta Say Indiana	0,40	Rupestris Phil. Palermo	0,20—0,30
Corticaria Say Nordost-Ohio	0,30	Rupicola Say Florida	0,25
Curvidens Gld.	0,30	Secale Drp. Lyon	0,10
Cylindracea Cst. Thessalien	0,10	v. Boileansiana Chrp. Hte. Pyren.	0,20
Cylindrica Mich. Pyren. or.	0,20	Sempronii Chrp. Bozen	0,10—0,20
Doliolum Brg. Eybach	0,10	Similis Brg. Antibes	0,35
v. Critica Pfr. Kurdistan	0,20	Striata Grd. Tirol	0,20—0,30
Dolinum Mich. Ungarn	0,10—0,20	Substriata Jeffr. Harz	0,20
v. Kimakoviczi Brk. Trencsin	0,25	Tingitana Kob. Tanger	0,30
do. f. elongata Brsk. Trencsin	0,25	Tridentata Wlf. Nordost-Ohio	0,25
v. Minima Brk.	0,25	Umbilicata Drp. Barcelona	0,10
do. f. obesa Brk.	0,25	do. Madeira	0,20

	Mark
Variabilis Drp. Gall. mer.	0,10—0,20
Ventricosa Say Amer. bor.	0,25
Vergniesiana Chrp. Hte. Pyren. . . .	0,25
Zospenn	
Reticulatum Hnff. Krain	0,75
Strophia	
Incana Bin. Cuba	0,20
Mumia Brg. Cuba	0,10—0,25
Sagraiana Pfr. Cuba	0,50
Uva L. Curaçao	0,10
Clausilia	
Trsv. = Transsylvanien	
Aculus Bns. Yokohama	0,40—0,50
Adamii Clss. Sicilien	0,60
Adelinae Ben. Palermo	0,40
Aganemnon Mss. Sparta	0,50
Agesilans Mrt. Sparta	0,30
Aggesta Btg. Kaukasus	
Agnata Prt. Croatien	0,10
Agrigentina Brg. Sicilien	0,60
Albocincta Pfr. Dalmatien	0,20
Almissana Kst. Almissa	0,20—0,40
v. Minima Schm. „	0,30
v. Minor Kst. „	0,30
Amorgia Btg. Ins. Amorgo	0,10—0,20
Ampola trans. ad Balsamoi S. Tirol	0,25
Anaphiensis Btg. Ins. Anaphi	0,50
Angustata Blz. Trsv.	0,30
Aproximans Zgl. Kärnthen	0,50—0,60
Aquila Par. Dalmatien	0,30
Arcadica Parr. Morea	0,50—0,60
Asphaltina Zgl. Kärnthen	0,20
Attenicata S. Tirol	0,30
Bergeri Mayr. Predil	0,10—0,20
Biasoletina Chrp. Rovigno	0,50
Bicristata Frv. Euboea	0,20
v. Canaliculata Pfr. Mt. Delphi	0,20
v. Tetragnostoma Euboea	0,20—0,30
v. Volens Btg. Thessalien	0,25
Bidens L. Kösen	0,10
v. Papillaris Mll. Dalmatien	0,20
Bidentata Str. Bayern	0,10
Bielzi Parr. Trsv.	0,20
Bigibbosa Chrp. Taurus	0,40
Bilabiata Wgn. Cattaro	0,50
Biplicata Mtg. Sachsen	0,10
v. Bosnica Km. Travnik	0,20
v. Crassilabris Wstl. Tarvis	0,40
Bitorquata Rsm. Beyrut	2,50
do. II. Qual.	0,60—1,20
Blanci Mrts. Boeotien	0,20
Blanda Kst. Makarska	0,40—0,50
v. Familiaris Wstl. Almissa	0,40
Boeotica Kst. Sparta	0,60
Bogatensis Blz. Trsv.	0,50
Bohemica Clss. Aussig	0,20—0,30
Boissieri Chrp. Beyrut	0,20
Boliviana Btg. (Nenia) Bolivia	2,00
Bosnensis Zel. Travnik	0,60
v. Plivae Brsk. Bosnien	0,75
Bourguignati Chrp. Ins. Andros	0,75

	Mark
Brevior Mrt. Yokohama	0,80—1,00
Byzantina Chrp. Creta	0,30—0,40
Caerulea Fer. Rhodus & Ins. Syra	0,10—0,20
v. Antiparia Btg. Ins. Antiparos	0,20
v. Birugosa Par. Ins. Santorin	0,10—0,20
v. Myconia Btg. Ins. Mycono	0,20
v. Naxia Btg. Naxos	0,10—0,20
v. Nia Btg. Ins. Jos.	0,25
v. Paria Btg. Paros	0,25
v. Thorensis Btg. Ins. Tinos	0,10—0,20
Cana Hld. Danzig	0,10—0,20
v. Transsylvanica Blz. Trsv.	0,25
Candidescens Zgl. Abruzzen	0,10
Canescens Rsm. Trsv.	0,30—0,40
v. Glabrinsecula Rsm. Trsv.	0,40
Carinthiaca Schm. Klagenfurt	0,30
Carniolica Schm. Krain	0,30
Cattaroensis Zgl. Cattaro	0,10—0,25
Chia v. Samia Btg. Samos	0,40
v. Submarginata Btg. Ins. Nicaria	0,40
Cincta Rsm. Kärnthen	0,10—0,20
Cinerea Phl. Capri	0,10—0,20
Clandestina Rm. Amaliopolis	0,35
v. Thiesseae Btg. Almyro	0,60
Comensis Sht. Trient	0,20—0,30
Comm. v. Ungulata Zgl. Tarvis	0,10—0,20
Compressa Pfr. Ins. Cerigo	0,20—0,30
Concilians Schm. Trsv.	0,20
Conemenosi Btg. Patras	0,30—0,40
Confusa Btg. Ins. Cerigo	0,40
Conjuncta Parr. Trsv.	0,25
Conspurcata Jan. Dalmatien	0,10
v. Sebenicensis Vid. Sebenico	0,25
v. Septentrionalis Btg. Veglia	0,20
Corpulenta Frv. Brussa	0,20
Corrugata Drp. Creta	0,40
v. Milensis Milos	0,50
Corynodes Hld. Interlaken	0,10—0,20
v. Saxatilis Hrtm. Schweiz	0,20
Crassilabris Btg. Graecia	0,50
Crispa Lowe Madeira	0,40
Cristatella Kst. Ins. Skyros	0,50—0,60
Critica Blz. Trsv.	0,40
Cruciata Std. Urach	0,10
Cuzmichii Kst. Dalmatien	0,40—0,50
Dacica Frv. Ungarn	0,30
v. Neglecta Brsk. Sarajevo	0,50
Dalmatina Ptsch. Dalmatien	0,20
Decipiens Rm. Dalmatien	0,20—0,30
v. Fascata Mld. Bosnien	0,20—0,30
Delesserti Bgt. Beyrut	0,75
do. II. Qual. Beyrut	0,50
Deltostoma Lw. Madeira	0,20
Densestriata Zgl. Kärnthen	0,10—0,20
Denbelii Kim. Trsv.	0,50
Discolor Pfr. Ins. Cerigo	0,30
v. Inaequata Blnc. Peloponnes	0,50
Dissipata Btg. Lepante	0,60
Dubia Drp. Brenner & Sachsen	0,10
v. Carpathica Br. Trencsin	0,25
v. costata Brsk. Trencsin	0,30
v. minima Brsk. „	0,25

	Mark		Mark
v. Manina Brsk. Trencsin	0,25	Laminata Mtg. Dresden	0,10
v. Trencsiniensis Brk. „	0,25	Latestriata Blz. Danzig	0,20
v. Schlechti Zgl. Tarvis	0,25	v. Septentrionalis Btg. Landsberg a. W.	0,20
v. Vindobonensis Schm. Steiermark	0,20	Leccoensis Vll. Lecco	0,30
Duponxi Naeg. Lib.	0,60—0,75	Leucorhaphé Bln. Ins. Skyathos	0,30—0,40
Elata Zgl. Trsv.	0,20	Leucostigma Zgl. Terni	0,10
Elegans v. Intercedens Schm. Trsv.	0,25	Lineolata Hld	
Elisabethi Mldf. Canton	0,80—1,00	v. Basileensis Fitz. Tarvis	0,20
Eris Schm. Dalmatien	0,60	Lischkeana Parr. Trsv.	0,10—0,20
Eustrapha Btg. Ins. Skyathos	0,60	Livida Mke. Trsv.	0,20
Exarata v. Minor Chrp. Mostar	0,25	v. Bipalutalis Kim. Trsv.	0,25
v. Mostarensis Brsk. Mostar	0,40	v. Lactea Schm. Trsv.	0,20
Exigua Lw. Madeira	0,75	Lopedusae Pfr. Grgenti	0,60
Familiaris Monts. Palermo	0,75	Lorraini Mke. China	0,60—1,00
Fagotiana Brg. Hte. Pyren.	0,20	Lunellaris Pfr. Mt. Delphi	0,20
Fallax Rm. Trsv.	0,20	Macarana Zgl. Dalmatien	0,20—0,30
Filigrana Zgl. Trs.	0,10—0,20	Maculosa Dsh. Boeotien	0,20—0,30
Filmna Parr. Syrien	0,75	Madensis Fss. Trsv.	0,20—0,30
Fimbriata Mlf. Croatien	0,10	Maësta Fer. Beyrut	0,20—0,30
v. Dubiosa Clss. Tarvis	0,20	Mamotica Gl. Malta	0,15—0,20
Flammulata Pfr. Aegina	0,40	Marginata Zgl. Trsv.	0,20
Foveicollis Parr. Caucasus	0,20—0,30	Marisi Schm. Trs.	0,30
v. Venosa Wstl. „	0,35	Menelans Mrt. v. Minor Sparta	0,60
Fulcrata Zgl. Dalmatien	0,60	Meschendorferi Blz. Trsv.	0,40
Fussiana Blz. Trsv.	0,20	Messenica Mrt. Kalamata	0,50
Gastrolepta v. Inermis Btg. Cattaro	0,25	v. Furcilla Wstl. Patras	0,30—0,40
Gibbula Zgl. Zara	0,10	Modesta Zgl. f. Interpicta Cephalonien	0,40
v. Pencetana Kob. Apulien	0,60	Montana Stz. Trsv.	0,20—0,30
Glaucia Blz. Trsv.	0,20	Moreletiana Bln. Creta	0,60
v. Costata Kim. Trsv.	0,25	Mucida Zlg. Krain	0,10—0,20
do. f. Ambigua Kim. Trsv.	0,25	Munda Rsm. Smyrna	0,40
v. Major Schm. Trsv.	0,25	Naevosa v. Corycensis Mss. Corfu	0,20—0,30
Goldfussi Btg. Taygetos	1,00	v. Othona Btg. Ins. Fano	0,50
Graciliformis Ktsch. Dalmatien	0,25	v. Senilis Rsm. St. Maure	0,20—0,30
Granatina Zgl. Tarvis	0,20	Negropontina Pfr. Calkis	0,20—0,30
Grayana Pfr. Ins. Cerigo	0,30	v. Costulata Thss. Enboea	0,40
Grisea Dsh. Nauplia	0,10—0,20	Nigricans Plt. Sachsen	0,10
Grossa Zgl. sup. Croatien	0,20—0,30	Nipponensis Kob. Yokohama	1,50—2,00
Guicciardii Hld. Parnass	1,00	Opalina Zgl. Cerreto	0,25
Gulo Rsm. Galizien	0,40	Ornata Zgl. Croatien	0,10—0,20
Haueri Blz. Trsv.	0,30—0,40	Orsiniana Villa Ascoli-Piceno	0,35
Hansknechti v. Laevior Btg. Veluchi	0,60	Orthostoma Mke. Günzburg	0,10
Imitatrix Btg. Malta	1,00	v. Filiformis Prr. Trencsin	0,20
Incommoda Btg. Zante	0,20—0,30	Oscarii Thss. Graecia-Oetylus	0,60—0,80
Insignis Gld. Trsv.	0,20	Oscitans Fer. Malta	0,80—1,00
Intermedia Schm. Kärnth.	0,30	Parreyssi Rsm. Trencsin	0,30
Interrupta Zgl. Krain	0,10—0,20	Parvula Std. Wartburg	0,10
Josephinae Btg. Salona	0,75	Penchinati Bgt. Catalonien	0,50
Isabellina Pfr. Salamis	0,20	Pfeifferi Rsm. Dalmatien	0,20
Itala Mrt. Gardasee	0,10—0,20	Planilabris Rm. Dalmatien	0,30
v. Alboguttulata Wgm. Sarnthal	0,15	Plicata Drp. Sachs., Luzern, Brenner	0,10
v. Baldensis Parr. Ledrosee	0,25	v. Plagia Bgt. Arbon	0,20
v. Branni Chrp. Riva	0,20	v. Transsylvanica Mss. Trsv.	0,20
v. Ornata Btg. Belazio	0,10—0,20	Plicatula Drp. Bodethal	0,10
v. Tridentina Ad. Trient	0,20	v. Superflua Sarnthal	0,25
Kephissiae Rth. Attika	0,20	Plumbea Rm. Trsv.	0,10—0,20
Krülperi v. Holostoma Bgt. Katacolo	0,50	v. Cornea Schm. Trsv.	0,10
Laevicollis Parr. Amasia	0,50	Polygyra Btg. Tunis	1,00—1,50
Laevissima Zgl. Dalmatien	0,10—0,20	Porrecta v. Crebrocostata Ng. Syrien	1,00
v. Minor Rsm. Dalmatien	0,15	Pruinosa Chrp. Trsv.	0,40
Lamellata Zgl. Lacroma	0,25	v. Conjungens Blz. Trsv.	0,50
Lamellosa Wgm. Dalmatien	0,20	v. Insignis Blz. Trsv.	0,40

	Mark		Mark
<i>Pumila</i> Zgl. Sachsen	0,10	<i>Lauta</i> Gld. Yokohama	0,50—0,75
<i>v. Succosa</i> Schm. Hermannstadt	0,20	<i>Levantina</i> Dsh. Almyra	0,35
<i>Punctulata</i> Kstr. Manfredonia	0,10	<i>Obliqua</i> Say Ohio	0,30
<i>Pyrenaica</i> Chrj. Hte. Pyren.	0,20	<i>Oblonga</i> Drp. Halle	0,10
<i>Regalis</i> Parr. Trsv.	0,20	<i>Ovalis</i> Gld. Washington	0,30
<i>Reboudi</i> Dup. Isère	0,20	<i>Pfeifferi</i> Rm. Barcelona	0,10—0,20
<i>Retowskii</i> Bttg. Kaukasus	0,75	<i>Putris</i> L. Dresden	0,10
<i>Rolphi</i> Leach. Bruxelles	0,20—0,30	<i>var. ? sup. Amur</i>	1,00
<i>Rossmässleri</i> Pfr. Baiern	0,20	Limax	
<i>Rugicollis</i> Zgl. Banat	0,20—0,30	<i>Agrestis</i> L. Dresden	0,25
<i>Schuehi</i> Rssm. Ins. Sapientza	0,75	<i>Cinereo-niger</i> Wlf. Sachsen	0,15
<i>v. Oertzeni</i> Bttg. Olymp.	0,60	Amalia	
<i>Schwerzenbachi</i> Chp. Brussa	0,20—0,30	<i>Marginata</i> Drp. Dresden	0,25
<i>Selinis</i> Zgl. Corfu	0,40—0,50	Parnacella	
<i>Semilamellata</i> Mss. Kaukasus	0,40—0,50	<i>Deshayesi</i> Mq.-T. Oran	1,50
<i>Semirugata</i> Zgl. Zara	0,25	Janella	
<i>Septemplicata</i> Phl. Bocho falco	0,20—0,30	<i>Bitentaculata</i> Q. N. Zealand (Alcohol)	1,00
<i>v. Prasina</i> Ben. Palermo	0,50	<i>v. Papillata</i> Htt.	1,00
<i>Sericata</i> v. Bifilosa Bl. Mte. Delphi	0,50	Melampus	
<i>v. Senex</i> Btg. Nord-Euboea	0,60	<i>Bidentatus</i> Say Texas	0,30
<i>Serrulata</i> Pfr. Kaukasus	0,50—0,60	<i>Cingulatus</i> Pfr. Cuba	0,30
<i>Shanghaiensis</i> Pfr. China	1,00	<i>Coffea</i> L. Antillen	0,20—0,30
<i>Solida</i> Drp. Turbie	0,10—0,20	<i>Flavus</i> Gm. Cuba	0,20—0,35
<i>Stigmatica</i> Zgl. Dalmatien	0,30—0,40	<i>Fuscus</i> Phl. Mauritius	0,30
<i>Straminicollis</i> Par. Trsv.	0,10—0,20	<i>Liberians</i> Ad. Liberia	0,40
<i>Strangulata</i> Fer. Beyrut	0,30—0,40	<i>Massanensis</i> Elbg. Massana	0,20—0,30
<i>Strigillata</i> Mtt. Dalmatien	0,20	<i>Oblongus</i> Pfr. Bermudas	0,50
<i>Sublaetea</i> Btg. Messolonghi	0,50	<i>Pusillus</i> Gm. Antillen	0,20—0,30
<i>Succinata</i> Zgl. Krain	0,10—0,20	Marinula	
<i>Sulcosa</i> Wgn. Ragusa	0,20	<i>Aequalis</i> Lowe Madeira	0,20—0,30
<i>Syracusana</i> Phl. Syracus	0,20—0,30	<i>Vulcani</i> Mrl. Azoren	0,30—0,40
<i>Tan</i> Btg. Japan	1,00	Pedipes	
<i>Thebana</i> Bln. Boeotien	0,60	<i>Afer</i> Gm. Senegal	0,20—0,40
<i>Thermopylarum</i> Pfr. Parnass	0,40—0,50	<i>Affinis</i> Fer. Mauritius	0,30
<i>v. Perplana</i> Bttg. Parnass	0,60	Pythia	
<i>Tiberii</i> Ben. Sicilien	1,00	<i>Crassidens</i> H. Ins. Safaru	0,75
<i>Thiesseae</i> Btg. Patras	0,80	<i>Ovata</i> Pfr. ? Luzon	1,00
<i>Torifera</i> Btg. Thessalien	0,60—0,80	<i>Pantherina</i> Ad. Ins. Haruku	0,60—0,80
<i>v. Brandisii</i> Kim. Travnik	1,00	<i>Trigona</i> Tsch. Bengalen	0,80
<i>Travnicana</i> Brsk. Travnik	0,75—1,00	<i>Undata</i> Lss. Adenare	0,60
<i>v. Brandisii</i> Kim. Travnik	1,00	Cassidula	
<i>Tridens</i> Ch. Portorico	0,20—0,40	<i>Labrella</i> Dsh. Mauritius	0,20—0,40
<i>Tristrani</i> Pfr. Tunis	1,00	Auriculus	
<i>Tumida</i> Zgl. Trenesin	0,20—0,30	<i>Subulla</i> Quoy Adenare	0,30
<i>Turgida</i> Zgl. Trenesin	0,20—0,30	Alexia	
<i>Turrita</i> Pfr. Ins. Milos	0,25	<i>Bermudensis</i> Ad. Bermudas	0,30—0,50
<i>Varians</i> Zgl. Sachsen	0,10—0,26	<i>Lowean</i> Pfr. Madeira	0,40
<i>v. Diaphana</i> Zgl. Kärnthen	0,10—0,20	<i>Myosotis</i> Drp. Marseille	0,10—0,20
<i>Ventricosa</i> Drp. Croatien	0,10—0,20	<i>Setifera</i> Crp. Californien	0,25
<i>Vetusta</i> Zgl. Croatien	0,20	Carychium	
<i>v. Intermissa</i> Brs. Travnik	0,35	<i>Exiguum</i> Say Michigan	0,35
<i>v. Kajibaschica</i> Kim. Travnik	0,35	<i>Minimum</i> L. Sachsen	0,10
<i>Venusta</i> Schm. Parnass	0,30—0,40	Chilina	
<i>Vibex</i> Rm. Dalmatien	0,25	<i>Fluminea</i> Mt. Porto Alegre	0,20—0,30
<i>v. Planata</i> Parr. Croatien	0,30	<i>Gibbosa</i> Sw. Uruguay	0,30—0,60
<i>Virgata</i> Jan. Balearn	0,20	Limnaea	
Omalyonx		<i>Aenminata</i> Lm. India	0,25
<i>Unguis</i> Fer. Rio Grande do Sul	1,50—2,00	<i>Auricularia</i> Drp. Halle	0,10—0,20
Succinea		<i>do. var. Irkoutsk</i>	0,25
<i>Avara</i> Say Indiana	0,50	<i>Burnetti</i> Adl. Schottland	0,60
<i>Campestris</i> Say Florida	0,30—0,40	<i>Caperata</i> Say Amer. bor.	0,40
<i>Guatemalensis</i> Morl. Guatemala	0,20—0,30	<i>Columella</i> Say Minnesota	0,20—0,30

	Mark.
Decollata Migh. Michigan	0,20—0,30
Desidiosa Say Amer. bor.	0,35
Emerginata Say Michigan	0,40
Humilis Say Amer. bor.	0,20—0,30
Japonica Jay Yokohama	0,20 0,40
Javanica Mss. Java	0,40
v. Intumescens Mrt. Java	0,40
Lagotis Schm. Turkestan	0,20
Linsley Kay Amer. bor.	0,30
Mueronata v. Alpestris Clss. Tirol	0,25
Natalensis Krs. Madagascar	0,40—0,50
Ovata Drp. Barcelona	0,10—0,20
Palustris Drp. Sachsen	0,10
v. minor Riva	0,15
Palustris Mll. New-York	0,25
Peregrina Drp. Croatien	0,10
do. Seiseralpe	0,15
v. Brandisi Brs. Herzegowina	0,50
v. Gibilmannica Cost. Sicilien	0,25
v. Labiata Rsm. Sachsen	0,20
v. minor Sachsen	0,10
v. Peregro-ovata Florenz	0,25
Peregrina Cls R. Grande d. Sul	0,40—0,50
Pervia Mrt. Yokohama	0,30—0,40
v. minor	0,20
Plicia Lea Amer. bor.	0,25
Reflexa Say Amer. bor.	0,30
Riberiensis Reib. Canaren	0,40—0,50
Rubella Clss. Chiemsee	0,25
Rufescens Gray Mauritius	0,20—0,30
Stagnalis L. Irkutsk	0,20
do. Sachsen und Budapest	0,10 0,15
v. Ampliata Donaumoos	0,20
Truncatula Mll. Madeira	0,15
v. Minuta Drp. Frankfurt a. M.	0,10
v. Thiesseae Clss. Euboea	0,20—0,30
Turgida Hrt. Lyon	0,20
Vulgaris Pfr. Sachsen	0,10—0,20

Amphipeplea

Glutinosa Mll. Württemberg	0,30 0,50
--------------------------------------	-----------

Physa

Acuta Drp. Madeira	0,20
Ancillaria Say Indiana	0,35—0,50
Cernica Mrl. Mauritius	0,35
Charpentieri Say Nevada	0,40
Contorta Mich. ? Beyrut	0,25
Fontinalis L. Sachsen	0,10
Gibbosa Mss. sup. Pyren. or.	0,35—0,50
Gyrina Say Amer. bor.	0,20—0,30
Heterostrophia Say Washington	0,20—0,30
Madagascariensis Ang. Madagascar	0,25
Peruviana Gray Peru	0,30—0,50
Philippii Kst. Washington	0,30—0,40
Plicata de Kay Washington	0,30—0,40
Rivalis Mtn. Venezuela	0,10—0,20
Sayi Tapp Amer. bor.	0,40
Stolli Clss. Guatemala	0,10—0,25

Physopsis

Afrikanä Krauss Natal	0,20—0,30
---------------------------------	-----------

Aplexus

Hymnorum L. Sachsen	0,10
-------------------------------	------

	Mark
Albus Mll. Sachsen	0,10
do. Say Indiana	0,25
Bicarinatus Say Miami Canal	0,20—0,30
v. major Cumberland River	0,40
Brondeli Raym. Palermo	0,40
Campanulatus Say Minnesota	0,20—0,30
Carinatus Mll. Neumark	0,10
Compressus Hrt. N. India	0,20—0,30
Contortus L. Sachsen	0,10
Corneus Drp. Neumark	0,10—0,20
Coromandelicus Kst. Madras	0,30
Corpulentus Say Minnesota	0,30
Cristatus Drp. Dresden	0,10
Declivis fossil N. Böhmen	0,20
Deflectus Say Amer. bor.	0,25
Dilatatus Gld. Washington	0,20
Dufouri Grll. Algier	0,40
Edentulus Clss. Guatemala	0,10—0,25
Exacutus Say Minnesota	0,35
Exustus Drh. N. India	0,20—0,40
Fontanus Lght. Neumark	0,20
Glaber Jffr. Madeira	0,10—0,25
Gadeloupensis Sw. Florida	0,20—0,30
Laevis Ald. Algier	0,20
Leucostomus Mll. Sachsen	0,10—0,25
Linnophilus Wst. Neumark	0,20
Marginatus Drp. Halle & England	0,10
Nautilens L. Neumark	0,15
Parvus Say Mlonis & England	0,10—0,20
Piscinarum Brg. Beyrut	0,20—0,30
Rossmässleri Arsw. Leipzig	0,30
Riparius Wstl. Neumark	0,20
Rotundatus Poir. Bodensee	0,10
Solitus fossil N. Böhmen	0,25—0,40
Septemgyratus Zgl. Neumark	0,20
Spirorbis L. Westpreussen	0,10
Stramineus Dkr. pass. Venezuela	0,15
Subangulatus Phl. Thessalien	0,20—0,30
Submarginatus Jan. Barcelona	0,15—0,25
Tennis Phil. Guatemala	0,30 0,40
Trivolvus Say Amer. bor.	0,20—0,30
Vermicularis Gld. S. Francisco	0,25
Vortex L. Schlesien	0,10
Vorticulus Trsch. Neumark	0,20

Segmentina

Angigyra Say Amer. bor.	0,25
Armigera Say Michigan	0,25
Lineatus Wlk. Cambridge	0,20—0,35
Nitida Mll. Dresden	0,10

Ancyclus

Fluviatilis Mll. Croatien	0,10
Fuscus Ad. Washington	0,25
Gibbosus Bgt. Taurus	0,20—0,30
Haldemanni Bnn. Washington	0,30
Moricandi Orb. R. Grande do Sul	0,30—0,50
Pileolus Fer. Ins. Micono	0,20
Tardus Say Wabash	0,40

Acroloxus

Lacrustis L. Dresden	0,10—0,20
--------------------------------	-----------

Aeme

Gracilis Clss. Krain	1,50
Lineata Crp. Salzburg	0,50

	Mark.		Mark
Polita Hrtm. Harz	0,50	Zebra Grat Luzon	0,30—0,50
Spectabilis Kssm. Krain	2,00	do. var. Mindoro	1,00
Latia		Leptopoma	
Lateralis Gld. N. Zealand	0,60	Atricapillum Sw. Cottabato	0,10
Siphonaria		do. var. Zamboanga	0,50
Algesirae Q. Tanager	0,30—0,50	Bicolor Pfr. & var. Dayao	0,50
sp. St. Catharina	0,20—0,30	Goniostomum Sw. Mindanao	0,50
Truncatella		Helicoides Grat. Mindoro	0,75
Caribaeensis Sw. Bermuda	0,25	Immaculatum Chm. Luzon	0,50
Gnerini Bns. Mauritius	0,15	Insigne Sw. Mindoro	1,50
Pulchella Pfr. Cuba	0,15	Lowi Pfr. Borneo.	0,50
Subcylindrica Gr. Cuba	0,20—0,30	Manadense Pfr. & var. Celebes	0,50
Truncatula Drp. Dalmatien	0,20	Vitreia Lss. Palawan	0,30—0,50
Valida Pfr. Philippinen	0,20—0,30	do. var. Zamboanga	0,50
Vitiana Gld. Viti	0,20—0,30	v. Cinetellum Pfr. Cottabato	0,10
Cyclotus		do. ? Halmahera	0,50
Amboinensis Pfr. Amboina	0,50—0,75	v. Major sup. Luzon	0,75
Corrugatus Say Jamaica	0,50	Megalomastoma	
Dysoni Pfr. Mexico & Honduras	0,20—0,50	Anostoma Bns. Borneo	2,50
Euzonus Dohrn. n. sp. Palawan	2,50	Antillarum Sw. S. Vincent	0,50
Giganteus Gray N.-Granada	1,50—3,00	Funiculatum Bns. Sikkim	1,50—2,00
Guttatus Pfr. Ternate	0,75—1,00	Tomocyclus	
Leroratanus Bttg. Ternate	1,00—1,25	Simulacrum Mor. Guatemala	2,00—2,50
Popayanus Lea Venezuela	0,25—0,40	Pupinella	
Pruinosus Mrts. Sangir	0,75—1,25	Rufa Sw. II. Q. Yokohama	0,20
Variegatus Sws. Mindanao	1,50	Pupina	
Opisthoporus		Artata Bns. Moulmein	0,50
Corniculum Bns. Java	1,00	Cunningiana Pfr. N.-Caledonien	0,25
Quadrasi Crosse Palawan	1,00—1,50	Fusca Gray Luzon	0,30—0,40
v. Pallida Crosse Palawan	1,50	do. sup. Mindanao	0,25
Pterocyclus		Grandis Gray Philippinen	0,50
Bilabiatu Bens. Dindigul	1,00—1,50	Nicobarica Pfr. Nicobaren	0,50
Labuanensis Pfr. Borneo	1,00—1,75	Pellucida Sw. Luzon	0,30
Alycaeus		Speculum Tpp. N.-Guinea	0,75
Jagori Mrts. Süd-Borneo	0,50—1,00	Trenbi Bttg. Java	1,00
Sculptilis Ben. India	0,75	Wallacei P. Amboina	1,00
Hypocystis		Choanopoma	
Gravida Ben. II. Q. Moulmein	2,50	Argutum Pfr. Cuba	1,00—1,50
Diplommatina		Fimbriatulum Sw. Jamaica	0,50
Pachycheilus Bns. India	0,70	Ctenopoma	
Craspedopoma		Rugulosum Pfr. Cuba	0,60—0,80
Hespericum Mrl. Azoren	0,50	Adamsiella	
Lucidum Lv. Madeira	0,20—0,30	Grayana Pfr. Jamaica	0,20
Cyclophorus		Ignilabris Ad. „	0,50
Atramentarius Sw. Sangir	0,75	Variabilis Ad. „	0,30
Bocceganum Gss. N. Caledonien	0,30	Otopoma	
Borneensis Pfr. Borneo	1,00	Clausum Sw. India	0,60
Leai Tryon Andamanen	1,00—1,50	Haemastoma Ant. Mauritius	0,40—0,75
n. sp. bei Leonensis Mrl. Camerun	2,00	Listeri Gray Mauritius	0,30
Lingniferus Sw. Luzon	1,00	Undulatum Sow. Mauritius	0,30—0,40
Perdix Brd. Java	1,25	Unifasciatum Sw. Madagascar	0,50—0,60
Philippinarum Sw. Luzon	0,60—1,00	Cyclostomus	
Plicatus Gld. II. Q. Philippinen	0,25	Banksianus Sw. Jamaicus	0,30—0,40
Rafflesii Brd. Java	2,00	Barclayanus Pfr. Mauritius	1,00
Tigrinus Sw. Luzon	1,00—1,50	Carinatus Brn. subfoss. Maurit.	2,00—3,00
Triliratus Pfr. Borneo	1,50	Elegans Mll. Gardasee	0,10
Tuba Sow. Sumatra	1,00—2,00	Fimbriatum Lm. Mauritius	0,35
Validus Sow. Mindanao	1,50—2,00	Jayanus Ad. Jamaica	0,20
Wahlbergi Bens. Natal	0,10—0,50	Lutetianum Brg. Barcelona	0,25
Woodianus Lea Luzon	0,30—0,50	Manillaris Lam. Oran	0,30
do. var. Mindoro	1,00	Melitenis Sow. Malta	0,50
		v. Alba Malta	0,60

	Mark
Machandi Grtl. Madagascar	1,50
Multisulcatus P. M. Palermo	0,30
Olivieri Sw. Syrien	0,50
Siculus Sw. Girgenti	0,30
Tudora	
Armata C. Ad. Jamaica	0,30
Ferruginea Lm. Balearen	0,20
Megachila Pot. Curaçao	0,25
Versicolor Pfr. „	0,30
Cistula	
Mackinlayi Gdl. Cuba	1,00—1,50
Rufilabris Beck. St. Croix	0,20
Chondropoma	
Dentatum Say Cuba	0,50
Pictum Pfr. Cuba	0,50—0,75
Plicatulum Pfr. P. Cabello	0,50
Santacruzense Pfr. St. Croix	0,50
Semilabre Lm. Haiti	0,50
Textum Gdl. Cuba	0,50
Pomatias	
Auritus Zgl. Cattaro	0,20
Berilloni Fgt. Pyrenäen	0,40
Carthusianus Dup. Isère	0,20
Cinereascens Rssm. Croatien	0,20—0,30
Crassilabrum Dup. Ilte. Pyren. . . .	0,20
Crosseanus Paull. Toscana	0,25
Gredleri Westl. Tirol	0,20
Henonianus Bgt. Constantine	0,20—0,30
Henricae Strb. Tirol	0,10—0,20
Hidalgoianus Crrs. Oduna	0,30
Hispanicus Brg. Barcelona	0,25
Lapurdensis Fgt. Lourdes	0,30
Montserraticus Brg. Barcelona	0,25
Nonleti Dup. Bilbao	0,30
Obscurus Drp. Süd-Frankreich	0,20
Oostomus Wst. Velebit	0,25
Paladilhanus Sim. Palermo	0,40
Patulus Drp. Istrien, Süd-Frankreich . .	0,10
Perseianus Kob. Tunis	0,30—0,50
Reitteri Btg. Velebit	0,25
Rugosus Crrs. Dalmatien	0,25
Scalarinus Villa Italien	0,20 0,30
Seriperensis Btg. Corfu	0,50
7-spiralis v. Villae Ledrosee	0,25
Striolatum Porr. Parnass	0,35
Tessellatus Rss. Corfu	0,20—0,30
Ziguenae Kob. Tunis	0,75
Realia	
Disterrina Bens. Andamanen	0,30—0,50
Expansilabris Pfr. Mauritius	0,25
Rubens Quoy Bourbon	0,25
do. n. var. Mauritius	0,25
Scalariformis Pease Ovalau	0,30
Sirkij Par. Cattaro	0,35
Variegata Mor. Mauritius	0,25
Hydrocena	
Blanfordiana Stl. Moulmein	0,50
Cattaroensis Pfr. Cattaro	0,25
Liracula Stl. Moulmein	0,50
Pyxis Bn. Indien	0,50
Stoastoma	
Gaskoinianum Cht. Jamaica	0,40

	Mark
Trochatella	
Pulchella Gray Jamaica	0,10—0,20
Regina Morel. Cuba	1,00
Lucidella	
Aureola Fér. Jamaica	0,15
Helicina	
Bellula Poey Cuba	0,50
Candida Pfr. Turks. Isl.	0,20—0,40
Colorata Pse. Paumotu	0,35
Columbiana Phil. Venezuela	0,60
Concentrina Pfr. Venezuela	0,30
Cyrtopoma Mild. Luzon	0,50
Exserta Gdl. Cuba	0,60
Flavescens Pease Mangaia	0,30
Idae Pfr. Ins. Haruku	0,35
Jamaicensis Sw. Jamaica	0,30
Lirata Pfr. P. Cabello	0,40
Maugeriae Gray Raiatea	0,40
Miniata Lss. Tahiti	0,50
Neritella Lam. Jamaica	0,20
Oceanica Pease Apaiang	0,25
Orbiculata Say Louisiana	0,25
Parva Sow. Halmahera	0,40
Parvula Pease Atiu	0,20
Reeveana Pfr. Cuba	0,50
Sagrajana Orb. Cuba	1,00—1,50
Solidula Gray Tahiti	0,30
Submarginata Cuba	0,75 1,50
Tahitensis Pease Tahiti	0,26
Tropica Jan. Texas	0,25
Variabilis Wagn. Brasil	0,30
n. sp. Luzon	0,50
Alcadia	
Brownei Gray Jamaica	0,20 0,30
Major Gray Jamaica	0,10 0,50
Proserpina	
Depressa Orb. Cuba	0,60
Pharella	
Javanica Lm. Java	0,60
Pandora	
Inaequalis L. England	0,20—0,40
Maetra	
Glaucæ Gm. gross Granville	1,00
Hemimaetra	
Solida L. Calvados	0,20—0,60
Psammobia	
Longata Luzon	1,00
Olivacea Gray Yokohama	0,60—1,00
Soletellina	
Adamsi Dsh. Luzon	1,50 2,00
Tellina	
Crassa Pnn. Guernsey	0,20 0,50
Pulchella Lm. Rousillon	0,20—0,40
Psilla Phil. Scilly Isles	0,35
Tennis Cost. Granville	0,30
Macoma	
Mariae Wood S. Australien	0,50
Donax	
Trunculus L. Spanien	0,10—0,20
Vittatus Cost. Le Croisie	0,20—0,40
Mesodesma	
Praecisa Dsh. S. Australien	0,60—1,00

	Mark		Mark
Tivela		Astarte	
Mactroides Brn. R. Grande d. Sul	0,80—1,20	Triangularis Mtg. Scilly Isles	0,30—0,40
Crista		Unio	
Gibbia Lm. Tausend Inseln	0,30—0,50	Aearnanicus Kob. Kalamata	1,00—1,50
Circe		Aethiops Lea Rio Grande d. Sul	1,50—2,00
Minima Mtg. Guernsey	0,20—0,30	Batavus Lm. Sachsen	0,20
Tapes		Cylindricus Say Ohio	1,00
Aurea Gm. S. Lunaire	0,20—0,30	Desectus Drt. Thessalien	1,00—1,75
Bicolor Gm. Barcelona	0,30	Ellipticus Spix Uruguay	0,25—0,40
Decussata L. Spanien	0,20—0,30	Eucirrus Bgt. Beyrut	0,75—1,50
Florida Lm.	0,25	Gratus Lea Porte Alegre	0,75—1,00
Texturata Lm.	0,35	Japonensis Lea Yokohama	0,60—1,00
Virginea L. Guernsey	0,20—0,40	var. ? ?	1,00
Katelysia		Jonicus Blc. St. Manre	1,00
Aphrodina Lm. S. Australien	0,50—0,75	Kochi Kob. Nister	1,00—1,50
Chione		Marginalis Lm. Madras	0,60—1,00
Ovata Pm. Guernsey	0,20—0,30	Metanever Rfg. Ohio	1,00
Verrucosa L. Mahon	0,30—0,60	Nasutus Say Cambridge N. A.	1,25
Venerupis		Nipponensis Mrt. Yokohama	1,00—1,50
Irus L. Weymouth	0,20—0,30	Pictorum L. Algier	0,25
Cyrena		Radiosus Lea Ohio	1,50
Limosa Mat. Porto Alegre	0,35—0,50	Reflexus Rfg. Ohio	0,80
Corbiculo		Rhomboides Schb. Tlemcen	0,30—0,50
Fluminea Lm. Borneo	0,20—0,30	Tumidus Rtz. Sachsen	0,25
Martensi Clss. Yokohama	0,50—1,00	Vicarius Wst. Thessalia	1,00
Cyclas		Wymanni Lea Rio Grande do Sul	1,50—2,00
Cornea L. Dresden	0,10	n. sp. sup. Borneo	2,00—3,00
Partumeia Say Washington	0,30	Margaritana	
Rivicola Lm. Sachsen	0,10—0,20	Margaritifera L. Elster	0,50—1,00
Securis Pm. Vermont	0,30	do. Clyde Schottland	0,75
Similis Say Washington	0,20	Dipsas	
Solidula Pm. Washington	0,20	Plicata Lch. Yokohama	1,50—2,50
Straminea Chr. Washington	0,25	v. Clessini Kob.	2,50
Striatina Lm. New-York	0,20	Anodonta	
Wildii Clss. Nord-Euboea	0,40	Anatina L. Sachsen	0,25
Calyculina		Balatonica Plattensee	0,50
Lacustris Drp. Dresden	0,10	Castelnaudi Hp. Amazon	1,00—1,50
Ryckholti Nor. Leipzig	0,20—0,30	Cellensis Schr. Westfalen	0,20—0,75
Pisidium		Cygnia Drp. Sachsen	1,00—1,75
Abditum Hld. Pensylvanien	0,25	v. Piscinalis Nls. Sachsen	0,20—0,40
Aquilatere Pm. New-York	0,25	Fluviatilis Say Nord-Carolina	1,00
Annicum Mll. Radeberg	0,10	Gigantea Spix Amazon	2,00—5,00
Compressum Pm. Vermont	0,30	Gravida Drt. Lac Copais	1,00
Fontinale Pfr. Sachsen	0,20	Incarum Phil. Peru	0,75—1,50
Heldreichi Clss. Boeotien	0,25	Lauta Mrts. Yokohama	1,50—2,00
Henslovianum Shp. Saalethal	0,10	Solidula Hp. var. Peru	1,50—2,50
Intermedium Gass. Lyon	0,20	Woodiana Lea Yokohama	1,50—2,00
Nitidum Jen. Saalethal	0,15	Mycetopus	
Obtusale Pfr. Saalethal	0,10	Staudingeri Jhering Amazon	1,50—4,00
Ovatum Clss. Harz	0,10—0,20	Spatha	
Pulchellum Jen. Saalethal	0,10—0,20	Rubens Dsh. Nil	1,50—2,50
Pusillum Gm. Saalethal	0,15	Castalia	
Tenebrosus Ost. Sicilien	0,50	Undosa Mrt. S. Paulo	3,50
Virgineum Gm. Vermont	0,20	Mytilus	
do. gross. Virginien	0,30	Minimus Pol. Malta	0,10—0,20
Cardium		sp. St. Catharina	0,40
Edule L. Spanien	0,10—0,20	Modiolaria	
Tuberculatum L. Spanien	0,20—0,60	Marmorata Frb. Scilly Isles	0,20—0,40
		Modiola	
		Barbata Lm. Granville	0,20—0,40

	Mark		Mark
Barbatia		Peecten	
Lactea L. Guernsey . . .	0,10—0,20	Opercularis L. England . . .	0,20 0,60
Anomalocardia		Tigrinus Mll. Shottland . . .	0,30—0,60
Deshayesi Hnl. Madagascar. . .	0,75	Anomia	
Pectunculus		Ephippium L. Granville . . .	0,20—0,50
Glycimeris L. England . . .	0,20—0,80		

Supplement.

	Mark		Mark
Melania		Cyclotus	
Godwini Brt. Assam . . .	0,50—1,00	Discoidens Sw. todt Java . . .	0,20—0,30
Ammicola		Inca Orb. Peru	1,00
Sayana Anth. Washington . . .	0,25	Leptopoma	
Tritonum Brg. Almyra . . .	0,15—0,20	Pellucidum Grt. Mindanao . . .	0,50
Helicarion		Pupina	
Adolfi Bttg. Java	1,00	Sucinacia Btg. Java	1,00
Hemiplecta		Pomatias	
Arguta Pfr. Java.	1,00—1,50	Henric. v. Glaucaia Grd. Tirol . .	0,20
Helix		Helicina	
Cryptozona Zgl. Palermo. . . .	0,50	Lazarus v. Giganthea Btg.	
Fraterna Say Indiana	0,40	Mindoro	0,30—0,50
Oviformis Grtl. Madagascar. . .	4,00—5,00	Nicobarica Phl. Nicobaren . . .	0,35
Scherzeri Zel. Gibraltar . . .	0,40—0,50	Suturalis Mts. Amboina	0,35
Setipila Zgl. Ascoli-Piceno . . .	0,50	Sylvatica Orb. Bolivien	0,60
Strigata Mll. Sicilien	0,20—0,30	Cyclas	
Villosa Std. Schweiz	0,10—0,20	Occidentalis Prm. Vermont . . .	0,40
Amphidromus		Unio	
Furcillatus Mss.		Lapillus Say Ohio	0,60—0,80
v. Virescens Mts. Java	2,50—3,50	Creseis	
Pseudoglossula		Acicula Rng. Mittelmeer. . . .	0,25
HeteracraBttg. n.sp. Camerum 2,00—3,00		Nassa	
Pseudachatina		Mutabilis L. Roussillon	0,20—0,30
GravenreuthiBttg.n.sp.Camerum 1,00 6,00		Cerithium	
do. H. Qual.	1,50—2,50	Vulgatum Brg. Herault	0,20—0,50
Buliminus		Lacuna	
Thraustus Bttg. Java	0,75	Divaricata L. Roussillon. . . .	0,20 0,30
Pupa		Monodonta	
Gorgonica Dhr. Capverden . . .	0,30	Crassa Pht. Devonshire	0,25
Milium Gld. Nordost-Ohio . . .	0,30	Turbinata Brn. Roussillon . . .	0,25
Tygmaceum Drp. Azoren	0,15	Gibbula	
Clausilia		Villicia Phl. Herault	0,20
Fussi v. Pruinosa Blz. Trsv. . . .	0,40	Priognathus	
Loxostoma Bus. Assam	1,50	Celia Htt. N. Zealand	0,60
do. todt	0,80	Ferussacia	
Pseudosyracusana Gtt. Malta . . .	1,00	Gronoviana Rss. Graecia	0,50
Rothi Pfr. Ins. Syra	0,50	Actaeon	
Saxie. v. Thessala Btg. Thessalien	0,35	Tornatilis L. South Wales . . .	0,25
Walderdorffi Ktsch. Dalmatien . .	0,40	Tapes	
Limnaea		Pullastra Mtg. Jersey	0,20 0,40
Javan. v. Tengerica Bttg. Java 0,15—0,25		v. Perforans Mtg. Devonshire	0,20—0,50
Physa		Syndosmya	
Mamoi Ben. Spanien	0,25	Tenuis Mtg. England	0,20—0,30
Planorbis		Mytilus	
Glabratus Say Amer. bor.	0,30—0,40	Crispus Cnt. Toulon.	0,25
Cyclophorus		Helix	
Bensoni Pfr. Assam	1,00	Intermedia v. albina Tirol . . .	0,30
Zollingeri Mss. Java	0,75—1,00	Cyclostomus	
		Elegans v. Fasciatus Tirol. . . .	0,15

	Mark		Mark
Pupa		Anodonta	
Avenacea v. Horlea Tirol . . .	0,10	Cygnea v. Solearis Tirol . . .	0,70
Planorbis		do. v. Lacustrina „ . . .	0,60
Carinatus Mll. gross Tirol . . .	0,20	do. v. Ponderosa „ . . .	0,50
Limnaea		Anatin v. Debettana „ . . .	0,50
Palustris v. Turricula Tirol . . .	0,25	Tryoni Lea Pennsylvanien . . .	1,50

In der nächsten Zeit erwarten wir folgende Nord-Amerikaner:

Unio		Subovatus Lea Ohio	
(Meist in beiden Geschlechtern)		Subodontus Lea „	
Circulus Lea ? Ohio.		Triangularis Brn. „	
Clavus Lm. „		Tuberculatus Brn. „	
Coccineus Hld. „		Undulatus Brn. „	
Complanatus Sld. New-Jersey.		Verrucosus Brn. „	
Fabalis Lea Ohio.		Margaritana	
Gibbosus Brn. Ohio.		Calceolus Lea Ohio	
Irroratus Lea „		Complanata Brn. „	
Lens Lea „		Deliscens Say „	
Ligamentinus Lm. Ohio.		Marginata Say „	
Luteolus Lm. „		Rugosa Brn. „	
Multiradiatus Lea „		Anodonta	
Phaseolus Hld. „		Decora Lea Ohio	
Pustulosus Lea „		Edentula Say Ohio	
Pyramidatus Lea „		Ferrussaciana Lea Ohio	
Rectus Lm. „		Plana Lea „	
Rubiginosus Lea „		Subcylindracea Lea Ohio	

Viele der offerirten Arten sind nur in wenigen oder einzelnen Stücken vorrätig.

Auswahlsendungen zu sehr reducirten Preisen werden auf Wunsch gern gemacht.

Fossile Conchylien.

vide Liste III pag. 8.

 Unsere Lepidopteren-Preisliste erscheint im Dezember jeden Jahres, No. XXXV 1891 bietet ca. 11000 Arten aus allen Weltgegenden an, sowie auch lebende Puppen und 900 präparirte Raupen etc. etc.

 Chaque année en décembre il va paraître une nouvelle liste de nos doubles de Lépidoptères du globe. Dans notre liste (Nr. XXXV 1891) nous offrons environ 11000 espèces de Lépidoptères, bien conservés, bien nommés et à des prix avantageux. On y trouve de même offertes, environ 900 espèces de Chenilles préparées, des Chrysalides vivantes.

 A new list of our Lepidoptera from all parts of the world appears at the end of each year (December).

 Unsere Coleopteren-Preisliste X (100 Seiten!!) bietet die seltensten Arten aller Faunengebiete an. Die Liste enthält ca. 7600 palaarkt. und ca. 6000 exotische Arten.

 Dans notre Prix-Courants des Coléoptères du globe nous offrons une très grand nombre des espèces très rare.

 Coleoptera for sale. The last list Nr. X (100 sides) contain more than 13000 species from all parts of the world. For Expl. Cicindela ca. 200 species, Carabus ca. 320 species etc. etc.

Auswahlsendungen von exot. Lepidopteren und Coleopteren zu bedeutend reducirten Preisen werden auf Wunsch gern gemacht.

Auch exotische Hymenopteren, Dipteren, Hemipteren, Orthopteren und Neuropteren sind vorrätig und stehen wir mit Preislisten gern zu Diensten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Conchylien-Preisliste Nr. VI 200-222](#)