

zu überlassen. Ich bin gern bereit, ihnen Verzeichnisse der schon präparirten Zungen zu senden, um überflüssige Mühe zu vermeiden, und werde die Schalen nach Entnahme der Thiere natürlich unversehrt zurückschicken.

Literaturbericht.

Troschel, Dr. H., Das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer natürlichen Classification untersucht. Fortgesetzt von Dr. J. Thiele. Zweiten Bandes siebente und achte Lieferung. Berlin, Nikolai 1891 und 92.

Nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren hat das von Troschel unvollendet gelassene Werk glücklich einen Fortsetzer gefunden, der es in würdiger Weise zu Ende führen wird. Die siebente Lieferung führt zunächst die Rhipidoglossen zum Schluss. *Magarita*, *Turricula* Dall, *Machaeroplax* Friele, *Photinula* Ad., *Margaritella* n. gen. für die neuseeländischen seither zu *Photinula* gestellten Arten, die aber näher an *Margarita* stehen und diese Gattung in den südlichen Meeren repräsentiren, und *Minolia* Ad. — Eng an diese Familie an schliessen sich die *Stomatellacea*, von denen nur *Gena lutea* L. untersucht werden konnte. Weiter folgen die *Titiscanidae*, von Berg für die nackte *Titiscania limacina* gegründet, und die *Scutellinidae*, die nach Dall hierher, nicht zu den *Patelliden*, gehören. Den Schluss der Abtheilung bilden die *Cocculinidae*, deren Stellung unsicher bleibt und die vielleicht eher zu den *Neritiden* gehören.

Es folgen die *Zygobranchiata*, die *Rhipidoglossen* mit doppelter Kieme umfassend. Thiele trennt sie in *Schismatobranchiata* mit Spiralschale und *Dicranobranchiata* mit schüsselförmiger Schale. Erstere umfassen die *Seissurellidae*, die *Pleurotomariidae*, und die *Haliotidae*, deren Gattungen wahrscheinlich alle nur subgenerischen Werth haben, innerhalb deren sich aber zwei leicht verschiedene Gebisstypen nachweisen lassen. Unter den *Dicranobranchiaten* lassen sich die beiden Familien *Emarginulidae* und *Fissurellidae* nicht ganz leicht aufrechterhalten und sind durch Uebergänge verbunden. Behandelt werden die Gattungen *Subemarginula*, *Hemitoma*, *Emarginula*, *Parmophorus*, *Puncturella* bei den ersteren, und *Glyphis*, *Fissuridea*, *Lucapinella*

Fissurella, Cremides, Fissurellidea, Macrochisma bei den anderen: Die drei ersten Gattungen der Fissurelliden bilden eine eigene den Emarginuliden näher stehende Gruppe.

Die Dokoglossa werden auf die Patellidae, Acmaeidae und Lepetidae beschränkt. In der Familie Patellidae werden unterschieden die Patellinae mit den Gattungen Ancistromesus, Patellidea n. gen. für *Patella granularis*, Patellona n. gen. für *P. granatina*, Olana Ad., Cymbula Ad., Patellastra Monteros., *Patella* L., Patellopsis n. gen., auf eine unbestimmte Art vom Cap gegründet, Helcion Montf., Patinastra n. gen. für *P. pruinosa*, Patina Leach: — die Nacellinae mit den Gattungen Nacella Schum., Patinella Dall., Helcioniscus Dall. — Bei den Acmaeidae wird ebenfalls unterschieden eine Unterfamilie Acmaeinae mit den Gattungen Collisellina Dall., Collisella Dall., Scurria Gray, Lotia Sow., Tectura M. Edw. und Acmaea Eschsch., und Pectinodontinae mit der einzigen Gattung Pectinodonta. — Die Lepelidae zerfallen in die Unterfamilien Lepetinae mit den Gattungen Lepeta Gray, Pilidium Forbes, Cryptobranchia Midd., Propylidiinae mit der Gattung Propylidium. Die Familie Addisoniidae enthält die einzige Gattung Addisonia Dall.

Die Chitoniden werden als Lepidoglossa vollständig von den Prosobranchiern getrennt und ihre Verwandtschaft mit den Würmern hervorgehoben. Besprochen werden die Gattungen Chiton L., Amaurochiton n. gen. für *Ch. olivaceus*, Chondroplox n. gen. für *Ch. granosus*, Diachiton n. gen. für *Ch. albilineatus*, Poeciloplax n. gen. für *Ch. glaucus*, Sypharochiton n. gen. für *Ch. pellis serpentis*, Triboplax n. gen. für *Ch. scabricula*, Georgus n. gen. für *Ch. rusticus*, Clathropleura Tib., Rhyssoplax n. gen. für *Ch. janeirensis*, Radiella n. gen. für *Ch. punctatissimus*, Tonicia Gray, Toniciopsis n. gen. für *Ch. pictus*, Acanthopleura Guild., Rhopalopleura n. gen. für *Ch. aculeatus* L., Onythochiton Gray, Enoplochiton Gray, Schizochiton Gray, Ischnoplax Carp., Anthochiton n. gen. für *Ch. tulipa*, Lophyriscus n. gen. für *Ch. textilis*, Ischnoradsia Carp., Callistochiton Carp., Lophyrus Saw., Chaetopleura Shuttl., Leptopleura n. gen. für *Ch. catenulatus* Sorv., Ischnochiton Gray, Lepidoradsia Carp., Stenochiton Augas., Stenoradsia Carp., Mangerella Carp., Stereoplax n. gen. für *Ch. multicostatus*, Stenoplax Carp., Rhodoplax n. gen. für *Ch. squamulosus*, Helioradsia n. gen. für *Ch. gemma*, Pallochiton Dall., Dinoplax Carp., Leptochiton Gray,

Lophyropsis n. gen. für *Ch. imitatrix*, *Beanella* Dall, *Hanleya* Gray, *Toniciella* Carp., *Schizoplax* Dall, *Trachydermon* Carp., *Middendorffia* Carp., *Adriella* n. gen. für *Ch. variegatus* Fabr., *Callochiton* Gray, *Icoplax* n. gen. für *Ch. puniceus*, *Stereochiton* Carp., *Mecynoplax* n. gen. für *Ch. acutirostratus* Carp., *Callistoplax* Carp., *Mopaliopsis* n. gen. für *Ch. cingillatus* Rve., *Endoxochiton* Shuttll., *Natalina* Carp., *Placellopleura* Guildg., *Placiphora* Gray, *Mopalia* Gray, *Placiphorella* Carp., *Katharina* Gray, *Acantbochiton* Leach, *Chitonellus* Lam., *Cryptoconchus* Guildg., *Amicula* Gray, *Cryptochiton* Midd. Das Werk ist damit abgeschlossen; der Fortsetzer hat sich aber entschlossen, ein Ergänzungsheft beizufügen, das Nachträge zu den früher behandelten Gruppen der Prosobranchier bringen soll; wir werden hoffentlich bald in der Lage sein, darüber zu berichten.

Pollonera, Carlo, Studi sulle Xerophila, I. Le *X. cespitum* e Terveri e forme intermedie. In Bull. Soc. mal. italiana Vol. XVIII 1.

Als neu beschrieben werden *Xerophila cespitum* var. *remuriana* p. 21 t. 1 fig. 9—70 Mentone, var. *Mauriciensis* fig. 3, 4 von Ligurien, var. *sospitelliana* t. 1 fig. 11, 12 von Sospitello bei Nizza, var. *vediantia* fig. 17, 18 aus Piemont und Ligurien, var. *turgescens* fig. 15, 16 von Spezia; — *X. zaccarensis* var. *saldarum* fig. 27, 28 von Bougie; — *X. inelegans* von Aumale in Algerien; — *X. impolita* von Fort National; — *X. indigena* t. 2 fig. 4—6 von Bougie; — *X. indefinita* t. 2 fig. 7, 8, = *Terverii* Bgt. nec Mich. aus der Umgegend von Algier; — *X. apparens* t. 1 fig. 23, 24 von Fort National; — *X. neutra* t. 2 fig. 11, 12 von Calatafini; — *X. himerensis* t. 2, fig. 13 aus Sicilien; — *X. Luci* var. *florentii* t. 2 fig. 15, 16 von Toulon; — *X. Bavayi* t. 2, fig. 9, 10 von Toulon; — *X. lamarmorae* t. 2 fig. 22, 23 von Cagliari; — *X. drepanitana* nebst var. *seditiosa* von Trapani; — *X. intima* vom Dschebel Santa Cruz bei Oran; — *X. deterior* p. 44 t. 2 fig. 29, 30 aus Südsardinien.

Wohlberedt, Otto, Nachtrag zu dem Verzeichniss der in der Preussischen Oberlausitz vorkommenden Land- und Wassermollusken von R. Peck. — Sep.-Abz. aus Band XX der Abhandl. naturf. Ges. Görlitz.

Aus dem Genist der Neisse, vom Grödlitzberg, der kleinen Schneegrube und dem Jeschkengebirge werden zahlreiche neue Fundorte angeführt. Die Gesamtzahl der Arten kommt damit auf 116.

Smith, Edgar A., *Descriptions of new species of Helix, Rissoina and Actaeon*. — From „the Conchologist“ vol. II, part 5.

Neu Helix (Gonostoma) baudinensis und collingii von Baudin Island in N. W. Australien: — Rissoina Walkeri von ebenda und Actaeon reevei (= Tornatella suturalis part. Reeve Conch. icon. vol. XV pl. II fig. 9a, b) unbekannten Fundortes.

Chia, Manuel de, *Contribucion a la Fauna malacologica catalana. Moluscos terrestres et de aqua dulce de la provincia de Gerona*. Gerona 1893. 8°. 23 S.

Es werden unter Ausschliessung der zweifelhaften und eines guten Theiles der Bourguignat'schen etc. Arten noch 143 sichere angeführt, mit genauer Angabe der Fundorte.

Drouët, H., *Description de deux Unio nouveaux du bassin de l'Oronte*. — In Revue biologique Nord de la France V.

Unio Barroisi und U. tinctus, beide im Holzschnitt abgebildet.

Simroth, Dr. H., *über einige Parmarion-Arten*. Sep.-Abz. aus Dr. M. Weber, Zoologische Ergebnisse einer Reise in niederländisch Ostindien Band II. Mit Taf. 7 und 8.

Neu Parmarion Weberi, p. 105 fig. 6, 9, 18, 19 von Java; — P. Martensi, p. 107 fig. 8, 20, 21, 22, Cambodscha; — Microparmarion (n. gen.) Strubelli, p. 108 fig. 5, 11, 12, 15, Java; — M. Austeni, p. 109 fig. 4, 13, 14, Java.

Brusina, S., *Saccoia. Nuoro genere di Gasteropodi terziari italo-francesi*. In Bull. Soc. mal. ital. XVIII. p. 49—54.

Die neue Gattung umschliesst Melania oryza Sism., Paludestrina escoffierae Tourn., Hydrobia fontanuesi Capell. und H. congermana Font.

Hedley, C. and Suter H., *Reference List of the Land- and Freshwater Mollusca of New Zealand*. — From Vol. VII (Ser. 2) of the Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Decbr. 1892.

Nach einer strengen Sichtung und bei ziemlich weiter Umgrenzung der Art bleiben für Neuseeland 184 Arten, mit wenigen, dazu unsicheren Ausnahmen alle der Insel eigenthümlich. Die Gattungen Testacella, Daudebardia, Diplomphalus, Vitrina, Nanina, Patula, Hyalina, Zonites, Succinea, Helix, Bulimus, Rhabdotus, Limax, Arion, Cyclophorus, Leptopoma, Physa und

Neritina werden definitiv ausgeschlossen, Diplommatina bleibt unsicher; Nanina, Partula, Stenogyra, Pupa, Truncatella, Helicina, Navicella sind trotz aller Nachforschungen noch nicht aufgefunden worden. — Elaea Hutton wird in Rhenea Hutt. umgetauft.

Smith, Edgar A., Descriptions of new Species of Land-Shells from Borneo. In Linn. Soc. Journal Zoology vol. 24.

Als neu beschrieben werden *Nesta moluensis*, p. 342 t. 25, fig. 1; *Sitala rariocostulata*, p. 342 t. 25 fig. 2; — *S. baritensis*, p. 343 t. 25 fig. 3; — *S. moluensis*, p. 343 t. 25 fig. 4; — *Cyclophorus everetti* p. 343 t. 25 fig. 5; — *Logocheilus baritensis* p. 344 t. 25 fig. 6; — *L. jucundus* p. 344 t. 25 fig. 7; — *L. inornatus* p. 345 t. 25 fig. 8; — *L. altus* p. 345 t. 25 fig. 9; — *L. borneensis* p. 346 t. 25 fig. 10; — *Opisthotoma mirabile* p. 346 t. 25 fig. 11. — *O. everetti* p. 346 t. 25 fig. 12; — *O. jucundum*, p. 347 t. 25 fig. 13; — *O. wallacei* Aucey (= *cristatum* Smith mss.) t. 25 fig. 14; — *O. baritense* p. 347 t. 25 fig. 15; — *O. busanense* p. 348 t. 25 fig. 16; — *Diplommatina sulphurea* p. 348 t. 25 fig. 17; — *D. moluensis* p. 348 t. 25 fig. 18; — *D. symmetrica* p. 349 t. 25 fig. 19; — *D. excentrica* p. 349 t. 25 fig. 20; — *D. everetti* p. 349 t. 25 fig. 21; — *D. baritensis* p. 350 t. 25 fig. 22; — *Arinia borneensis* p. 350 t. 25 fig. 23; — *Ar. similis* p. 350 t. 25 fig. 24; — *Georissa gomantonensis* p. 351 t. 25 fig. 25; — *G. similis* p. 351 t. 25 fig. 26.

Smith, Edgar A., on a small collection of Land-Shells from Balabac and Palawan, Philippine Islands. In Ann. Mag. N. H. (6) XI p. 347.

Dreizehn Arten, davon neu: *Macrochlamys pseustes* p. 348 t. 18 fig. 1–3; — *Lamprocystis chlororhaphie* p. 348 t. 18 fig. 4–6; — *Trochonanina paraguensis* p. 349 t. 18 fig. 7–9; — *Leptopoma palawensis* p. 352 t. 18 fig. 20, 21; — *Lagochilus similis* p. 352 t. 18 fig. 14–16. Ausserdem werden noch abgebildet *Amphidromus quadrasi* Hid. und *Cyclotus einzonis* Dohrn.

Smith, Edgar A., Note on the genera Geothauma and Gyrostropha. Ibid. p. 284.

Beide Gattungen werden als absolut überflüssig erklärt.

The Journal of Conchology Vol. VII. pp. 7 und 8.

- p. 193. Gockerell, T. D. A., *Arion occidentalis*, an apparently new species.
 p. 195. Standen, R. Land- und Freshwater Mollusca collected around
 Portsalon, County Donegal, Ireland.
 p. 208. Simroth, Dr. H., some remarks with respect to Mr. Wofftons
 Paper on the Life-history of *Arion ater*.
 p. 210. Guppy, R. J., Lechmere, the Land- and Freshwater Mollusca
 of Trinidad.
 p. 232. Knight, G. A. Frank, Contribution towards a List of the Marine
 Mollusca of the Upper Portion of Loch Linnte, Argyllshire.
 p. 244. Marshall, J. T., Additions to British Conchology.
 p. 265. Cooper, J. E. Note on *Helix pisana* in the Channel Island.
 p. 266. Standen, R. and J. Ray Hardy, the Land- and Freshwater
 Mollusca of Oban and the Island of Lismore.
 p. 274. Milnes, Rev. Herbert, List of the Land- and Freshwater Shells
 of Derbyshire.

Sterki, Dr. V., Observations on Vallonia. In Pr. Acad. N. S.
 Philadelphia 1893 p. 234 pl. VIII (and Tryon Manual
 (2) VIII pl. 32 und 33.)

Der Autor betrachtet *Vallonia* als Gattung und unterscheidet innerhalb derselben folgende Arten, welche sämmtlich in Tryon-Pilsbry l. c. abgebildet sind: *pulchella* Müll. nebst var. *eumensis* Gredl., *hispanica* n., *persica* Rosen; — *excentrica* n. = *Hel. minuta* Say ex parte; — *adela* Westerl.; — *declivis* n. = *tenuilabris* Glessin. nec Braun, nebst var. *altilis* n.; — *pollinensis* Paul; — *costata* Müll. nebst var. *helvetica* n., *amurensis* n., *pyrenaica* n., *montana* n.; — *albula* n. von Quebec; — *parvula* n. aus den Prairien; — *tenera* Reinh. = *pulchellula* Heude, China und Japan; — *patens* Reinh., China; — *gracilicosta* Reinh., Nordwestamerika; — *perspectiva* n., Appalachen; — *tenuilabris* Br.; — *mionecton* Bttg., Caucasus, nebst var. *schanabalensis* Rosen; — *ladacensis* Nevill nebst var. *asiatica*, Tibet.

Norman, the Rev. Canon, a Month on the Trondjem Fjord.
 In Ann. Mag. N. H. (6) XII. 1893 p. 341.

Es werden 165 Arten aufgeführt, davon mehrere neu für den Fjord.
 Für Jumala Friele wird der Name *Ukko* substituirt, da Jumala im Finnischen heute noch Gott bedeutet. Abgebildet werden *Ukko turtoni* var. *tumida*, *U. schantaricus*, *Sipho gracilis* var. *glaber* und *proquinqus*.

Journal de Conchyliologie. Vol. 41. 1893, Lfg. 1.

- P. 5. Fischer, H., sur quelques travaux récents relatifs à la Morphologie des Mollusques univalves (Gastropodes Prosobranches et Opisthobranches, Scaphopodes).
- p. 16. Dautzenberg, P., Liste des Mollusques marins recueillis à Grenville et à Saint-Pair.
- p. 31. Grosse, H., et P. Fischer, Description d'un *Bulinulus* et d'un *Anodonta* nouveaux, provenant du Mexique (*B. Chaperi* t. 1 fig. 1, 2 und *Anodonta telmantepecensis*).
- p. 32. Fischer, H., Note sur l'animal du *Bulinulus Chaperi*.
- p. 33. Dautzenberg, Ph., Description d'un *Perideris* nouveau provenant du Dahomey (*P. Lechatellieri*).
- p. 35. Dautzenberg, Ph., Description d'une nouvelle espèce du genre *Littorina*, provenant des côtes de la Tunisie (*L. Nervillei*).
- p. 36. Drouët, H., *Unionidae* nouveaux ou peu connus. (*U. Barroisi* und *tinctus* aus Syrien, *mansellianus* aus dem Sperchios, *radulosus*, *lingulatus*, *sacculus*, *lugens*, *fulvaster*, *trumpi* aus Borneo, *Anodonta discoidea* aus dem Aaron, *An. albica* aus der Aube, *An. planulata*, *viridillava* aus Finland, *baudoniana* aus der Aube).
- p. 50. Dautzenberg, Ph., Description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo français (*Spatha corrugata*).
- p. 51. Mayer-Eymar, C., Description de Coquilles fossiles des terrains tertiaires inférieures (suite). *Neu Pecten Meissonieri*, *Lima triangula*, *Arca rustica*, *Lucina perandoi*, *Isocardia justinensis*, *Cyrena circumsulcata*, *Michelotti*, *Venus justinensis*, *Tapes fabaginens*, *Psammobia protracta*, *Tellina perandoi*, *Tellina reducta*, *Cylichna crassiplicata*).

Journal de Conchyliologie. Vol. 41. 1893. Lfg. 2.

- P. 85. Fischer, H., Note sur quelques points de l'histoire naturelle du genre *Eutrochatella* P. Fischer (*Trochatella* Sw. nec Lesson). Für *Helicina constellata* Morel, wird des abweichenden Deckels wegen die neue Untergattung *Prietrochatella* errichtet.
- p. 90. Vayssière, A., Etude zoologique de *Weinkauffia diaphana*.
- p. 97. Vayssière, A., Observations zoologiques sur le *Grepidula Moulinii*, Mich.
- p. 110. Grosse, H. et Fischer, P., Diagnoses molluscorum novorum. *Reipullicae mexicanae incolarum* (*Anodonta chalcocœnsis*, *Unio distinctus*, *U. soledadensis*).

p. 106. Vayssière, A., Note sur les coquilles de l'Homalogyra polyzona et de l'Ammonicera Fischeriana.

Proceedings of the Malacological Society of London, edited by B. B. Woodward. Vol. I No. 1.

- p. 5. Godwin-Austen, H. H., on the Genus Paryphanta. With pl. 1.
 p. 10. Smith, Edg. A., 6 new Species of Land-Shells from Annam. (Macrochlamys promiscua, Rhyssota pergrandis, Hadra pachychilus, Amphidromus costifer, Cyclophorus eudeli, consociatus, mehrere in Zinkographie abgebildet).
 p. 14. Sowerby, G. B., notes on the genus Carinaria, with an enumeration of the species and the description of a new form. (Neu C. elata).
 p. 17. Scharff, R. F., Note on the geographical distributio of Geomacellus maculosus Altm. in Ireland. — Mit Karte.
 p. 19. Crouch, Walter, on the occurrence of Grepidula fornicata in Essex.
 p. 20. Woodward, M. F., on the anatomy of Ehippodonta Macdougalli Tate — with pl. II.
 p. 27. Sowerby, G. B., Description of a new species of Cancellaria from Penang (Scalptia eudeli).
 p. 20. Sykes, E. R., on the Clausiliae of sumatra, with descriptions of two new species and a new variety. (Cl. aenigmatica, melvilli und sumatrana var. vicaria, alle abgebildet).

Eingegangene Zahlungen:

Tomlin, Ch., Mk. 12; — Riemenschneider, N., Mk. 6; — Seibert, E., Mk. 6; — Goldfuss, H., Mk., 6; — Clessin, O., Mk. 6; — Salm-Salm, A., Mk. 6; — Arnold, N., Mk. 6; — Schmidt, W., Mk. 6; — Wagner, W., Mk. 12; — Wohlgemuth, B., Mk. 5.37; — Metzger, M., Mk. 6; — Sterki, N. Ph., Mk. 16.49.

Anzeigen.

 Eine sehr reichhaltige, werthvolle Sammlung seltener Muscheln, vorzugsweise von den Molukken, ist wegen Sterbefalles preiswürdig zu verkaufen. Fr. Off. unt. **F. No. 1** an M. Diesterweg, Verlagsbuchhandlung in Frankfurt a. M.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M., Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 25-32](#)