

Diagnosen neuer Arten.

Von

E. von Martens.

1. *Helix (Acusta) plicosa* sp. n.

T. aperte perforata, globosa, confertim plicato-striata, flavescenti-vel rufescenti cornea; spira sat elevata, conoidea; anfr. 6, convexiusuli. sutura sat profunda divisi, ultimus inflatus, rotundatus; apertura paulum obliqua, lunato-circularis, peristoma simplex, rectum, margine columellari arcuato, triangulatum reflexo, plus minusve rosaceo.

Diam. maj. 25, min. $20\frac{1}{2}$, alt. $21\frac{1}{2}$; aperturae diam. 19, alt. 15 mm. Japan, Rolle.

In der allgemeinen Gestalt zwischen *H. sieboldiana* Pfr. und *ravida* Bens. stehend, breiter als erstere und nicht so breit als letztere (in der Richtung des grossen Durchmessers), von beiden aber durch die scharfe Rippenstreifung leicht zu unterscheiden. Das eine grössere Exemplare, dessen Ausmessungen angegeben sind, ist gelblichbraun, auf den oberen Windungen schon etwas röthlich, das zweite nur 20 mm im Durchmesser, auch auf der letzten mehr röthlichbraun, eine Farbenvariation wie sie z. B. auch bei *H. rufescens* an demselben Fundorte vorkommt.

2. *Lippistes rollei* sp. n.

T. transversim elongata, striis spiralibus elevatis numerosis exarata, obtuse biangulata, nitida, pallide rubella; anfr. $4\frac{1}{2}$, contigui; apertura quadrangula, extrorsum dilatata, peristomate simplice, margine columellari appresso, paulum incrassato, supero et externo rectilineis, infero leviter sinuato. Diam. maj. 7, min. 3, alt. 4; apert. diam. $4\frac{1}{2}$, alt 4 mm.

Japan, bei Iki in feinem Sand gefunden; von H. Rolle erhalten.

Durch feinere Streifung und rascher zunehmende Windungen von der typischen Art der Gattung *Lippistes Montfort* 1810 (*Argonauta cornu Fichtel et Moll.* 1803, *Cornu carinatum* Schumacher 1817) aus Süd-Afrika verschieden. Ob das einzige mir vorliegende Stück völlig erwachsen ist oder bei weiteren Wachstum die letzte Windung vielleicht auch noch ein wenig sich ablösen würde, kann ich nicht entscheiden. *Lippistes* dürfte vermuthlich in die Nähe von *Cyclostrema* gehören, während die öfter damit zusammengeworfene Gattung *Separatista*, von *A. Adams* 1850 auf *S. grayi* gegründet, durch entschieden vortretende Spitze und dunkle Schalenhaut unterschieden, ganz nahe an *Trichotropis* herankommt, vgl. z. B. *Trichotropis blainvilliana Petit* Journ. de Conch. II 1851 p. 22 Taf. 1 Fig. 5 (von den Gebrüdern Adams gen. II p. 136 zu *Separatista* gestellt) mit *Tr. bicarinata Brod. et Sow.*

Diagnosen neuer orientalischer Arten.

Von

Hermann Rolle.*)

1. *Helix (Levantina) lapithoënsis* n.

T. perspectiviter umbilicata, depressa, solidula, laeviuscula, infra suturam tantum distinctius striatula, fasciis 5 fascis, albo fulguratim interruptis ornata; spira vix elevata, apice obtuso, concolore. Anfr. 4 convexi, sutura profunda discreti, sat celeriter crescentes, ult. aperturam versus dilatatus, antice profunde deflexus.

*) Ich gebe hier die vorläufigen Diagnosen einer Anzahl der von mir auf meiner Sammelreise erbeuteten Novitäten: die genauere Beschreibung und Abbildung wird in einer eigenen Arbeit erfolgen, welche ich mit Herrn Dr. Kobelt zusammen herausgeben werde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Martens Carl Eduard von

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten 135-136](#)