

Diagnose eines neuen Buccinum.

Von

H. Rolle.

Buccinum Martensianum n.

Testa ovato-acuminata, apice exserto, solidula, albida, apicem versus lutescens, epidermide crassa fusca confertissime plicatula, haud ciliata induita. Anfractus 8—9 superi rotundati, convexi, a tertio spiraliter lirati, dein subcarinati. inferi superne decliviter tabulati, liris 4 fortibus cariniformibus cincti, lirulis 4 minoribus, singulis intercedentibus, inter suturam distincte impressam et carinulam superam confertius lirati, ultimus spirae altitudinem superans, striis incrementi filiformibus perdistinetis sculptis, carinulis 4 superis irregulariter noduliferis, dein infra peripheriam liris confertis spiralibus sculptus, inflatus, antice ascendens, basi compressus, emarginatus. Apertura quadrangulari-ovata, nitide alba; columella vix obsolete biangulata, callo tenuissimo appresso induita; labium externum acutum eversum, intus vix levissime albo-incrassatum, supra profunde sinuatum, effusum, dein productum, basi profunde emarginatum.

Alt. 62, diam. max. 35, alt. apert. obl. 30 mm.

Hab Japan.

Zu der nächsten Verwandtschaft des *Buccinum terrae novae* Beck von Spitzbergen (Kobelt in Mart. Ch. II t. 83 fig. 3.4) gehörend, aber ausser der Heimath durch die ganz weisse Mündung und die Details der Skulptur gut verschieden. Ich habe leider nur ein Exemplar direkt von Japan erhalten.

Zur systematischen Stellung von *Sphyradium* („*Pupaedentulum Drp.*

Im „Nautilus“ (X. No. 7) veröffentlicht Dr. Sterki die Mittheilung, dass die oben genannte Art nicht zu Pupa

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Rolle Franz Hermann

Artikel/Article: [Diagnose eines neuen Buccinum 128](#)