

No. 3 u. 4.

Reed May 21/97

März-April 1897.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Aeltere Jahrgänge des Nachrichtsblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehörende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Diagnosen neuer Arten aus Kükenthals Ausbeute.

Von

W. Kobelt.

1. *Helicarion kükenthali* n.

Testa rimata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, subtiliter plicato-striatula, lineis spiralibus leviter impressis decussata, nitens, corneo-fulva, subitus pallidior. Anfractus 4 rapide crescentes, convexi, sutura appressa, marginata, crenulata disjuncti, ultimus tumidus, magnus. Apertura valde obliqua, peraunpla, rotundato-ovalis, modice excisa; peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. maj. 24, alt. 18, apert. lat. 14.5, long. 15.5 mm.

Halmahera alt. 3000'.

2. *Everettia möllendorffii* n.

Testa rimata, deppressa, solidula, striatula, nitens, straminea; spira breviter elevata, lateribus fere strictis. Anfractus 5 lente accrescentes, sutura profunda discreti, sat convexi. Apertura parum obliqua, late elliptica, sat exenta; peristoma rectum, acutum, margine columellaris superne brevissime reflexo.

Diam. 13, alt. 7.5 mm.

Minahassa.

3. *Vitrinococonus celebesianus* n.

Testa late et pervie umbilicata, umbilico subcylindrico circiter $\frac{1}{3}$ diam. adaequante, trochiformis, tenuis, subpellucida, curvatim striatula, nitidula, corneo-fulva; spira sat elevata, lateribus concavis; anfr. 8 plani, lentissime crescentes, sutura per carinam exsertam brumneam filomarginata disjuncti, ultimus acute carinatus, basi vix convexiusculus, circa umbilicum angulatus. Apertura modice obliqua, angusta, securiformis; peristoma simplex, rectum.

Diam. maj. 6.5, alt. 3.5 mm.

Minahassa. Der erste sichere Vitrinococonus ausserhalb der Philippinen.

4. *Dendrotrochus celebesianus* n.

Testa imperforata, depresso-tectiformis, solidula (? corneo-brunnea); spira breviter elevata, lateribus strictis. Anfractus $6\frac{1}{2}$ plani, lente accrescentes, acute carinati, sutura per carinam exsertam canalicularis disjuncti, striatuli, pone carinam lineolis spiralibus confertis cincti, ultimus carina utrinque exserta, peracuta munitus, basi glabratu. Apertura modice obliqua, arcta, securiformis; peristoma superne rectum, basi modice expansum, undique intus labiatum.

Diam. maj. 9, alt. 4.5 mm.

Minahassa. Die erste Art der Gattung von Celebes.

5. *Raphaulus kükenthali* n.

T. sat aperte umbilicata, oblique ovato-oblonga, solidula, subpellucida, confertim costulato-striata, sericina, olivaceo-brunnea; anfractus 6, primi 4 sat convexi, regulariter accrescentes, spiram subregulariter conicam efficientes; duo ultimi distorti, ultimus descendens, pone aperturam paululum ascendens, ventre subapplanatus; apertura verticalis, circularis; peristoma late expansum, breviter reflexiusculum; canalis suturalis longus; orificium anfractui penultimo adiutum, ovale, a latere apertum. Operculum cornuum sat concavum, anfr. 6.

Alt. 12, diam. maj. 8, apert. cum perist. 5,5, intus $3\frac{1}{3}$ mm.
Hab. ad fluvium Baram ins. Borneo septentrionalis.

Steht in der Grösse zwischen *R. bombycinus* Pfr. (14 mm) und *pfeifferi* Issel (10,5 mm). Die streptaxide Abweichung der letzten Windung ist stärker als bei der ersteren, aber schwächer als bei der zweiten, von beiden schiedet sie der seitlich geöffnet Nahtkanal; die Oeffnung ist bei den beiden älteren Arten von vorn sichtbar.

6. *Cyclotus (Pseudocyclophorus) euryomphalus* n.

Testa late et aperte umbilicata, depressa, solida, leviter striatula, lutea, strigis flammulatis castaneis pieta; spira brevissime conoidea. Anfractus 5 teretes, sat celeriter accrescentes, sutura profunda fere canaliculata disjuncti, ultimus ad aperturam brevissime campanulatus. Apertura parum obliqua, sat ampla, circularis; peristoma duplex. internum breviter porrectum, externum brevissime expansum.

Diam. maj. 18, alt. 10,5, diam. apert c. perist. 7,7 mm.
Halmahera.

7. *Pupina (Siphonostyla n.) longituba* n.

Testa oblique ovata, subirregularis, solidula, laevigata, nitens, (aurantiaca vel fulvo-brunnea?); anfractus 5 convexiusculi, superiores spiram subregulariter breviter cono-

ideam efficienes, penultimus paullum, ultimus valde devians, distortus, ventre applanatus, valde descendens, ad aperturam breviter ascendens. Apertura verticalis circularis; peristoma rectum, valde incrassatum, late porrectum, margo superus in anfractum penultimum protractus. Canalis superus subcircularis, inferne horizontalis, angustus, a latere longissime sursum usque ad peripheriam anfractus ultimi protractus, lamella columnari late recurvata obtectus.

Diam. 12, alt. 14, alt. obl. 15, lat. anfr. nlt. 9, diam apert. cum perist. 6,5, long. canalis inf. 8 mm.

Halmahera.

Eine durch die eigenthümliche Verlängerung des unteren Kanals ausgezeichnete Art, welche mit *Pupina lobifera* Mrts. zusammen eine eigene Untergattung bilden muss, für welche Möllendorff und ich in den in (nächster Nummer beginnenden) systematischen Katalog der Pneumonopomen den Namen *Siphonostyla* vorschlagen.

Drei neue Arten.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

1. *Plectopylis linterae* Mldff.

T. sinistrorsa, latissime umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter plicato-striata, lineis spiralibus tenuibus decussata, luteoflava, strigis castaneis regulariter variegata. Spira vix prominula. Anfractus 6 lente accrescentes, planiusculi, ultimus supra peripheriam subdistinete angulatus, tum convexiusculus, circa umbilicum subangulatus, antice breviter deflexus. Apertura maxime obliqua, oblique cordiformis; peristoma sat expansum, reflexum, valde incrassatum, albolabiatum, marginibus callo vallido elevato continuis. Lamella

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Arten aus Kükenthals Ausbeute. 25-28](#)