

Von diomedes scheidet sie der schärfere Kiel, das niedrigere Gewinde, der plötzlich herabgebogene letzte Umgang und die S förmige Krümmung des oberen Mundsauemes.

---

### Diagnosen neuer und kritischer Landdeckelschnecken.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

---

#### *Truncatella stimpsoni* Stearns.

T. rimata, subcylindrica, truncata, pallide fulva, costulis sat validis — 25 in anfr. ultimo — sculpta. Anfr. qui restant  $4\frac{1}{2}$  sat convexi, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus pone aperturam crista transversa valida indutus. Apert. verticalis, oblique ovalis, peristoma superne appressum leviter expansum.

Diam. 1,9, alt. 4,5 mm.

*Truncatella Stimpsoni* Stearns Proc. Calif. Acad. IV. 1872 p. 248, t. 1 f. 5 (teste Pfr. Mon. Pneum. Suppl. III p. 21).

Hab. in California (comm. R. Damon).

#### *Taheitia anctostoma* Quadr. et Mlldff.

T. rimata, subcylindrica, solidula, costis elevatis sat distantibus — 21 in anfr. penultimo — sculpta, fulva aut rubella. Spira truncata. Anfr. qui supersunt 5 planulati, sutura profunda disjuncti, ultimus basi fortiter cristatus, crista cum peristomate externo continua. Apertura perarcta, oblique oviformis, peristoma externum late patens, valde incrassatum, internum solutum, porrectum, modice expansum.

Alt. 6,5, diam. 2,75 mm.

Hab. in parte septentrionali insulae *Mindanao* et ad oppidum *Puerto Princesa* insulae *Paragua* leg. J. Quadras.

*Taheitia tessellata* Bttg. (mss.)

T. rimata, subcylindraneo-turrita, costulis flexuosis saepe interruptis et confluentibus, confertis, circa 50 in anfr. ultimo, sculpta, pallide lutescens aut pallide rubella, ad suturam maculis albis tessellata. Spira sensim attenuata truncata. Anfr. qui supersunt 6 convexiusculi, sutura sat impressa disjuncti, ultimus infra peripheriam subdistincte angulatus. Apertura fere verticalis, irregulariter ovalis; peristoma superne appressum, continuum, sat expansum, sinuosum.

Diam 4, alt 11 mm.

Hab. in archipelago Bismarekiano.

*Blanfordia bensoni* A. Ad.

T. rimata, pyramidata, solidula, subtiliter striatula, olivaceo-straminea, opaca. Spira turrita, regulariter conica apice eroso. Anfr. qui supersunt 5, sat convexi, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus paullum distortus, antice ascendens. Apertura verticalis obliqua ovalis; peristoma continuum superne adnatum, vix expansum, longe porrectum.

Diam. 5.2, alt. 9 mm.

Hab. prope oppidum Hakodati insulae japonicae Jeso leg. cl. B. Schmaeker.

*Leptopoma latilabre* Mart.

T. anguste umbilicata, subdepresso-turbinata, solidula, subpellucens, subtiliter striatula, microscopice decussata, alba. Spira modice elevata, lateribus strictis. Anfr. 5½ convexi, ultimus ad peripheriam subangulatus. Apert. modice obliqua, subcircularis, peristoma distincte duplex, externum late expansum, ad umbilicem profundiuscule sinuatum, attenuatum, internum callo crassiusculo continuum, subexpansum.

Diam 13,5, alt. 12, apert. diam. 8,25 mm.

*L. vitreum* var. *latilabre* Mart. Ostras. p. 144, t. IV, f. 5.  
Hab. Ceram.

*Leptopoma fibulinum* Quadr. et Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, globoso-turbinata, tenuis, subpellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus tenuissimis confertis et liris parum elevatis 5 cincta, alba. Spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. 6 planulati, ultimus convexiusculus, subacute carinatus, carina antice evanescente. Apertura valde obliqua, late ovato-acuminata, peristoma sat expansum, ad perforationem profunde sinuatum, subexcisum.

Diam. 17, alt. 17,5 mm.

Hab. in insulis Calamianes dictis.

*Leptopoma antonii* Kob.

T. anguste et semiobtecte perforata, solidula, elate trochiformis, subtiliter striatula, lineis spiralibus tenuissimis, maxime confertis decussata, liris elevatis 5 plus minusve distinctis cincta, albida maculis parvis luteo-corneis seriatim picta. Spira valde elevata, subregulariter conica. Anfr. 7 planulati, sutura per carinam exsertam late marginata disjuncti, ultimus convexiusculus, carina peracuta utrimque valde exserta carinatus. Apert. diagonalis, rotundato-rhomboida, peristoma modice expansum, albolabiatum, ad carinam protractum, subcanaliculatum, ad perforationem dilatatum.

Diam. 17, alt. 19,5 mm.

*Leptopoma pileus* var. *antonii* Kobelt Landdeckelschn. Phil. p. 38, t. V, f. 19—21.

Hab. ad vicum Pamplona insulae Luzon provinciae Cagayan.

*Lagochilus romblonense* (Hid.)

T. anguste et semioblecte umbilicata, globoso-turbinata, tenuiuscula, subpellucida, striatula, liris spiralibus numerosis, quarum 4 fortiores, cincta, costulis membranaceis valde diducis induta, pilis longiusculis confertis hirsuta, luteo-fulva, strigis flammulatis castaneis saepe interruptis et ad suturam maculis castaneis et flavidis regulariter alternantibus picta. Spira modice elevata, lateribus fere strictis. Anfr. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> convexi, ultimus tumidus. Apert. modice obliqua, ampla, fere circularis, peristoma modice expansum, albolabiatum, superne ad insertionem subangulatum.

Diam 14,5, alt. 13, apert. diam. 7,5.

*Cyclophorus romblonensis* Hid. J. de Conch. 1888 p. 83 (nomen).

Hab. Romblon Philippinarum.

*Lagochilus reticulatum* Mldff.

T. sat aperte umbilicata, depressa, solidula, costulis transversis et lineis spiralibus elevatis confertis quasi reticulata, flava, strigis fulguratis castaneis regulariter picta. Spira depresso conoidea. Anfr. 5 convexi, sutura profunda disjuncti, ultimus subcompressus, subangulatus, antice paullum descendens. Apert. sat obliqua, circularis, peristoma modice expansum, labiatum, superne ad insertionem breviter excisum.

Diam. 7,8, alt. 5,5 mm.

Hab. in parte septentrionali insulae Celebes leg. cl. H. Fruhstorfer.

*Lagochilus barbatum* Gld.

T. anguste perforata, sat elate turbinata, tenuis, subpellucida, lineis spiralibus confertis et costulis membranaceis quasi reticulata, brunnea. Spira sat elevata lateribus

strictis. Anfr. 5 valde convexi, sutura profunde impressa disjuncti, ultimus ad peripheriam indistincte biangulatus, in angulo utroque serie setorum longiuseulorum indutus. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma vix expansum, ad insertionem distincte excisum.

Diam. 4,5 alt. 4,5.

*Cyclostoma barbata* Gould Proc. Bost. Soc. N. H. VI 1959 p. 425, *Japonia barbata* Gld. Ota p. 104. Kob. Jap. p. 114. — *Lagochilus* b. Mlldff. J. D. M. G. XII p. 364.

Hab. in insula Nippon.

*Scabrina laotica* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, conoideo-depressa, solidula, subtiliter striatula, costulis membranaceis confertis fasciatim interruptis induta, lutea, strigis flammulatis castaneis et infra peripheriam taenia angusta castanea ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> teretes, sutura modice impressa disjuncti. Apert. modice obliqua, circularis, peristoma vix expansum, multiplicatum, subporrectum, superne ad insertionem breviter excisum.

Diam. 9,5. alt. 5,5 mm.

Hab. prope Luang-Prabang regionis Lao leg. cl. C. Roebelen.

*Leptopomatoides valvatus* Blfd.

T. sat late et pervie umbilicata, depresso turbinate, solidula, subtiliter striatula, olivaceo-flavida, nitidula. Anfr. 5 teretes, ultimus non descendens. Apertura parum obliqua, circularis, peristoma simplex, rectum, obtusum.

Diam. 7. alt. 5 mm.

Hab. in Canara meridionali Indiae.

*Pterocyclus comitis* Beddome.

T. latissime umbilicata, depressa, fere discoidea, solida. plicato-striatula, lutea, strigis flammulatis castaneis regulariter picta. Spira brevissime conoidea. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  teretes, sutura profunda subcanaliculata disjuncti, ultimus antice longiuscule descendens. Apert. diagonalis, circularis, peristoma duplex, internum superne profunde excisum, externum superne in alam tubuli instar compressam antice deflexam productum.

Diam. 16,33, alt. 8,66 mm.

Hab. in montibus Anamalli Indiae.

*Pterocyclus pseudocumingi* Nev.

T. latissime umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter striatula, pallide lutea, strigis flammulatis castaneis et taenia peripherica alba, altera castanea infra illam picta. Spira vix prominula. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  teretes, sutura profunda impressa disjuncti, ultimus paullum descendens. Apert. modice obliqua, circularis, peristoma duplex, internum superne valde excisum, externum in alam magnam anfractui penultimo adnatam productum. Operculum intus profunde excavatum, extus lamella subtestacea anfr. 7 floris instar convergentibus indutum.

Diam. 14,25, alt. 5 mm.

Pt. cumingi var. Nevill Handl. p. 267. — Pt. pseudocumingi Nev. Mss.

Hab. Travancur.

*Pterocyclus schmuckeri* Mlldff.

T. latissime umbilicata, discoidea, subtiliter plicato-striata, corneo-fulva, strigis fulminulatis castaneis interdum dilutis marmorata, ad peripheriam fusco-taeniata. Spira brevissime prominula. Anfr. 5 teretes, ultimus breviter des-

cendens. Apertura diagonalis, circularis, peristoma duplex, internum breviter porrectum, superne profunde excisum, externum latissime expansum, superne in alam compressam anfr. penultimo longe adnatam productum, extus et basi antrorsum leviter involutum, ad umbilicum attenuatum. Operculum intus valde concavum, extus sat convexum marginibus anfractuum lamellatim elevatis.

Diam. maj. 22.5, min. 18, alt. 10.5 apert. diam. (intus) 7, e. perist. 9.5 mm.

Hab. in monte Omi provinciae sinensis Sytshuan.

*Platyhappe expansilabris* Mlldff.

T. late umbilicata, conoideo-depressa, solidula, subpellucens, transverse plicato-striatula, lineis spirabilis microscopicis decussatula, opaca, subpruinosa, caerulescenti-brunnea, basi pallidior. Spira gradata, apice obliquo, mammillari, glabro. Anfr. 5 teretes, celeriter accrescentes, ad suturam applanati, ultimus longe descendens. Apert. valde obliqua, subcircularis, peristoma late expansum, haud reflexum, superne valde protractum, ad umbilicum attenuatum. Operculum normale, lamina externa sat concava, anfr. 9 oblique striatulis.

Diam. maj. 14, min. 11, alt. 9, apert. diam. 6,25 mm.

Hab. in insulis Busuanga et Tangat archipelagi Calamianes dicti.

*Platyhappe schnackeri* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, discoidea, solidula, subtiliter plicato-striatula, lineis spiralibus confertis decussata, opaca, brunneo-grisea. Spira vix elevata, apice mucronato, obliquo. Anfr. 5 teretes, ad suturam profunde impressam applanati, fortius plicati, ultimus antice breviter deflexus. Apertura valde obliqua, ampla, subcircularis, peristoma late expansum, subincrassatum, superne protractum, ad umbilicum

attenuatum. Operculum extus paululum concavum, anfr. 10 oblique striatis.

Diam. 17, min. 13, alt. 9,5, apert. diam. 7,5 mm.

Hab. ad fluvium septentrionalem provinciae sinensis Guangdong leg. cl. B. Schmacker.

*Opisthoporus deflexus* Mlldff.

T. late et aperte umbilicata, umbilico  $\frac{1}{4}$  diametri aequante, depressa, solidula, subtiliter plicato-striata, subnitens, olivaceo-straminea. Spira breviter conoidea. Anfr. 5 teretes, ultimus antice longe descendens, breviter solutus. Tubulus suturalis inter anfractum penultimum et ultimi partem solutam abrupte deflexus. Apert. paululum obliqua, circularis, peristoma extus breviter campanulatum, tum leviter involutum. Operculum normale, lamella calcarea parum concava, anfr. 8 oblique ruditer striatis.

Diam. 16,5, alt. 10,5, apert. diam. 6,9 mm.

Hab. in regione Badung provinciae sinensis Hubei leg. Rev. P. A. Fuchs.

= *O. borealis* Heude non Mlldff.

*Pupina mitis* Hinds.

T. oblonga, laevigata, nitens, luteo-brunnea. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  convexusculi, sutura latiuscule marginata disjuncti, superiores spiram convexo-conoideam efficientes, ultimus paululum distortus, longe descendens, antice paululum ascendens. Apert. verticalis, subcircularis, peristoma vix expansum, incrassatum, margo externus breviter in anfractum penultimum productus, cum lamella parietali humili canalem superum formans, canalis inferus columellam haud perforans.

Diam. 4, alt. 7 mm.

Hinds Ann. Mag. N. H. X p. 83, t. VI f. 7.

Hab. in archipelago Bismarkiano.



*Pupina miokoana* Mouss.

T. subcylindraco-oblonga, tenuis, pellucida, laevigata, pallide lutescens. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  plani, sutura parum distincta, submarginata disjuncti, superi spiram convexo-conoideam efficientes, ultimus paullum devians, antice brevissime ascendens. Apert. verticalis, circularis, peristoma vix expansum, incrassatum, margo superus pone insertionem calloso-subdentatus, cum lamella parietali humili sed valida canalem superum formans, canalis inferus angustus, lateraliter in foramen circulare desinens.

Diam. 3, alt. 5,5 mm.

Hab. in insulis Mioko et Nova Lauenburg archipelagi Bismarckiani

var. minor. Diam. 3,5, alt. 6.

Hab. in insula Duke of York (Neu Lauenburg).

var. aperta Mouss. minor, anfr. paullo convexioribus.  
Diam. 3,9, alt. 6,5 mm.

Hab. ?

*Hargravesia luzonica* Mlldff.

T. oblique ovato-oblonga, solidula, subpellucida, laevis, valde nitens, fulvo-cornea. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  planulati, superi spiram subregularem, convexo-conoideam efficientes, penultimus paullum, ultimus sat distortus, antice breviter ascendens. Apert. paullum retrorsum inclinata, circularis; peristoma rectum incrassatum, margo dexter longe in anfractum penultimum productus, cum lamella parietali valida canalem superum formans, tum sinuosus, basalis sat protractus, columnaris profundiuscule sinuatus, haud scissus.

Diam. 6, alt. 8.

Hab. prope Dingalan provinciae Nueva Ecija in insula Luzon leg. coll. indigena.

*Moulinsia semperi* Mlldff.

T. streptaxidiformis, solidula, laevis, valde nitens, laete flava. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  planiusculi, superi spiram subregularem depressam efficientes, ultimi valde deviantes et distorti, ultimus ventre sat applanatus, antice paullum ascendens. Apert. sat obliqua, subcircularis, peristoma vix expansum, valde incrassatum, flavum, canalis inferus angustus, marginem haud attingens.

Diam. 5,5, alt. (in axide) 5, long. (oblique) 6, lat. 4 mm.

Hab. prope Abatuaa insulae Luzon septentrionalis leg. cl. C. Semper, prope Palanan cl. J. Quadras.

*Moulinsia dissimilis* Mlldff.

T. subcylindraceo-oblonga, tenuis, pellucida, laevis, nitens, pallide brunneo-cornea. Spira superne convexo-conoidea apice acutulo. Anfr. 6 sat convexi, ultimus leviter distortus, longe descendens, antice vix ascendens. Apert. verticalis, circularis, peristoma paullum expansum, reflexiusculum, sat incrassatum, canalis inferus perangustus, foramen externum circulare.

Diam. 5,25, alt. 9,5 mm.

Hab. in provincia Ilocos Sur, nec non in districtu Tiagan insulae Luzon leg. cl. A. Schadenberg.

*Moulinsia goldfussi* Mlldff.

T. ovatulo-oblonga, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, pallide lutescens, nitens. Anfr.  $5\frac{1}{2}$  convexiusculi, ultimus paullum distortus, ventre valde applanatus. Apert. verticalis, subcircularis, peristoma rectum, sat incrassatum, superne callo lato appressum, margo columellaris fissura angusta, lateraliter aperta instructus.

Diam. 3,25, alt. 6,25 mm.

Hab. in colonia africana Kamerum teste cl. O. Goldfuss.

*Dioryx cariniger* Mlldff.

T. anguste perforata, irregulariter turbinata, tenuis, pellucida, striis costuliformibus maxime confertis et lineis spiralibus magis distantibus sculpta, pallidissime cornea, sericina. Spira sat clate conoidea apice acutiusculo glabrato brunneo. Anfr. 4 convexi, ultimus paullum distortus, compressus, carina exserta sat acuta cinctus, basi gibbus, pone aperturam valde constrictus. Tubulus suturalis perlongus, a strictura usque ad medium anfr. ult. productus. Apert. parum obliqua, circularis, peristoma duplex, externum campanulatum, expansum, incrassatum, concentricè striatum, ad columellam attenuatum, internum porrectum paullum expansum. Operculum terminale, corneum, tenue, subconca-  
vum, paucispirum, anfr. 4.

Diam. 5,5 alt. 5 mm.

Hab. Prope oppidum Luang-Prabang in regione Laos dicta leg. cl. C. Roebelen.

*Alycaeus (Charax) subhumilis* Nev.

T. anguste umbilicata, depresso-globosa, solidula, subpellucida, subtiliter striatula, costulis valde distantibus deciduis sculpta. Spira convexo-conoidea, sursum rubella. Anfr. 4 convexi, ultimus a medio tumidus, basi gibbus, tum valde constrictus, post stricturam crista valde elevata, cinctus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma extus sat expansum, valde incrassatum, quasi multiplicatum, intus porrectum, vix expansum, ad insertionem et basi sinuatum, sat excisum.

Diam. 2,8, alt. 2,2 mm.

Hab. in montibus Darjiling Indiae, comm. cl. R. Hungerford.

*Palaina doliolum* Mouss. (nuss.)

T. sinistrorsa, non rimata, ovata, tenuis, costulis fili-  
formibus, acutis, valde distantibus sculpta, corneorufa.

*Spira ventricoso-ovalis* apice mamillari glabrato. Anfr. 6 convexi, ultimus sat devians, initio valde constrictus, medio pallide taeniatus (rarius concolor), basi crista obtusula cinctus, antice breviter ascendens. Apertura verticalis, subcircularis, peristoma distincte triplex, primum breviter expansum, tum incrassato-porrectum, secundum sulco latiusculo ab illo separatum, breviter expansum, superne interruptum, tertium denuo sulco separatum, late expansum, continuum, superne subsolutum, ad columellam profundiuscule sinuatum.

Diam. 1,33, alt. 2,5 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum.

*Palaina kubaryi* Mlld.

T. sinistrorsa, rimata, ovata, solidula, confertim costulata, brunnea. Spira ventricoso-pyramidata apice obtusulo. Anfr. 6 convexi, ultimus vix distortus, initio leviter constrictus, antice sat ascendens, basi circa rimam crista compressa sat exserta fusca munitus. Apert. leviter obliqua, subcircularis, peristoma duplex, posterius breviter expansum, incrassatum subtus cum crista continuum, anterius sulco ab illo separatum, sat expansum, superne appressum.

Diam. 1,9, alt. 3 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum leg. cl. J. Kubary.

*Palaina ovatula* Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, oblonge ovatula, tenuis, luteo-cornea, confertim costulato-striatula; spira ovata apice obtusulo. Anfr. 5 convexi, ultimus vix distortus, antice brevissime ascendens. Apert. parum obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum parum expansum, internum maxime incrassatum, longe porrectum.

Diam. 1, alt. 1,9 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum.

*Cylindropalaina* Mlldff. n. sect. Palainae.

T. parva, plus minusve cylindrica, peristoma continuum.  
Typus: P. chrysalis Mlldff.

*Palaina (Cylindropalaina) beddomei* Braz.

T. sinistrorsa, vix rimata, subovato-oblonga, tenuis, pellucida, tenuiter costulato-striata, luteo-cornea. Spira sensim attenuata apice obtuso. Anfr. 6 bene convexi, ultimis initio constrictus, antice breviter ascendens. Apert. parum obliqua subcircularis, peristoma duplex, utrumque latiuscule expansum, sulco profundiusculo separatum.

Diam. 0,8, alt. 1,75 mm.

Hab. in colonia Queensland.

*Macropalaina* Mlldff. n. sect. Palainae.

T. spira acuminata, elongata.  
Typus: P. pomatiaeformis Mouss.

*Palaina (Macropalaina) scalarina* Mouss. (mss.)

T. sinistrorsa, rimata, ventricoso-pyramidata, solidula, costis crassiusculis sat distantibus — 20 in anfr. ultimo — sculpta, corneo-brunnea. Spira subregulariter pyramidata lateribus fere strictis, apice acuto. Anfr.  $7\frac{1}{2}$  convexi, ultimus initio leviter constrictus, ad stricturam arctius costatus, paulum distortus, antice sat ascendens, basi crista obtusa, bene exserta cinctus, interdum medio flavotaeniat. Apert. verticalis, subcircularis, peristoma duplex, externum breviter expansum, ad insertionem paulum dilatatum, tum excisum, ad columellam in processum liberum alaeformem productum, supra alam valde excisum, internum continuum breviter porrectum, superne appressum, ad columellam valde sinuatum.

Diam. 2, long. 4 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum.

*Palaina (Macropalaina) xiphidium* Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, ventricosulo-turrita, solidula, costis latiusculis bene exsertis, valde distantibus sculpta, brunnea. Spira valde elongata, lateribus paullum concavis apice acuto. Anfr. 8 valde convexi, sutura profunda disjuncti, ultimus sat distortus, ascendens, basi crassa inscula compressa munitus. Apert. paullulum retrorsum inclinata, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum, parum expansum, superne appressum, margine columellari profunde exciso, externum sat expansum, superne ad insertionem subdilatum, ad columellam valde excisum, tum in processum alaéformem latiuscule patentem productum.

Diam. 2, alt. 4, 5 mm.

Hab. in insula Ponape Carolinarum.

*Diancta graeffei* Mouss.

T. sinistrorsa, rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, costulis tenuibus valde distantibus sculpta, flavida. Spira pyramidata, lateribus convexiusculis. Anfr. 6½ convexi, ultimus paullum devians, antice vix ascendens, initio valde et late constrictus, tum inflatus. Apertura fere verticalis, rotundato-tetragona, peristoma duplex, primum breviter patens, sulco lato a secundo magis expanso separatum. Lamella palatalis brevis supra columellam conspicua.

Diplomatina graeffei Mouss. mss.

Diam. 1,25, alt. 2,5 mm.

Hab. in insula Vitilevu.

*Diancta macrostoma* (Mouss.)

T. sinistrorsa, rimata, ovato-acuminata, sat confertim costulata, luteo-cornea. Anfr. 6 sat convexi, penultimus paullum, ultimus valde distortus, valde ascendens, antice anfractum penultimum fere oblegens. Strictura in initio

anfr. ultimi. lamella palatalis brevis in prima tertia parte ejusdem. Apertura verticalis, subcircularis, peristoma duplex, externum interruptum, late patens, internum superne appressum, expansum, sulco lato ab illa separatum.

Diam. 1,5, alt. 2,75 mm.

*Diplommatina macrostoma* Mouss. ms.

Hab. in insula Vitilevu comm. cl. A. Mousson.

*Diplommatina leptospira* Mlldff.

T. vix rimata, gracillime turrita, tenuis, pellucida, costulis distantibus tenuibus (verosimiliter in alas productis) sculpta, alba. Spira gracillima lateribus subconcavis apice obtusulo. Anfr. 8 convexi, penultimus paullum prominens, ultimus angustus, initio leviter constrictus, antice vix ascendens. Apertura parum obliqua, subcircularis, peristoma duplex, internum continuum parum expansum, superne adatum, externum latissime expansum, patens, ad columellam parum excisum.

Diam. 0,75, alt. 2,5 mm.

Hab. ad vicum Loon insulae Bohol, comm. cl. O. Koch.

*Mychopoma ecul* Mlldff.

T. mediocriter umbilicata, turbinato-depressa, solidiuscula, transverse striata et lineis spiralibus confertis decussata, costulis membranaceis in series setorum brevium prolongatis hirsuta, ad peripheriam setis perlongis circumdata, pallide cornea. Spira modice elevata, convexo-conoidea apice obliquo, papillari. Anfr. 5 convexi, sat celeriter accrescentes, ultimus paulisper descendens. Apert. modice obliqua, ovalis, peristoma rectum, obtusum, superne sat protractum, sinuosum, ad umbilicum subexcisum, callo crasso adatum.

Diam. maj. 10,5, min. 8,5, alt. 7,5, apert. long. 5, lat. 4,5.

Hab. prope Constantinhafen Novae Guineae Germanicae leg. cl. J. Kubary.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Diagnosen neuer und kritischer Landdeckelschnecken. 31-45](#)