

No. 5 u. 6. Rec'd June 28/97

Mai-Juni 1897.

Nachrichtenblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von *R. Friedländer & Sohn in Berlin* zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Neue Landschnecken von Java.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Die nachstehend beschriebenen Arten stammen aus der Ausbeute des Herrn H. Fruhstorfer, welcher die Insel in den Jahren 1891—93 bereiste und namentlich auch die Hochgebirge besuchte. Eine ausführliche Bearbeitung seiner reichen Sammlungen muss ich mir für später vorbehalten; hier möchte ich nur auf die wichtigsten Resultate kurz hinweisen. Der Nachweis der Gattungen *Ditropis*, *Palaina*, *Diplommatina*, *Boysidia*, *Hypselostoma*, *Tornatellina* füllt sehr sichtbare Lücken in unsrer Kenntniss der geographischen Verbreitung aus. Sehr überraschend ist die Auffindung eines *Carychium* in 7000' Meereshöhe, von welcher

Gattung allerdings schon 2 Arten aus Indien bekannt waren. Ebenfalls von den höchsten Gipfeln stammen die beiden Arten, welche ich nicht anders unterzubringen weiss als bei *Acanthinula*, und eine *Patula*, welche sich nur bei *Pyramidula* einreihen lässt, alle drei paläarktische Typen, deren Auftreten auf Java zunächst ein schwer zu lösendes Räthsel aufgiebt.

1. *Helicarion perfragilis* Mlldff.

T. vix rimata, depressa, tenuissima, pellucida, subtiliter striatula, corneo-flavescens, subtus pallidior. Spira brevissime prominula apice plano. Anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, sutura appressa, anguste marginata disjuncti, ultimus bene convexus, tumidulus. Apertura sat obliqua, subcircularis, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari brevissime reflexo.

Diam. maj. 9, min. 6,5, alt. 5,5 mm.

2. *Helicarion fruhstorferi* Mlldff.

T. depressa, tenuis, pellucida, sublaevigata, pallide virescenti-flavida; spira brevissime conoidea. Anfr. 4 convexiusculi, rapide accrescentes, sutura marginata suberenata disjuncti, ultimus bene convexus, basi subapplanatus. Apertura diagonalis, cordiformis, peristoma rectum, obtusum, margo superus medio sat protractus.

Diam. maj. 11,5, min. 9, alt. 7,5 mm.

3. *Situla javana* Mlldff.

T. rimata, sat elate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus sat confertis cineta. Spira subregulariter conica. Anfr. $5\frac{1}{2}$ modice convexi, ultimus sat acute carinatus, basi planior, sublaevigatus, nitens. Apertura sat obliqua, late securiformis, peristoma

rectum, acutum, margine columellari superne brevissime reflexo.

Diam. 2,33. alt. 2,25 mm.

4. *Kaliella acutiuscula* Mlldff.

T. rimata, pyramidata, tenuis, pellucida, subtiliter et confertim striatula, albida. Spira valde elevata lateribus paullum convexiusculis. Anfr. 7 planulati, sutura per carinam exsertam filomarginata disjuncti, ultimus acute carinatus, basi convexior. Apertura sat obliqua, late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, acutum, ad rimam breviter reflexum.

Diam. 3, alt. 3,33 mm.

5. *Kaliella sitaliformis* Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, sat elate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, pallide lutescens. Spira valde elevata lateribus strictis apice obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura filiformi disjuncti, ultimus carina acuta bene exserta cinctus. Apertura valde obliqua, late securiformis, peristoma rectum, acutum, margine columellari subcalloso superne valde reflexo.

Diam. 2,5, alt. 2,33 mm.

6. *Kaliella platyconus* Bttg.

T. perforata, depresso trochiformis, tenuis, pellucida, tenuiter et confertim, sed distincte striatula, corneo-lutea. Spira modice elevata lateribus vix convexiusculis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus carina peracuta utrimque exserta cinctus. Apertura parum obliqua, late securiformis, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 3,66, alt. 2,5 mm.

Kaliella platyconus Bttg. Mss. — Mlldff. Nachr. Bl. D. M. G. 1896 p. 135 (nomen).

var. subangulata. Diam. 3.5, alt. 3 mm., anfr. ult. subangulatus.

7. *Kaliella angigyra* Mldff.

T. vix rimata, elate trochiformis, tenuis, pellucida, subfiliè striatula, luteo-cornea. Spira valde elevata lateribus convexiusculis, apice acutulo. Anfr. 7 vix convexiusculi, sutura filiformi disjuncti, ultimus carina filiformi crenulata cinctus. Apertura sat obliqua, late securiformis, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne callosus, sat reflexus.

Diam. 4, alt. 4.5 mm.

8. *Kaliella convexoconica* Mldff.

T. rimata, sat elate trochiformis, tenuis, pellucida, subtiliter striatula, pallide luteo-cornea. Spira sat elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 6 modice convexi, ultimus carina filiformi carinatus. Apertura parum obliqua, elliptica, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris callosus, superne latiuscule reflexus.

Diam. et alt. 3 mm.

9. *Kaliella amblia* Mldff.

T. rimata, convexo-depressa, tenuis, subtilissime striatula, opaca, corneo-brunnea. Spira modice elevata apice obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus subangulatus. Apertura parum obliqua, late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 3, alt. 2,33 mm.

10. *Kaliella densetorta* Mldff.

T. rimata, globoso-turbinata, tenuis, subpellucida, tenuissime striatula, opaca, corneo-fulva. Spira sat elevata lateribus substriatis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, lente accrescentes,

ultimus subangulatus, basi nitidulus. Apertura modice obliqua, late elliptica, sat excisa, peristoma normali.

Diam. 2,75, alt. 2,25 mm.

11. *Kaliella viridula* Mlldff.

T. pro genere sat aperte umbilicata, elate turbinata, solidula, leviter striatula, viridula. Spira valde elevata, lateribus convexiusculis, apice obtuso. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus subangulatus, basi planiusculus. Apert. parum obliqua, subcircularis, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margo collumellaris superne breviter reflexus.

Diam, 3,25, alt. 3,75 mm.

12. *Kaliella macrostoma* Mlldff.

T. rimata, globoso-conica, tenuissima, pellucida, subtiliter plicato-striatula, olivacea. Spira subregulariter conica. Anfr. 5 convexiusculi, sat celeriter accrescentes, ultimus tumidulus, ad peripheriam subangulatus. Apertura sat obliqua, ampla, subcircularis, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margine collumellari superne breviter reflexo.

Diam. 5, alt. 5 mm.

13. *Kaliella pisum* Mlldff.

T. anguste perforata, depresso-globosa, tenuis, pellucida, distanter subtiliter plicato-striata, pallide virescens. Spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 5 convexiusculi, ultimus bene convexus, hand angulatus. Apert. fere verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 4, alt. 3 mm.

14. *Lamprocystis gedeani* Mlldff.

T. anguste et fere obtecte perforata, discoidea, tenuissima, subtiliter striatula, pallide olivacea. Spira breviter

conoidea lateribus subconceavis. Anfr. 5 convexiusculi, sutura anguste marginata disjuncti, ultimus supra peripheriam subangulatus, supra angulum planiusculus, basi bene convexus. Apertura sat obliqua, late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margine collumellari superne breviter reflexo.

Diam. 6.5, alt. 3.5 mm.

15. *Lamprocystis fruhstorferi* Mlldff.

T. semiobtecte perforata, discoidea, tenuis, pellucida, striis radialibus leviter impressis sat distantibus sculpta, nitens, pallide virescenti-flava. Spira brevissime conoidea. Anfr. 5 planiusculi, ultimus supra peripheriam subangulatus, basi convexus. Apertura modice obliqua, elliptica, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margine columellari leviter calloso, superne brevissime reflexo.

Diam. 6, alt. 3 mm.

16. *Lamprocystis circumlineata* Mlldff.

T. anguste et semiobtecte perforata, subgloboso-conoidea, tenuis, pellucida, subtilissime striatula, lineis spiralibus confertis, sub lente distinctis decussata, nitidula, fulva-cornea. Spira pro genere sat elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ modice convexi, lente accrescentes, sutura appressa submarginata disjuncti, ultimus basi laevigatus, nitidus. Apertura modice obliqua, longe elliptica, valde excisa, peristoma normale.

Diam. 5, alt. 3 mm.

17. *Lamprocystis subglobosa* Mlldff.

T. perforata, subgloboso-depressa, tenuis, pellucida, sat distincte striatula, corneo-fulva. Spira breviter conoidea apice obtusulo. Anfr. $5\frac{1}{2}$ lente accrescentes, convexiusculi, ultimus lateraliter subcompressus, basi bene convexus.

Apertura fere verticalis, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne leviter sinuatus, breviter reflexus.

Diam. 3.5, alt. 2.5.

18. *Lamprocystis exigua* Mlldff.

T. rimata, depressa, tenuis, pellucida, subtiliter sed distincte striatula, pallide lutescens: spira breviter conoidea. Anfr. $4\frac{1}{2}$ modice convexi, ultimus supra peripheriam subangulatus, basi laevigatus. Apertura vix obliqua, late elliptica, valde excisa, peristoma normale.

Diam. 2.5, alt. 1.5 mm.

19. *Lamprocystis nana* Mlldff.

T. rimata, discoidea, tenuis, pellucida, superne regulariter et confertim striatula, pallide corneo-lutescens: spira brevissime prominula. Anfr. $4\frac{1}{2}$ subplani, ultimus convexior, subangulatus, subtus laevigatus. Apertura parum obliqua, subcircularis, valde excisa, peristoma normalis,

Diam. 2.25, alt. 1.2 mm.

20. *Lamprocystis radiatula* Mlldff.

T. perforata, convexo-depressa, subtilissime radiato-striatula, tenuis, pellucida, pallide flavescens. Spira breviter conoidea lateribus convexiusculis. Anfr. 5 convexiusculi, ultimus bene convexus. Apertura perlate elliptica, fere circularis, valde excisa, peristoma normale.

Diam. 7, alt. 4 mm.

21. *Lamprocystis ritzeiformis* Mlldff.

T. anguste perforata, discoidea, tenuis, pellucida, striis radialibus, subtilibus, pliciformibus, sat distantibus sculpta, hyalino-alba. Spira valde depressa, vix prominula. Anfr. $4\frac{1}{2}$ convexiusculi, sutura distincte marginata disjuncti,

ultimus bene convexus. Apertura parum obliqua, subcircularis, valde excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris brevissime reflexum.

Diam. 3,9, alt. 2 mm.

22. *Ariophanta duplocincta* Mlldff.

T. anguste et semiobtectate perforata, depressa, superne sat ruditer plicato-striata, lineis spiralibus minutis sed distinctis decussata, luteo-cornea, taeniis 2 castaneis, una angusta supra, altera latiore infra carinam ornata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexusculi, ultimus carina obtusula, sed sat exserta cinctus, basi distincte spiraliter liratus, circa perforationem castaneo-zonatus. Apertura valde obliqua, longe elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, margo columellaris subcallosus, superne breviter reflexus.

Diam. 22,5 alt. 12, apert. lat. 12,5, long. 9, alt. 7,5 mm.

23. *Ariophanta acute carinata* Mlldff.

T. sat aperte perforata, depressa, tenuis, subtiliter et subirregulariter plicato-striata, lineis spiralibus confertis decussata, superne luteo-cornea, basi brunnea, medio pallidior. Spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 6 planulati, ultimus carina sat acuta, bene exserta pallida carinatus, basi fere laevigatus. Apertura sat obliqua, sat late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari incrassatulo, superne breviter reflexo.

Diam. 29,5, alt. 15, apert. lat. 17, long. 12,5, alt. 10,5 mm.

24. *Ariophanta marginata* Mlldff.

T. anguste et semiobtectate perforata, convexo-depressa, superne confertim costulato-striata et lineis spiralibus granulosa, sericina, brunneo-cornea; spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 4 fere plani, sutura per carinam exsertam crassiuscule marginata disjuncti, ultimus carina obtusa,

sed bene exserta cinctus, basi laevigatus, nitens. Apertura modice obliqua, elliptica, parum excisa, peristoma rectum, obtusum, incrassatulum, ad perforationem breviter reflexum.

Diam. 19, alt. 10,25, apert. lat. 10,5, long. 7,5, alt. 7 mm.

25. *Ariophanta acelidota* Mlldff.

T. sat aperte perforata, depresso-conoidea, tenuiuscula, subpellucens, striis subrudibus transversis et lineis spiralibus confertis minute granulosa, corneo-lutescens, sericina. Spira sat elevata, convexo-conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ planulati, ultimus sat acute carinatus, infra carinam taenia angusta castanea ornatus, basi laevigatus, nitens, unicolor lutescens. Apertura modice obliqua, late elliptica, sat excisa, peristoma rectum, obtusum, margine columellari superne breviter reflexo.

Diam. 19, alt. 12, apert. lat. 10, long. 8,5, alt. 7,5 mm.

var. robusta. Major, solida, peristoma incrassatulum, longe porrectum.

Diam. 23, alt. 15 mm.

26. *Inozonites imitator* Mlldff.

T. sat aperte umbilicata, umbilico pervio subcylindrico $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, discoidea, tenuis, pellucida, superne subtiliter striatula, nitidula, pallide flavescens. Spira brevissime conoidea. Anfr. 5 planulati, ultimus supra medium obtuse angulatus, basi sublaevigatus, magis nitens. Apertura valde obliqua, elliptica, sat excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne brevissime reflexus.

Diam. 6,5, alt. 3 mm,

27. *Patula (Pyramidula) javana* Mlldff.

T. pro genere modice umbilicata, depresso conoidea, costulis tenuibus sat distantibus obliquis sculpta, olivaccolutea. Spira convexo-conoidea. Anfr. 4 convexi. Aper-

tura valde obliqua, subcircularis, modice excisa, peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne paululum dilatatus.

Diam. 2,25, alt. 1,25 mm.

28. *Acanthinula perpusilla* Mlldff.

T. modice sed pervie umbilicata, globoso-turbinata, tenuis, subpellucida, minutissime striatula, fere laevis, corneo-fulva. Spira valde elevata, lateribus sat convexis. Anfr. $4\frac{1}{2}$ modice convexi, ad suturam subangulati, ultimus antice brevissime descendens. Apert. modice obliqua, late oviformis, peristoma leviter expansum, margo columellaris profundiuscule sinuatus, dilatatus.

Diam. et alt. 1,5 mm.

29. *Acanthinula tiluana* Mlldff.

T. anguste umbilicata, elate turbinata, minute striatula, corneo-lutescens. Spira valde elevata lateribus convexiusculis. Anfr. 5 modice convexi, medio subapplanati, ultimus haud descendens. Apertura sat obliqua, oviformis, peristoma brevissime expansum, margo columellaris leviter sinuatus, subincrassatus, superne paululum dilatatus.

Diam. 1,33, alt. 1,5 mm.

30. *Plectotropis leucomphala* Mlldff.

T. late umbilicata, umbilico $\frac{1}{3}$ diametri adaequante, convexo-depressa, solidula, subirregulariter plicato-striatula, lineis spiralibus tenuissimis confertim decussata, luteo-cornea. Spira breviter convexo-conoidea. Anfr. 6 lente accrescentes, ultimus acute carinatus, antice brevissime descendens, circa umbilicum albescens. Apertura diagonalis, secunformis, peristoma sublabiatum, superne vix, extus et basi magis expansum, ad umbilicum superne dilatatum, reflexiusculum.

Diam. 18,5 alt. 9,5 mm.

forma subfasciata. Anfractus ad suturam pallescentes.
forma castanea. T. obscurior, brunnescens aut
castanea.

31. *Plectotropis epiplatia* Mlldff.

T. latissime umbilicata, umbilico $\frac{1}{2}$ diametri adaequante, discina, tenuiuscula, dense et subirregulariter plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, corneo-lutea. Spira brevissime conoidea aut vix prominula. Anfr. $6\frac{1}{2}$ lentissime accrescentes, plani, ultimus acute carinatus, circa umbilicum subacute angulatus. Apertura diagonalis, securiformis, peristoma superne rectum, extus et basi breviter expansum, ad umbilicum subdilatum.

Diam. 17, alt. 6 mm.

„ 18, „ 5.5 „

32. *Plectotropis trichotrochium* Mlldff.

T. late umbilicata, umbilico infundibuliformi fere $\frac{1}{3}$ diametri adaequante, discina, tenuis, subpellucens, striatula, lineis spiralibus confertis decussata, costulis membranaceis deciduis, squamulatim interruptis induta, luteo-cornea. Spira planulata, vix prominula. Anfr. 5 fere plani, ultimus carina obtusula, subexserta, fimbrias deciduas gerente cinctus. Apertura fere diagonalis, late securiformis, peristoma superne rectum, extus et basi breviter expansum, ad umbilicum subdilatum.

Diam. 11,66, alt. 5 mm.

33. *Plectotropis ciliocincta* Mlldff.

T. sat late umbilicata, umbilico $\frac{1}{3}$ diametri subaequante, depressa, tenuiuscula, subpellucens, striis transversis subtilibus, lineis spiralibus valde confertis et costulis membranaceis interruptis sculpta, albida, taenia rufula angusta ad peripheriam ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. 6 con-

vexiusculi sutura rufomarginata disjuncti, ultimus subacute carinatus, ad carinam ciliocinctus. Apert. valde obliqua, late securiformis, peristoma superne rectum, extus et basi breviter expansum, ad umbilicum reflexiusculum.

Diam. 13,5, alt. 6,5 mm.

34. *Plectotropis schepmani* Mlldff.

T. pro genere anguste umbilicata, umbilico subcylindrico $\frac{1}{4}$ diametri adaequante, depresso trochiformis, tenuis, subpellucida, striis transversis pliciformibus, subirregularibus et lineis spiralibus microscopicis sculpta, brunneo-cornea. Spira pro genere sat elevata lateribus substrictis. Anfr. $5\frac{1}{2}$ modice convexi, ultimus carina obtusula bene exserta cinctus. Apert. valde obliqua, subrhomboidea, peristoma superne parum expansum, medio subprotractum, basi paullo magis expansum, ad umbilicum superne paulum dilatatum.

Diam. 11, alt. 6 mm.

35. *Chloritis tetragyra* Mlldff.

T. sat anguste umbilicata, subgloboso-depressa, solidula, subtiliter striatula, punctis impressis sat distantibus seriatim sculpta, brunnea. Spira breviter prominula, superne plana. Anfr. $4-4\frac{1}{2}$ sat convexi, ad suturam profunde impressam obtuse angulati, ultimus pone aperturam paulum constrictus, brevissime deflexus, circa umbilicum obtuse angulatus. Apertura parum obliqua, late lunaris, peristoma breviter expansum, sublabiatum, ad umbilicum leviter sinuatum.

Diam. 13,5 alt. 8,5, apert. lat. 7, long 6,5, alt. 6 mm.

36. *Chloritis fruhstorferi* Mlldff.

T. modice, subcylindrice et pervie umbilicata, depressa, solidula, subtiliter plicato-striatula, punctis valde confertis seriatim sculpta, pruinosa, corneo-fulva ad suturam late albido-zonata. Spira brevissime prominula, superne plana.

Anfr. 5 convexi, ad suturam bene impressam subapplanati, ultimus circa umbilicum subangulatus. Apert. modice obliqua, cordiformis, peristoma latiuscule expansum, ad umbilicum sat sinuatum.

Diam. 19, alt. 14, apert. lat. 10, long. 9,5, alt. 8,5 mm.

37. *Buliminus (Ena) tenuiliratus* Mldff.

T. semiobtecte perforata, oblongo-conica, solidula, tenuiter striatula, lineis spiralibus tenuibus et confertis, sub lente perdistinctis cincta, corneo-brunnea. Spira valde elongata, lateribus paullum convexiusculis. Anfr. 8 convexiusculi, ultimus magnus, $\frac{2}{5}$ altitudinis superans. Apert. modice obliqua, elongate ovalis, parum excisa, peristoma sat late expansum, tenue, ad perforationem sat dilatatum.

Diam. 10, alt. 22,5, apert. lat. 7, long. 10, alt. 9,5 mm.

38. *Buliminus (Ena) tenggericus* Mldff.

T. profunde rimata, conico-oblonga, tenuiuscula, subpellucida, plicato-striatula, minute et oblique rugulosa, sericina, luteo-cornea. Spira elongata lateribus convexiusculis. Anfr. 8 planiusculi, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis vix adaequans. Apertura modice obliqua, ovalis, parum excisa, peristoma tenue, latiuscule expansum, marginibus commiventibus.

Diam. 8, alt. 21, apert. lat. 5,5, long. 7,5, alt. 7 mm.

39. *Buliminus (Ena) prillwitzii* Mldff.

T. profunde rimata, ventricosulo-oblonga, solidula, subruditer et irregulariter striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, luteo-cornea, strigis brunneis variegata. Spira valde elongata lateribus convexiusculis. Anfr. 8 vix convexiusculi, sutura albofilosa disjuncti, ultimus $\frac{1}{3}$ altitudinis vix attingens. Apert. modice obliqua, ovalis, modice

excisa. peristoma tenue, sat expansum. columella superne valde dilatata.

Diam. 9. alt. 23. apert. lat. 6,5, long. 8,5. alt. 8 mm.

40. *Buliminus (Ena) thraustus* Mlldff.

T. anguste et semioblecte perforata, conico-oblonga, tenuis, subpellucida, subtiliter et irregulariter plicato-striatula, tenuiter sed distincte spiraliter lirata, pallide straminea. Spira sat elongata lateribus substrictis. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, ultimus $\frac{3}{7}$ altitudinis adaequans. Apertura parum obliqua, ovalis, peristoma tenue, parum expansum, ad perforationem paullulum dilatatum.

Diam. 6, alt. 13, apert lat. 4, long. 5,8. alt. 5,5 mm.

41. *Boysidia boettgeri* Mlldff.

T. anguste perforata, irregulariter conica, solidula, subpellucida, subtiliter striatula, opaca, quasi pruinosa, brunnea. Spira pyramidata, lateribus strictis, apice obtuso. Anfr. 6 convexi, ultimus antice valde ascendens. Apert. paullum retrorsum inclinata, oblique subcordiformis, peristoma continuum, superne appressum, sat expansum, brunneo-labiatum, margo externus sinuosus, superne callo dentiformi munitus. Lamellae parietales 3, dextra humilis marginem attingens, media brevior, valde elevata, tertia brevis, dentiformis, columellaris valida, horizontalis, palatales 4, quarum mediae 2 fortiores columellari et mediae parietali in formam crucis oppositae.

Diam. 2,33, alt. 3 mm.

42. *Hypselostoma fruhstorferi* Mlldff.

T. anguste umbilicata, irregulariter trochiformis, solidula, subpellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus tenuissimis, valde confertis sed distinctis decussata, opaca, brunnea, Spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi,

sutura profunda disjuncti, ultimus medio obtuse angulatus, tum applanatus, circa umbilicum denuo angulatus, antice sat ascendens, breviter solutus, pone aperturam coarctatus, tum campanulatus. Apertura retrorsum inclinata, rotundato-pentagona, peristoma continuum, breviter patens. Lamellae parietales 2, angularis marginem fere attingens, altera recedens, valida elevata, columellaris profunda, palatales 6, quarum 2 majores, longe productae, columellari et parietali in formam crucis oppositae.

Diam. 2,5, alt. 2,25 mm.

43. *Clausilia (Acrophaedusa) schepmani* Mlldff.

T. rimata, fusiformis, tenuis, pellucens, subtiliter dense striata, luteo-cornea aut brunnescens. Anfr. 11 convexiusculi, sutura sat impressa disjuncti. Apert. verticalis, piriformis, peristoma parum expansum, vix labiatum. Lamella supera humilis, sat obliqua, cum spirali continua, infera recedens, ab illa remota, parum conspicua, subcolumellaris immersa. Plica principalis sat longa, lineam lateralem superans, palatales 3 breves, media brevior. Clausilium sat angustum.

Diam. 3,5, alt. 16,5 mm.

44. *Clausilia (Acrophaedusa) nubigena* Mlldff.

T. profunde rimata, ventrosulo fusiformis, solida, dense costulato-striata, brunnea. Spira ventrosula, sursum paulum concava. Anfr. $9\frac{1}{2}$ fere plani, ultimus basi rotundatus. Apertura fere verticalis, rotundato-piriformis, peristoma modice expansum, incrassatulum. Sinulus sat protractus, latinsculus. Lamella supera marginalis valde obliqua, cum spirali continua, infera humilis, sat recedens, subcolumellaris immersa. Plica principalis modica, palatales 3 breves. Clausilium sat angustum, basi compressum.

Diam. 4,33, alt. 17,5 mm.

45. *Clausilia (Acrophaedusa) fruhstorferi* Mlldff.

T. rimata, gracillime claviformis, solidula, dense striata, corneo-brunnea. Spira valde elongata, subtus ventrosula, tum paulum concava, sursum cylindrica. Anfr. $17\frac{1}{2}$ fere plani, ultimus basi rotundatus. Apert. fere verticalis, piri-formis, peristoma breviter expansum, sublabiatum. Lamella supera marginalis, sat valida, obliqua, infera valde recedens, antice vix conspicua, subcollumellaris immersa. Plica principalis modica, palatales 3 breves.

Diam. 3,5, alt. 22 mm.

46. *Prosopeas holosericum* Mlldff.

T. non rimata, turrito-conica, tenuis, subpellucida, confortim plicato-striatula, lineis spiralibus microscopicis decussata, brevissime pilosa, sericina, pallide straminea. Spira turrita apice obtusulo. Anfr. 9, primi 3 convexi, costulati, reliqui convexiusculi, sutura profundiuscule impressa disjuncti. Apertura modice obliqua, guttiformis, peristoma rectum acutum, margine columellari calloso, superne appresso.

Diam. 5, alt. 19, apert. lat. 2,5, long. 6, alt. 5,5 mm.

47. *Prosopeas hastatum* Mlldff.

T. vix rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, subtiliter arcuatim striata, brevissime pilosa, pallide straminea. Spira turrita lateribus strictis, apice obtusulo. Anfr. $11\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, sutura parum impressa suberenulata disjuncti. Apertura modice obliqua, elongate ovalis, peristoma rectum acutum, margine columellari calloso-incrassato, superne appresso.

Diam. 7, alt. 33,5, apert. lat. 4, long. 9, alt. 8,5 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Eingegangene Zahlungen:

Weinland, H., Mk. 12.—: v. Gallenstein, G., Mk. 6.—: Ehrmann, L., Mk. 6.—: Schedel, Y., Mk. 6.—.

Bedigert von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Dieslerweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 15. Juni.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von, Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Neue Landschnecken von Java 57-72](#)