

Nachrichtenblatt

der deutschen

Malakozoologischen Gesellschaft.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

Abonnementspreis: Mk. 6.— für den Jahrgang frei durch die Post im In- und Ausland. — Erscheint in der Regel monatlich.

Briefe wissenschaftlichen Inhalts, wie Manuskripte, Notizen u. s. w. gehen an die Redaktion: Herrn **Dr. W. Kobelt** in Schwanheim bei Frankfurt a. M.

Bestellungen (auch auf die früheren Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher vom Jahrgange 1881 ab), **Zahlungen** und dergleichen an die Verlagsbuchhandlung des Herrn **Moritz Diesterweg** in Frankfurt a. M. (Ältere Jahrgänge des Nachrichtenblattes und der Jahrbücher bis 1880 inclusive sind durch die Buchhandlung von *R. Friedländer & Sohn in Berlin* zu beziehen).

Andere die Gesellschaft angehende **Mittheilungen**, Reklamationen, Beitrittserklärungen u. s. w. gehen an den Präsidenten: Herrn **D. F. Heynemann** in Frankfurt a. M. — Sachsenhausen.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Neue Landschnecken von Java.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

(Fortsetzung u. Schluss.)

48. *Opeas curvica* Möll.

T. rimata, graciliter turrita, tenuis, pellucida, costulis arcuatis sculpta, sericina, pallide straminea. Spira turrita lateribus convexiusculis. Anfr. 7 sat convexi, sutura profunde impressa marginata, subcrenulata disjuncti. Apert. fere verticalis, rotundato-rhomboidea, peristoma rectum, acutum, margine columellari superne dilatato, appresso.

Diam. 2.5, alt. 7 mm.

49. *Tornatellina sundana* Mlldff.

T. imperforata, ovato-conica, tenuis, subpellucida, levissime striatula, opaca, luteo-cornea. Spira pro genere modice elevata, convexo-conoidea. Anfr. 4 convexiusculi, sat celeriter accrescentes, ultimus bene convexus. Apertura parum obliqua, ovalis, sat excisa, peristoma rectum, acutum, columella superne lamellatim dilatata, medio truncata. Lamella parietalis modica, longe intus producta.

Diam. 2, alt. 3 mm.

50. *Carychium javanum* Mlldff.

T. rimata, subcylindrico-oblonga, tenuis, pellucida, hyalino-alba, subtiliter striatula. Spira subcylindrica, superne conoidea apice obtusulo. Anfr. 6 modice convexi. Apertura valde obliqua, ovalis, modice excisa, peristoma sat expansum, continuum, superne late appressum; margo externus subsinuosus, subcallosus. Lamella columellaris valida, subhorizontalis.

Diam. vix 1, alt. 2.2 mm.

51. *Leptopoma altum* Mlldff.

T. perforata, sat elate turbinata, solidula, subpellucida, subtiliter striatula, lineis spiralibus microscopicis et liris elevatis 5 cincta, pallide lutescens, rarius castaneo-bitaeniata. Spira valde elevata lateribus strictis. Anfr. 6 convexi, ultimus infra peripheriam subangulatus, lira fortiore munitus, infra liram taenia luteo-cornea, tum zona albida, circa perforationem zona luteo-cornea pictus. Apert. sat obliqua, subcircularis, peristoma modice expansum, margo columellaris leviter sinuatus, attenuatus, cum basali angulum parum distinctum formans.

Diam. 11, alt. 12 mm.

52. *Lagochilus convexum* Mlldff.

T. anguste umbilicata, elate turbinata, solidula, subpellucida, corneo-fulva, ad suturam maculis castaneis subtus

evanescentibus picta. Spira valde elevata, gradata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, sutura profunde impressa disjuncti, striatuli, liris elevatis numerosis, quarum 5 fortiores, sculpti, ultimus antice sat descendens. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma subduplex, parum expansum, superne leviter excisum, protractum.

Diam. 7, alt. 7,25 mm.

var. *palabuana* Mlldff. minor, diam. 4,5, alt. 4,6, strigis usque ad basin distinctis, liris minus, carinulis 2 magis distinctis.

53. *Lagochilus humile* Mlldff.

T. late umbilicata, valde depresso turbinata, solidula, fulva, strigis castaneis fulguratis, picta. Spira parum elevata lateribus concavis. Anfr. 5 modice convexi, striatuli, spiraliter lirati, carinulis 4 elevatis cincti, ultimus compressus, ad peripheriam subacute carinatus, in carina ciliatus, basi usque in umbilicum confertim liratus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma parum expansum, incrassatum, superne leviter excisum.

Diam. 7, alt. 4,5 mm.

54. *Lagochilus macromphalum* Mlldff.

T. pro genere late et aperte umbilicata, depresso turbinata, sat tenuis, pellucens, transverse leviter striatula, liris spiralibus numerosis, quarum 3 fortiores, et costulis membranaceis sculpta, setis brevibus in peripheria longioribus hirsuta, luteo-fulva, ad suturam regulariter castaneo maculata. Spira subregulariter conica lateribus paullulum concavis. Anfr. 6 convexi, sutura subcanaliculata disjuncti ultimus subcompressus, ad peripheriam lira fortiore cinctus, antice paullum descendens. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma parum expansum, subduplicatum, superne breviter sed distincte excisum.

Diam. 10, alt. 7,6 mm.

55. *Ditropis fruhstorferi* Mlldff.

T. sat late, subcylindrice et pervie umbilicata, truncato-turbinata, sat tenuis, vix striatula, nitens, corneo-flavescens. Anfr. 4, initiales $1\frac{1}{2}$ apicem solum formantes, tum regulariter convoluti, sutura canaliculata, utrimque carina comitata disjuncti, ultimus carinis 3 cinctus, una suturali modica, altera peripherica acutissima, maxime elevata, tertia umbilicari acuta, valde elevata. Apertura valde obliqua, trapezoidea, peristoma vix expansum, valde incrassatum, longiuscule porrectum, carinulis usque ad marginem protractis tricuspidatum.

Diam. 2, 5, alt. 2 mm.

56. *Pupina compacta* Mlldff.

T. ventrosulo-ovato-conica, solidula, laevis, valde nitens, luteo-cornea; spira convexo-conica apice submucronato. Anfr. $5\frac{1}{2}$ vix convexiusculi, ultimus magnus, inflatus. Apertura verticalis, subcircularis, peristoma vix expansum, incrassatum, flavum, margo superus superne leviter recedens, in anfractum penultimum protractus, columella valde dilatata, valida. Lamella parietalis modica, obliqua. Canalis inferus subhorizontalis, in foramen ovale subtus apertum desinens.

Diam. 6,25, alt. 8,5.

57. *Pupina verbeeki* Mlldff.

T. ventricose ovato-conica, solidula, laevis, nitens, corneo-lutea. Anfr. 5 convexiusculi, sutura parum distincta, submarginata disjuncti, ultimus tumidulus. Apertura fere verticalis, circularis, peristoma vix expansum, incrassatum. Lamella parietalis valida, margini valde approximata, emersa, usque in anfractum penultimum protracta, canalis inferus ascendens, lateraliter apertus, columella valde dilatata.

Diam. 4, alt. 5 mm.

58. *Alycaeus (Orthalycaeus) crenilabris* Mlldff.

T. mediocriter umbilicata, globoso-conica, solidula, costulis tenuibus acutis sat distantibus sculpta, fulva: spira sat elevata, gradata. Anfr. 5 tumidi, ultimus inflatus, basi gibbus, tum sat late constrictus, ad aperturam campanulatus. Tubulus suturalis brevis. Apertura valde obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum sat expansum, superne et inferne dilatatum, internum breviter porrectum, superne leviter excisum, margine dextro crenulato.

Diam. 3,25, alt. 3 mm.

59. *Alycaeus (Orthalycaeus) reticulatus* Mlldff.

T. anguste umbilicata, turbinata, tenuis, pellucens, costulis tenuibus, sat distantibus et lineis spiralibus distinctis sculpta, albida. Spira pyramidata, gradata apice glabro obtuso. Anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimus a medio inflatus, in parte inflata arctius costulatus, tum latiuscule constrictus, laevigatus, ad aperturam campanulatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma duplex, externum latiuscule expansum, incrassatum, internum sat porrectum, breviter expansum, superne sat excisum.

Diam. 2,5, alt. 2,5 mm.

60. *Alycaeus (Chamalycaeus) fruhstorferi* Mlldff.

T. sat late umbilicata, conoideo-depressa, costulata, lineis spiralibus sat confertis decussata, pallide lutescens. Spira modice elevata apice mucronato. Anfr. $4\frac{1}{2}$ perconvexi, ultimus a medio tumidus, magis confertim costulatus, basi valde gibbus, tum modice constrictus, antice denuo tumidulus, breviter deflexus. Apertura diagonalis, subcircularis, peristoma duplex, externum late patens, ad insertionem recedens, ad umbilicum subito attenuatum, internum sat porrectum, superne profundiuscule excisum, ad umbili-

cum leviter sinuatum.

Diam. 5,5, alt. 4,25 mm.

61. *Palaina gedecana* Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, dense costulata, alba. Anfr. 6 convexi, ultimus vix distortus, breviter ascendens. Apertura fere verticalis, circularis peristoma parum expansum, incrassatulum.

Diam. 1,5, alt. 2,5 mm.

62. *Palaina nubigena* Mlldff.

T. sinistrorsa, profunde rimata, ovato-conica, tenuiuscula, pellucida, dense costulato-striata, albida. Anfr. 6 perconvexi, ultimus vix distortus, paulisper ascendens, in prima tertia parte leviter constrictus. Apertura parum boliqua, subcircularis, peristoma continuum, superne appressum, leviter expansum.

Diam. 1,66, alt. 2,75 mm.

63. *Diplommatina calcarata* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, oblongo-conica, tenuis, pellucida, costulis valde distantibus tenuibus sculpta, fulvo-cornea. Anfr. 6 convexi, ultimi distorti, ultimus initio valde constrictus, decrescens, antice valde ascendens, initium fere obtegens. Apertura parum obliqua, subauriformis, peristoma distincte duplex, externum late expansum, superne in processum liberum extus subcompressum productum, ad collumellam angulum distinctum subcalcaratum formans, internum sat expansum, superne et inferne prolongatum. Lamella columellaris modica.

Diam. 1,25, alt. 2 mm.

64. *Diplommatina (Pseudopalaina) sulcicollis* Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, conico-ovata, tenuis, pellucida.

fulvo-cornea. Anfr. 6 modice convexi, primi 3 sat distanter costulati, reliqui subtiliter et confertim costulato-striati, ultimus initio valde constrictus, paullum distortus, sat ascendens, medio leviter impressus, basi crista crassula cinctus. Apertura modice obliqua, sat ampla, rotundato-trapezoidalis, peristoma modice expansum, superne late appressum, margo basalis cum columellari angulum distinctum subcalcaratum formans. Lamella columellaris humilis, crassiuscula.

Diam. 1,5 alt. 2,5 mm.

65. *Diplommatina (Sinica) cyclostoma* Mlldff.

T. dextrorsa, rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, densissime costulato-striata, albida aut pallide fulva. Anfr. 6 valde convexi, ultimus paullum distortus, modice constrictus, paulisper ascendens. Apertura parum obliqua, subcircularis, peristoma sat expansum, incrassatulum. Lamella columellaris debilis, antice vix conspicua, palatalis longiuscula, crassula.

Diam. 1,6. alt. 3,2 mm.

forma minor: diam. 1,4, alt. 2,5 mm.

66. *Diplommatina (Sinica) auriculata* Mlldff.

T. dextrorsa, non rimata, conico-turrita, tenuiuscula, pellucens, regulariter sat confertim costulata, fulva. Anfr. 9 bene convexi, superi spiram fere regulariter conicam efficientes, ultimus initio modice constrictus, decrescens, paullum ascendens. Apertura modice obliqua, subauriformis, peristoma duplex, externum late expansum, superne ad insertionem breviter auriculatum, ad columellam angulatum, subcalcaratum, tum subito attenuatum, internum valde incrassatum, subexpansum, ad columellam appressum, profundiuscule sinuatum. Lamella columellaris sat valida, subhorizontalis, palatalis mediocris.

Diam. 2, alt. 4 mm.

var. abbreviata Mldff. Arcinus costulata, paullo minor, ventricosior. Diam. 2, alt. 3,6 mm.

var. biangulata Mldff. minor, diam. 1,75, alt. 3, lamella palatalis paullo longior, peristoma ad insertionem et basi angulatum.

var. gracilior Mldff. minor, paullo distantius costulata. Diam. 1,6, alt. 3,66 mm.

67. *Diplommantina (Sinica) tetragonostoma* Mldff.

T. dextrorsa, rimata, oblongo-conica, tenuis, pellucida, costulata, luteo-cornea. Anfr. 7 convexiusculi, ultimi 2 valde distorti, ultimus initio valde constrictus, sat ascendens. Apertura sat obliqua, rotundato-tetragona, peristoma duplex, internum breviter expansum, incrassatulum, superne late appressum, externum latius expansum, superne et inferne breviter alatum,

Diam 1,5, alt. 2,5 mm.

68. *Diplommantina (Sinica) perpusilla* Mldff.

T. dextrorsa, vix rimata, ovato-acuminata, tenuis, pellucida, dense costulato-striata, albida. Anfr. 6 sat convexi, superi spiram conoideam lateribus convexiusculis efficientes, ultimus paululum distortus, breviter ascendens. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma parum expansum, vix incrassatulum. Lamella columellaris mediocris, palatalis perlonga.

Diam. vix 1, alt. 1,75 mm.

69. *Diplommantina (Sinica) planicollis* Mldff.

T. sinistrorsa, vix rimata, conico-turrita, solidula, subpellucida, fulva. Anfr. 8 modice convexi, superi spiram subregulariter conicam apice obtusulo efficientes, dense costulati, ultimi 2 sublaevigati, ultimus parum distortus, breviter ascendens, a strictura medio applanatus, basi

crista crassula cinctus. Apertura sat obliqua, ovalis, peristoma modice expansum, incrassatulum, margo columellaris attenuatus, rectus, cum basali angulum subdistinctum formans. Lamella columellaris humilis, palatalis brevis.

Diam. 2,25, alt. 4,6 mm.

70. *Diplommatina (Sinica) javana* Mlldff.

T. sinistrorsa, rimata, ovato-acuminata, solidula, fulvo-cornea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ convexi, superi sat distanter costulati, costulis paullatim approximatis, ultimi 2 costulato-striati, ultimus initio valde constrictus, tum tumidulus, subgibber, sat ascendens. Apertura modice obliqua, subcircularis, peristoma duplex, modice expansum, incrassatulum. Lamella columellaris validiuscula, palatalis punctiformis.

Diam. 1,5—1,6 alt. 2,5—2,75 mm.

71. *Georissa javana* Mlldff.

T. sat elate turbinata, solidula, valde confertim spiraliter lirata, fulva. Spira sat elevata lateribus strictis. Anfr. 4 valde convexi. Apertura sat obliqua, truncato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, columella valde dilatata, late appressa.

Diam. 1, alt. 1,5 mm.

var. *intermedia* Mlldff. Paulo major, diam. 1,25 alt. 1,75, sculptura minus distincta, color pallidior, flavescens.

72. *Georissa laeviuscula* Mlldff.

T. elate turbinata, solidula, transverse subtilissime striatula, sculptura spiralis evanescens, sub lente fortiore vix conspicua, luteo-cornea. Spira valde elevata lateribus convexusculis. Anfr. 4 perconvexi. Apertura et peristoma praecedentis.

Diam. 1,4, alt. 1,8 mm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Neue Landschnecken von Java 89-97](#)