

L. dido Godw. Aust. Proc. Zool. Soc. 1889 p. 338 pl. 39 fig. 5., ist der Smiths'schen Art sehr nahe und unterscheidet sich von ihr nur durch das etwas höhere Gewinde und damit zusammenhängend den engeren Nabel; auch Godwin's Art scheint nur einen Kiel im Nabel zu haben.

Literaturbericht.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1896 Part. II. III.

- p. 339. Pilsbry, Henry A. and E. G. Vanatta, Revision of North American Slugs: *Ariolimax* and *Aphallarion*. (*Aph. bultoni* n. gen. et spec., Oakland, Californien).
- p. 395. Dall, W. H., Insular Landshell Faunas, especially as illustrated by the Data obtained by Dr. G. Baur in the Galapagos Islands. (Wth. pl. 15—17) — Schon früher besprochen.
- p. 470. Harris, Gilbert T., new and interesting Eocene Mollusca from the Gulf States (with pl. 18—23).
- p. 487. Pilsbry, Henry A., and Samuel N. Rhoads, Contributions to the Zoology of Tennessee. No. 4 Mollusks. (*Neu Anculosa harpethensis*. Zusammen 169 sp., davon 65 Najadeen.)
- p. 561. Pilsbry Henry A., new species of Freshwater Mollusks from South America. (*Chilina rushi* p. 561 t. 26 fig. 6—7; Uruguay; — *Planorbis castaneonitens* p. 561 t. 27 fig. 10—12; Uruguay; — *Pl. heteropleurus* p. 562 t. 26 fig. 1—3, Titicaca; — *Corbicula colomensis* p. 562 t. 26 fig. 9, Laklata in Uruguay; — *Glabaris latomarginatus* var. *felix* p. 563 t. 26 fig. 8, Uruguay; — *Gl. trapezialis* var. *cygneiformis* p. 563 t. 26 fig. 4—5 Maldonao, Uruguay; — *Gl. simpsonianus* p. 564 t. 27 fig. 13, La Plata).

Clessin, S., über den Einfluss der Umgebung auf die Gehäuse der Mollusken. In Jahresh. Ver. Württemberg 1897 p. 68—86.

Eine interessante, aber eines Auszuges nicht fähige Arbeit, die wir unseren Mitgliedern zum Studium empfehlen. Es werden Beobachtungen an 35 Molluskenarten mitgeteilt, welche alle beweisen, dass die Varietätenbildung durch die Verhältnisse der Umgebung bedingt wird.

Martens, Ed. von, Süß- und Brackwasser-Mollusken des Indischen Archipels. In Max Weber, Zoolog. Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ostindien, Band IV. — Leiden 1897. Gr. 8° 330 S. mit 12 Tafeln.

Der Verfasser hat der Arbeit über die von Prof. Weber gesammelten Landmollusken sehr rasch eine zweite umfangreichere über die Mollusken des Süßwassers und des Brackwassers im indischen Archipel folgen lassen, die wir mit besonderer Freude begrüßen, weil sie einen ziemlich vernachlässigten Theil der Molluskenfauna an der Hand reichen Materials und des grossen Vergleichsmaterials des Berliner Museums in gründlichster Weise behandelt. Dass er sich nicht bloß auf die Bearbeitung von Weber's Ausbeute beschränkt und die Grenzen der Brackwasserfauna weiter ausdehnt, als gewöhnlich, erhöht die Bedeutung des Werkes, das für das Studium der Fauna des indischen Archipels in Zukunft unentbehrlich sein wird. — Als neu werden beschrieben und abgebildet: *Limnaea brevispira* p. 2 t. 1 fig. 1, 2, t. 12 fig. 1, 3. See von Manindjau; — *L. javana* var. *costulata*, p. 3 t. 1 fig. 3—7. Tjipanas auf Java; — *Jsidora sumatrana* p. 8 t. 1 fig. 26—29, Sumatra; — *Is. ovalina* p. 8 t. 1. fig. 20 31, t. 12 fig. 5, Loka auf Celebes; — *Js. minahassae* p. 8 t. 9 fig. 1, See von Tondano; — *Js. timorensis* p. 9 t. 9 fig. 3—4, Delhi auf Timor. — *Js. stagnalis* p. 11 t. 1. fig. 32—34, See von Manindjau Sumatra; — *Planorbis sumatranus* p. 12 t. 1 fig. 8—10 t. 12 fig. 6—9, Sumatra; — *Pl. proclivis* p. 12 t. 1 fig. 11—16, Sumatra; — *Ancylus javanus* p. 15 t. 1 fig. 35—37, Buitenzorg, Java; — *Anc. celebensis* p. 16 t. 1 fig. 38—39, t. 12 fig. 8, Bonthain, Celebes; — *Vivipara javanica* var. *moussoni* p. 22, Java; var. *macassarica* p. 23, Makassar, var. *saleyerica* p. 24 t. 2 f. 3, Saleyer; — *Viv. grossicostata* p. 25 t. 2 fig. 7—8, Singkarah auf Sumatra; — *Pachydrobia lacustris* p. 26 t. 9 fig. 12—15, mit var. *subglobosa* Sumatra; — *Melania curvicosta* p. 36 t. 2 fig. 14, t. 4 fig. 27, Manindjau, Sumatra; — *Mel. papillosa* p. 38 t. 2 fig. 21, Singkarah, ibid; — *Mel. stricticosta* p. 39 t. 2 fig. 22—26, ibid.; — *Mel. bisinuata* p. 43 t. 3 fig. 7, Sumatra; *Mel. uniformis* var. *crispulata* p. 47 t. 3 fig. 3, Flores, Timor, Rotti; var. *aequisulcata* p. 48 t. 3 fig. 4—5 Flores; var. *plicatula* t. 3 fig. 6. Saleyer; — *Mel. robusta* p. 52 t. 3 fig. 18—20 Celebes. — *Mel. buginensis* p. 53 t. 3 fig. 21, ibid; — *Mel. vincta* p. 54 t. 3 fig. 23—25, ibid; -- *Mel. wichmanni* p. 54 t. 3 fig. 26—27,

Timor; — *Mel. adonarae* p. 59 t. 4 fig. 5, Adonara bei Flores; — *Mel. pulchella* p. 61 t. 4 fig. 21—22, Sumatra; — *Mel. dissimulans* p. 73 t. 4 fig. 32, N. O. Sumatra; — *Mel. pinguicula* p. 74 t. 4 fig. 17—20, Sumatra; — *Neritina iris* var. *wichmanni* p. 78 t. 10 fig. 10, Timor; — *Ner. confluens* p. 81 t. 10 fig. 9, Flores, Adonara; — *Modiola leucosticta* p. 86 t. 10 fig. 18—21, Celebes; — *Unio verbecki* (Bttg. mss.) p. 89 t. 5 fig. 1—2, 4—5; — *Cyrena moussoni* p. 94, Java; — *C. moluccensis* p. 96 t. 7 fig. 4 = *cyprinoides* Cless. nec Quoy, Batjan, Ternate, Ceram; — *Batissa violacea* var. *macassarica* p. 105 t. 5 fig. 8, Makassar; var. *discoidea* p. 106 t. 5 fig. 9, var. *extensa* t. 5 fig. 7, Maros, Celebes; — *Corbicula subplanata* p. 112 t. 7 fig. 7—10, Celebes; — *C. celebensis* p. 113 t. 7 fig. 11—13, *ibid.*; — *C. trapezoidea* p. 115 t. 7 fig. 14—19, Sumatra; — *C. angulifera* p. 116 t. 7 fig. 28—31, *ibid.*; — *C. lacustris* p. 118 t. 7 fig. 20—24, *ibid.*; — *C. gibba* p. 121 t. 7 fig. 25—27, *ibid.* — *Pisidium sumatranum* p. 121 t. 9 fig. 16—18, *ibid.* Von Brackwasser und Strandarten werden als neu beschrieben *Pythia scarabaeus*, var. *tripartita* p. 136: Timor; — *Cassidula triparietalis* p. 145 t. 8 fig. 16, Mollukken, Bali, — *Littorina ventricosa* var. *strubelli* p. 208, Krakatau; — *L. biangulata* p. 209 t. 9 fig. 26, Benkulen; — *Stenothyra moussoni* p. 210 t. 9 fig. 7 = *Paludina ventricosa* Mousson nec Quoy, Java; — *Assiminea variegata* p. 214 t. 9 fig. 19, Celebes; — *Psammotellina pallens* p. 235, Bintang bei Singapur; — *Ps. semmelinki* p. 236 t. 10 fig. 23—24, mit var. *strubelli* Java; — *Psammbia denikei* p. 243 t. 10 fig. 25, Makassar; — *Ps. reevei* p. 247 = *pulchella* Reeve sp. 23, nec Lam., Flores. — Im Anhang werden eine Reihe hochinteressanter Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Süßwasserconchylien gemacht: daran schliesst sich eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der Arten in Niederländisch Indien und eine Tabelle über die Verbreitung der Gattungen und Untergattungen im Indischen Archipel überhaupt.

Simroth, Dr. H., Vorläufige Mittheilung. Eine Bearbeitung der russischen Nacktschneckenfauna betreffend. — Aus *Annuaire Mus. Zoologique Acad. imper. St. Petersburg* 1896 p. 355—368.

Der Autor gibt eine vorläufige Uebersicht über die geographische Verbreitung sowohl der Aulacopoden als der Arioniden, dieselben gehören mit einziger Ausnahme des von Japan her eingedrungenen

Philomyces, der auf des Amurland beschränkt erscheint, sämtlich zur paläarktischen Fauna, es lassen sich aber zwei Verbreitungs- resp. Entwicklungszentren unterscheiden, das europäische (resp. boreale), und das kaukasische, zu dem auch die Krim und Kleinasien und die nordpersischen und südsibirischen Bergzüge gehören. Als neue Gattungen werden vorläufig aufgestellt *Metalimax* und *Monochroma*, beides Limaciden; die Beschreibung die zahlreichen neuen Arten erfolgt später.

Proceedings of the Malacological Society of London. Vol. II
No. 5. Juli 1897.

- p. 181. Tate, R., on, a Recent Species of *Arcoperna* (*Arc. recens* von Tasmanien).
- p. 183. Suter, Henry, Revision of the New Zealand Polyplacophora. (*Neu Ischnochiton parkeri* p. 186).
- p. 200. Suter, Henry, Note on *Mitra obscura* Hutton (mit Fig.)
- p. 203. Howes, G. B., Adress of the President.
- p. 227. Gwatkin, H. M., the Dentition of the Pupidae. — Der Autor bestätigt, dass *Sphyradium edentulum* Drp. und *simplex* Gld. in der *Radula* mit Punktum übereinstimmen; die anderen lassen zwei Typen erkennen; der eine hat den Mittelzahn mit 1—2 Spitzen, die Seitenzähne mit 2 von denen die inner grössere ist, die äusseren breit mit mehreren Spitzen, die innerste am grössten; der andere Typus hat an dem Zentralzahn und den Seitenzähnen nur 1, an den äusseren 2, seltener mehrere Spitzen. Die *Radula*struktur stimmt mit der gebräuchlichen Eintheilung nach der Mundbildung in keiner Weise überein.
- p. 229. Smith, Edgar A., Notes on some Type-Specimens in the British Museum. — Das Museum hat die in der Thomas'schen Sammlung befindlichen Typen erworben.
- p. 233. Sykes, R. E. Description of some new species of Helicoid and Operculate Land-Shell from Ceylon. With. pl. XVI. *Neu Corilla colletti* p. 233 fig. 11—13; — *C. gudei* p. 234 fig. 8—10; — *Euplecta colletti* p. 234 fig. 5—6; — *E. scobinoides* p. 234 fig. 1—2; — *Polita notabilis* p. 235 fig. 21—23; — *Macrochlamys? circumsculpta* p. 235 fig. 3—4; — *Cyathopoma artatum* p. 236 fig. 19—20; — *Cyath. prestoni* p. 236 fig. 17—18; — *Cyath. turcinatum* p. 236 fig. 15—16; — *Nicida prestoni* p. 237 fig. 14.

Martini Chemnitz, Systematisches Conchylien Cabinet. Neue Ausgabe.

Lfg. 429. *Helix* und *Columbella*, von Kobelt (Schluss). Zum ersten

Mal abgebildet *Xesta halmaherica* Strub. t. 225 fig. 8—11; — *Helix linterae* Mildff. t. 227 fig. 1—2. — *Rhysota hercules* Hedley t. 225 fig. 1—3 — *Bostryx baroni* Fulton t. 228 fig. 4—6. p. 228. *Scalaria*, von Clessin. — Neu *Sc. klunzingeri* p. 49 (t. 13 fig. 3) rothes Meer; — *Sc. zelebori* Fild. p. 50 t. 13 fig. 5. Auckland; — *Sc. novaeseelandiae* p. 57 t. 15 fig. 4, Neuseeland; — *Sc. jickelii* p. 57 t. 15 fig. 5, rothes Meer — *Sc. reevei* p. 63 t. 15 fig. 9, Auckland; — *Sc. sowerbyi* p. 63 t. 15 fig. 1, Mauritius; — *Sc. mexicana* p. 69 t. 16 fig. 13, Mexiko.
Lfg. 431. *Turritella* von Kobelt. Keine n. sp.

Ancey C. F., *Description de deux nouvelles espèces de Mollusques*. (Achatinellidae). In le Naturaliste p. 178.

Nur eine neue Art, *Amastra durandi* von Waianae auf Oahu.

Fulton, Hugh, *Descriptions of two new species of Amphidromus*. — In Ann. Mag. N. H. (6) XX p. 211.

(*A. floresianus* n. t. 6 fig. 2 von Süd-Flores, und *A. consobrinus* n. t. 6 fig. 3. von dort und Sumba).

Fulton, Hugh, *on supposed new Species of Oleacina, Trochomorpha and Bulimulus*. Ibid. p. 212.

Neu *Oleacina underwoodi* p. 212 t. 6 fig. 9, Costarica; — *Videna andamanica* Nevill mss. p. 212 t. 6 fig. 4, Andamanen; — *Vid. pseudosanis* Nev. mss. p. 214 t. 6 fig. 5, ibid.; — *Drymaeus baroni* p. 214 t. 6 fig. 8 von Rio Yonau in Peru. — Ausserdem werden abgebildet *Amphidr. sumbaënsis* t. 6 fig. 1, *Porphyrobaphe approximata* t. 6 fig. 6 und *Xenothauma baroni*, dessen Zugehörigkeit zu *Bostryx* wegen der Sculptur der Embryonalschale bestritten wird, t. 6 fig. 7.

Necrologie.

Am 21. Juni starb zu Kopenhagen im Alter von 84 Jahren **Johannes Japetus Steenstrup**, bis 1885 Direktor des Museums zu Kopenhagen, bekannt durch seine zahlreichen Arbeiten über die Cephalopoden.

Neues Mitglied.

Herr Lieut. Colonel **G. S. Parry**, 18 Hyde Gardens, Eastbourne, England,

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.,
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 20. Dezember 1897.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 180-184](#)