

Pal. vivipara und Bithynia tentaculata, in den klareren, weniger verwachsenen zahlreiche Limnäen und Planorben, aber nur selten Pal. vivipara.

Sämmtliche angeführte Arten hier zu nennen, würde uns zu weit führen; wir begnügen uns auf die aufmerksam zu machen, welche, sonst in Deutschland allgemein verbreitet, hier fehlen: *Hel. nemoralis*, *candidula*, *Hyalina nitidula*, *Bul. detritus*, *Pupa avena*, *secale*, *Ancylus lacustris*, *Neritina fluviatilis*, *Cyclostoma elegans*, *Tichogonia*. Dagegen kommen von den Angehörigen der osteuropäischen Fauna folgende Arten vor: *Zonites verticillus*, *Hel. austriaca*, *vicina*, *runderata*, *faustina*, *Clausilia ornata*, *Paludinella austriaca*.

Jedenfalls ist mit diesem Werke eine Grundlage geschaffen, auf welcher eine gründliche Erforschung Böhmens durchzuführen ist; die Abbildungen und der billige Preis (1 $\frac{1}{3}$ Thlr.) werden der Conchyliologie manchen neuen Jünger zuführen, der bisher, aus Mangel an Hilfsmitteln zur Bestimmung, andere Zweige der Naturwissenschaft für sein Studium wählte.

Eingewöhnungsversuche.

(Mit Bezug auf die Aufforderung S. 44 d. J.)

Ausgesetzt wurden (1865) *Helix lapicida* und *hortensis*, *Clausilia laminata*, *nigricans*, *plicata*, *plicatula*, *ventricosa*, *Bulimus obscurus* von Rügen in die Nähe des zoologischen Gartens bei Berlin; — (1862) *Bulimus obscurus* und *Clausilia lineolata* von München ebendasselbst; *Clausilia laminata* und *nigricans*, *Bulimus obscurus* und *Helix hortensis* vom Brieselang bei Spandau ebendasselbst; — circa 300 *Helix obvia* vom Tempelhofer Berg bei Berlin nach Monte Caprino und Casa Rivera bei Freienwalde an der Oder; circa 120 derselben von gleicher Stelle nach Rixdorf bei Berlin; desgleichen von Potsdam nach dem Garten von Bellevue und in die Nähe des Hippodroms bei Berlin; — in denselben Garten die erwähnten *Clausilien*, *Bulimus* und *Helix pomatia*. — *Unio pictorum*, *tumidus*, *batavus*, *crassus* und *ater*, *Sphaerium rivicola* aus der Oder bei Wrietzen, der Havel bei Spandau, der Spree bei Köpenik, der Panne bei Schönhausen, der Stobberow bei Bukow (Mark Br.), dem Hechtsee bei Freienwalde a. O., den Havelseen bei Werder und Potsdam, *Tichogonia*

Chemnitzii aus dem Teyler-See in die Thiergartengewässer bei Berlin in den Jahren 1863—69 eingesetzt.

Diese Versuche scheinen geringen oder gar keinen Erfolg gehabt zu haben. Vgl. meinen Bericht im Zoologischen Garten, Bd. IX. (1868) S. 300.

Berlin, 1. April 1870.

Ernst Friedel.

Rhytida inaequalis Pfr.

Auf der in letzter Woche stattgefundenen Versteigerung der bedeutenden Conchyliensammlung des verstorbenen Mr. Hamilton kaufte ich unter anderen auch sehr schöne Exemplare von *Rhytida inaequalis*, die wie die der Albers'schen Sammlung die Etiquette: Lord Howes isl., Australien, trugen. Diese Insel liegt unterm 159. Grad östl. Länge von Greenwich und etwa 31 Grad südl. Breite, mindestens dreimal so weit von Neucaladonien als vom australischen Festlande entfernt, so dass man sie wohl noch mit Fug und Recht zu letzterem rechnen kann. Die Autorität von Mr. Hamilton neben der von Albers scheinen mir aber unzweifelhaft zu beweisen, dass Mr. Crosse im Irrthum ist, wenn er Neucaladonien als einziges Vaterland der *Rhytida* annimmt.

London.

T. A. Verkrüzen.

Gesellschaftsangelegenheiten.

Affaires de la Société. — Affairs of the Society.

Verzeichniss neuer Mitglieder.

Nouveaux membres. — New membres.

167. Nieder-Engelheim: Herr Lehrer Grooss.

Für die Normalsammlung sind ferner eingegangen:

Die Najadeen des Leman von Herrn Dr. Brot.

Eine Suite Conchylien aus Kärnthen, Krain und Istrien, von Herrn Dr. Rössmann.

Landschnecken, auf den canarischen Inseln gesammelt, von Herrn Dr. von Fritsch.

Eine Suite von uns noch fehlenden Melanien von Herrn Dr. Aug. Brot in Genf.

Conchylien aus Syra, Santorin und der Gegend von Constantinopel, von Herrn Dr. von Fritsch.

mit Schrenkii], Soletellina Boeddinghausi, Chama ambigua, Dunkeri, semipurpurata, retroversa, Peeten quadriliratus.)

- p. 29. *Pfeiffer, Dr. L.*, Zwei neue Achatinen (Ach. Dohrniana aus Angola, zunächst mit Welwitschii Morel., und Dammarensis aus Dammara, zunächst mit Bayonniana Morelet verwandt).
- p. 32. *Martens, Ed. von*, Conchylien aus dem oberen Nilgebiet. (Neu Pl. Sudanicus, die erste nicht amerikanische Art aus der Gruppe des Pl. Guadeloupensis Sow.)
- p. 35. *Friedel, Ernst*, Zur Kunde der Weichthiere Schleswig-Holsteins. S. 38. Hamburg. S. 42. Lübeck, Travemünde und die Neustädter Bucht. S. 46. Kiel. S. 52. Ostholstein. S. 58. Knoop und der Eiderkanal. S. 59. Glücksburg und die Flensburger Förhde. S. 64. Husum, Tondern. S. 66. Förh, Sylt und die Halligen. S. 71. Die Westsee. S. 78. Neuwerk. S. 79. Die schleswigschen Austern. — Für die deutsche Fauna neu ist *Hyalina excavata* Bean.

Mémoires de la Société Malacologique de Belgique. Tome III. 1868.

- p. 9. *Thielens, Armand*, Notes conchyliologiques par le Docteur Ad. Senoner, traduites de l'italien.
- p. 15. *Lallemant, Ch.*, Malacologie des environs d'Alger. 1) Alger et ses environs. Aperçu géologique. Climatologie. Bibliographie. 2) Mollusques des environs d'Alger (4 Limax, 2 Krynickyllus, 2 Milax, 2 Testacella, 2 Succinea, 6 Zonites, 41 Helix, 2 Bulimus, 14 Férussacia, 2 Clausilia, 10 Pupa, 7 Vertigo, 3 Caecilianella, 2 Glandina, 2 Carychium, 2 Alexia, 10 Planorbis, 3 Physa, 2 Limnaea, 2 Ancylus, 2 Acme, 1 Bythinia, 2 Hydrobia, 2 Amnicola, 1 Melanopsis, 1 Neritina, 1 Sphaerium, 2 Pisidium, 3 Unio). 3) Table générale des espèces.
- p. 65. *Roffaen, François*, Mollusques terrestres et fluviatiles recueillies en Suisse. (1 Vitrina, 3 Succinea, 6 Zonites, 27 Helix, 5 Bulimus, 9 Clausilia [Weyersi Roff. n. sp.], 6 Pupa. 3 Planorbis, 6 Limnaea, 2 Cyclostoma, 1 Acme, 2 Bythinia, 2 Paludina, 2 Valvata [Colbeaui Roff. n. sp.], 2 Anodonta, 1 Unio, 2 Cyclas.)
- p. 85. *Colbeau, Jules*, Liste générale des Mollusques vivants de la Belgique, dressée d'après les documents publiés par les auteurs.
- p. 113. *Lanszweert, Edouard*, Liste des Zoophytes et des mollusques inférieures (Tuniciers et Bryozoaires) du Littoral belge.

(Nach jetzt erfolgtem Eintreffen des Bandes vervollständigt dieser Nachweis unsere Notiz in Nr. 3. S. 47. 1870. Bd. IV ist noch nicht in unsern Händen.)

Berichtigung.

S. 79, Z. 3 v. u.: statt Panne lies Panke; S. 80, Z. 1: statt Teyler-See lies Tegeler-See.

Redigirt unter Mitwirkung von D. F. Heynemann von Dr. W. Kobelt.

Druck von *Wilhelm Kuchler* in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Friedel Ernst

Artikel/Article: [Eingewöhnungsversuche. 79-80](#)