

Unio pictorum L. Haussee.

Anodonta anatina L. daselbst an Schilfstellen.

Ausserdem eine *Succinea* aus dem Formenkreise der *S. putris*, junge Exemplare mit Gletscherflöhen zusammen auf dem Eis des Haussees in Wassertümpeln.

Leider war ich zu unerfahren, um die grosse Formenmannigfaltigkeit der *L. stagnalis* zu würdigen und demgemäss zu sammeln. Auch habe ich die zu Tage tretenden Quellen mit ihrer Brunnenkresse nicht untersucht.

Literaturbericht.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1897 p. 1.

- p. 20. Pilsbry, Henry A., the Affinities of the Floridian Miocene Land Shells. Die fossilen Heliciden gehören sammtlich zu ausgesprochen westindischen Typen, die *Helices* zu *Plagioptycha* und *Pleurodonta*, die *Bulinus* zu einer neuen Gruppen *Hyperaulax* von *Bulinulus*, deren einziger überlebender Vertreter *Bul. ridleyi* Smith von Fernando Noronha ist.
- p. 18. Pilsbry, Henry A., Descriptions of new South American *Bulinuli* (*Bul. rushii* von Maldonato, Uruguay: *Bul. gorritiensis* von ebenda; — *Bul. cornubaënsis* = *amoenus* Bonn nec Pfr. aus Matto Grosso; — *Bul. angrandiensis* = *radiatus* Morel. nec Brug. aus Peru; — *Bul. pachys* von Bahia; — *Bul. chrysaloides* von Martinique; — *B. glyptocephalus* von Peru; — *Bul. sarcochrous* von Peru; — *Bul. (Neopetraeus) filiola* von Peru).

Martens, Ed. von, Conchologische Miscellen I. In Archiv f. Naturg. 1897 p. 35—46 t. 6—9.

Gibt die Abbildungen folgender schon früher beschriebener Arten: *Aerope beyrichi* t. 6 fig. 1—3, Pondoland; — *Dorcasia cerma* t. 7 f. 8—10, Gross Namaland; — *Dorc. coagulum* t. 7 f. 11—15, ebenda; — *Pella namaquana* t. 7 f. 1—4, Klein Namaland; — *Sculptaria retisculpta* t. 7 f. 5—7, Damaraland; — *Helix hettneriana* n. p. 40 t. 7 fig. 15—17, Peru; — *Papuna wiegmanni* n. p. 41 t. 8 fig. 1—4, Salomonen, Tuom; — *Pap. maso* t. 8 fig. 7—8, Taburí an der Astrolabe — Bai; — *P.*

heimburgi var. fuschii n. p. 43 t. 8 fig. 5—6. Neu Britannien:
— Taf. 9 enthält die Anatomie von *Calycia crystallina* Rve.

Westerlund, C. Ag., Beiträge zur Molluskenfauna Russlands.

Nach Sammlungen des Zoologischen Museums der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Peters-
burg. Abdr. aus Ann. Mus. Zool. 1897.

Chlathropodium (n. gen.) vitrinaeförme, vitrinenartig, ohne Mantel-
anhang, die Sohle durch feine Längs- und Querfurchen ge-
gittert; *Lagodusi* bei Tiflis p. 117; — *Vitrea viridis*, Berg II,
Caucasus p. 118; — *Polita siraphora*, Nachitschevan bei Erivan,
p. 118; — *Chilanonon* n. subg. für die zu *Petasia* gerechneten,
Sibirier p. 119; — *Chil. sibirica*, Kultuk am Baikal, p. 119;
Trichia verna, Irkutsk p. 119; — *Tr. podolica*, Podolien p. 120;
— *Tr. annexa*, Irkutsk p. 120; — *Tr. czekanowskii*, Irkutsk,
p. 121; — *Tr. eutheta*, Amur, p. 121; — *Tr. nothra*, Caucasus
p. 122; — *Campylaea ussuriensis*, Ussuri, p. 122 (wohl den
nordchinesischen Gruppe nangehörig, sicher keine *Campylaea*); —
Pomatia intermissa, Caucasus, p. 123; — *Claus. (Euxina) bale-*
opsis, Aschischbok p. 123; — *Eux. semchetica* var. *dissophya*,
Berg II p. 124; — *Serrulina signifera*, Lagodachi bei Tiflis,
p. 124; — *Carychium sibiricum*, Amurland, p. 124; — *Limnaea*
ovata var. *aberrans*, Kamtschatka, p. 125; — *L. palustris* var.
liogyra, Ussurigebiet p. 125; *Planorbis caucasicus*, Caucasus p. 125;
— *Pl. vortex* var. *carinea*, Gouv. Perm, p. 126; — *Pl. (Gyraulus)*
rapidus, Sibirien, p. 126; — *Gyr. foveolatus*, Weisses Meer p. 126;
— *Gyr. lentus*, Sibirien p. 127; — *Gyr. kamschaticus*, Kamt-
schatka, p. 127; — *Plan. (Armiger) baicalensis*, Baikalsee, p. 127;
— *Cyclostoma hyrcanum* var. *distans*, Caucasus, p. 128; —
Baicalia nodosa, Baikalsee, p. 128; — *Elona gravis* var.
borealis, Sibirien, p. 129; — *Valvata brandti*, Goktschasee, p. 129;
— *V. confusa*, Sibirien, p. 130; — *Sphaerium asiaticum* var.
caperatum, Sibirien, p. 130; — *Sph. levinodis* var. *radiatum*,
Tomsk, p. 131; — *Pisidium dilatatum*, Olenek, Sibirien, p. 131;
— *Unio schrencki*, Amur, p. 134; — *U. abbreviatus*, Amur,
p. 132. In einem Anhang werden die Citate der älteren Autoren
über Sibirien berichtet und revidirt. Es folgen dann noch als
n. sp. *Levantina placida* von Ordubad, p. 140; — *Mentissa*
canalifera var. *commoda* aus der Krim p. 141; — *Limnaea*
arctica, Semipalatinsk, p. 142; — *Gyr. granulatus*, *ibid.*, p. 142; —
Bythina costulata, Peipus-See, p. 142; — *Digyreidum persicum*,
Seistan, p. 143. —

Westerlund, C. Ag., Synopsis molluscorum extramarinorum Scandinaviae (Sueciae, Norvegiae, Daniae et Fenniae).
Aus Acta Societatis pro Flora et Fauna Fennica XIII.
No. 7.

Enthält die vollständige Aufzählung der skandinavischen Fauna nach dem heutigen Standpunkt des Verfassers. Als neu beschrieben werden *Vitrina holmensis* p. 33, Stockholm; — *Hyalina angulata*, Kopenhagen, p. 36; — *Trichia corasia*, Oeland, p. 50; — *Alaea dicaea*, Södermanland, p. 64; — *Al. gemma* ibid., p. 65; — *Al. cremia*, Medelpad, p. 67; — *Al. callista* Södermanland, p. 72; — *Succinea borealis*, Jemtland, p. 89; — *Planorbis cryptomphalus*, Kopenhagen p. 113; — *Pl. correctus*, Finland, p. 123; — *Pl. cochlearis*, Jemtland, p. 124; — *Pl. gelidus*, Skane, p. 124; — *Ancylus danicus*, Jutland, p. 126; — *Valvata liljeborgi*, Upsala, p. 137; — *Unio barys*, nom. nov. für *U. pseudolitoralis* Cless.;

Journal de Conchyliologie. Vol. XLV. No. 2.

- p. 89. Hervier, J., Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l'Archipel de la Nouvelle Calédonie (suite). Bringt die Abbildungen der im vorigen Band beschriebenen Arten.
- p. 122. Drouët, H., Unionidae nouveaux ou peu connus. — Neu *Unio valens*, Troyes; — *U. multizonatus*, Dänemark; — *Anodonta nitidovirens*, Livland; — *An. redacta*, Livland, Dänemark; — *Pseudanodonta acutalis*, Dalekarlien.
- p. 136. Mayer-Eymar, C., Descriptions de Coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs. — Neu *Gastrana corbiformis*, dujardini, bombycoides, rhynchaena; *Tellina deydieri*, escoffierae, fastigata, gallensis; *Ficula callomacensis*; *Oliva benoisti*, brevispira, *Columbella saccoi*.

Dall, William H. Notice on some new or interesting species of shells from British Columbia and the adjacent region.
In Natural History Society of British Columbia, Bulletin No. 2.

Neu *Crenella columbiana* p. 4 t. 1 fig. 3—5; — *Cr. leana* p. 4 t. 1 fig. 6—7; — *Cr. japonica* p. 5 t. 1 fig. 2; — *Modiolaria taylori* p. 5 t. 1 fig. 17—18; — *Mod. seminuda* p. 5 t. 1 fig. 1; — *Nucula carlottensis* p. 6 t. 5 fig. 15—16; — *Leda extenuata*

p. 8 t. 2, fig. 2; — *Yoldia ensifera* p. 9 t. 2 fig. 4; — *Y. martyria* p. 9 t. 2 fig. 15; — *Malletia faba* p. 10 t. 2 fig. 10; — *M. gibbsii* p. 10 t. 2 fig. 14; — *M. pacifica* p. 11 t. 2 f. 11; — *M. (Tindaria) kennealyi* p. 11 t. 2 fig. 9; — *Macoma inflatula* p. 11 t. 2 fig. 19—20; — *Mac. liotricha* p. 12 t. 1 fig. 21; — *Cadulus hepburni* p. 12 t. 1 fig. 13; — *C. tolmiei* p. 13 t. 1 fig. 8; — *Cythara victoriana* p. 13 t. 1 fig. 9; — *Turbonilla (Munio) tenuis* p. 13 t. 1 fig. 10; — *Miralda inflecta* p. 14; — *Rissoina newcombei* p. 14 t. 1 fig. 12; — *Molleria quadrae* p. 15 t. 1 fig. 14, — *Eucosmia lurida* p. 15, t. 1 fig. 11. — Ausserdem sind zum ersten Mal abgebildet *Leda fossa* Baird t. 2 fig. 3—13; — *L. cellulita* Dall t. 2 fig. 5—7; — *L. conceptionis* Dall t. 2 fig. 1; — *L. leonina* Dall t. fig. 12.

Proceedings of the Malacological Society of London Vol. II
No. 6.

- p. 242. Kennard A. S. and B. B. Woodward, Mollusca of English Cave Deposits. Es sind jetzt im Ganzen 29 Arten aus den englischen Höhlen bekannt; von besonderem Interesse sind *Cyclostoma elegans*, *Helix umbrosa* Partsch, welche der Abbildung nach allerdings von der alpinen Form erheblich abzuweichen scheint, da sie deutlich kantig ist, und *Hyalina helvetica* Blum, mit welcher nach Westerlund die englische *glabra* identisch ist. Die meisten Arten sind in den Höhlen erheblich grösser, als heute.
- p. 245. Suter, H., a Revision of the New Zealand Athoracophoridae. Acht Arten werden anerkannt; neu *Ath. dendyi*: für *Ath. marmoratus* Sinroth wird die neue Untergattung *Amphikonophora* errichtet. *Janella maculata* Colle ist = *Ath. bitentaculatus* Quoy.
- p. 258. Suter, H., the Land Mollusca of Stewart Island. — 9 neuseeländische und 2 endemische Arten. Neu *Endodonta sterkiana* var. *refttonensis* und *Prixnathus phrynia* v. *major*.
- p. 260. Suter, H., Revision of the New Zealand Trochidae. Neu *Trochus appressus* var. *dunedinensis* p. 261; — *Gantheridus sanguineus* v. *elongata* p. 272; — *Gibbula micans* p. 279, fig.: —
- p. 284. Suter H., Notes on some New Zealand Flammulina, with the description of *Fl. ponsonbyi* n. (mit Figur).
- p. 286. Smith, Edgar A., Descriptions of new species of Land-Shells from New Guinea and neighbouring Islands — Neu *Rhytida trobriandensis* p. 287 t. 17 fig. 1—3, Trobriand Isl.; — *Macrochlamys dohertyi* p. 287 t. 17 fig. 4—6, Andai; — *Hemiplecta andaiensis* p. 287 t. 17 fig. 7—8, Andai; — *Chloritis fusco-*

- purpurea p. 288 t. 17 fig. 12—14, Woodlark Ins.; — *Papua*
rufopurpurea p. 288 t. 17 fig. 9; — *P. molesta* p. 289 t. 17
 fig. 10 11 Andai; — *P. papuana* p. 289 t. 17 fig. 15, Andai;
Truncatella gracilentia p. 289 t. 17 fig. 16 17 Andai. —
 p. 291. Melvill, J. Cosmo and J. H. Pousonby, Description of *Achatina*
studleyi n. from Old Calabar, W. Afrika (Holzschnitt). —
 p. 292. Melvill, J. Cosmo, Description of *Plecostrema sykesii* n. cop. from
 Karachi. (Holzschnitt). —
 p. 293. Collinge, Walter E., on a further collection of slugs from the
 Hawaiian or Sandwich- Islands. — *Neu Amalia habori* und
Agriolimax beynoti. —
 p. 298. Sykes, E. R., Preliminary diagnoses of new species of non-
 marine Mollusca from the Hawaiian Islands. — *Neu Vitrea*
moloakaiensis, *V. lanaiensis*, *Kaliella Konaensis*, *Succinea*
Konaensis. —

Martens, Ed. von, Conchologische Miscellen II. Mit Tafel
 XV—XVII. In Archiv für Naturgeschichte 1897. —

Omogymna n. subg. *Olivae* für *paxillus* Rve. und *paniculata* Ducl.
 wo die äusserste Schalenschicht auf der letzten Windung oben
 schief abschneidet. — *Agaronia hiatala* var. *maltzani* p.
 162 t. 15 fig. 9, 10, Ruissqae; var. *maculifera* p. 163, West-
 afrika; — *Ag. testacea* var. *griseo-alba* p. 164 t. 15 fig. 18, 19
 Mexiko, Costarica; var. *philippii* p. 105 t. 15 f. 13, 14, nebst
 mut. *angularis* und mut. *candida*, Westküste von Südamerika;
 — *Ancillaria hilgendorffi* p. 167 t. 16 fig. 26—27, Japan; —
Columbella terpsichore var. *Kieneri* p. 108, Polynesien; —
Col. japonica p. 170 t. 16 fig. 6 = *californica* Kob.; — *Col.*
brasiliensis p. 171 t. 16 fig. 10, Brasilien; — *Col. oerstedii* p.
 172 t. 16 fig. 11, Westamerika; — *Nassa camelus* p. 173 t. 16
 fig. 15—17, Neu Britannien; — *Lippistes rollei* p. 174 t. 16
 fig. 21, 22, Japan; — *Laciniorbis* n. gen. für *Adeorbis fimbriatus*
 Mts. t. 16 fig. 19, 20, 23, Neu Guinea; — *Volva hilgendorffi*
 p. 176 t. 17 fig. 1, Japan; — *Vol. (Ternivoluta) studeri* p. 177
 t. 17 fig. 2 = *Psephaea concinna* Mts. olim, nec Brod. —
Mitra semigranosa p. 178 t. 16 fig. 24, 25, Westküste von
 Südamerika.

Watson, the Rev. Robert Boog, on the marine mollusca of
Madeira, with Descriptions of thirty-five new species, and
an Index List of all the Known Sea-dwelling Species

of that Island. In Linnean Societys Journal. Zoology vol. XXVI. With. pl. 19—20.

Zusammen 382 Arten, davon 35 neu: *Cyclina spreta* t. 18 fig. 1; — *Amphisphyræ flava* fig. 2; — *Philine complanata* fig. 3; — *Ph. trachyostraca* fig. 4; — *Ph. desmotis* fig. 5; — *Doridium maderense* fig. 7; — *Pleurobranchus dautzenbergi* fig. 8; — *Pl. lowei* fig. 9; — *Nassa antiquata* fig. 10; — *Ocenebra medicago* fig. 11; — *Trophon lowei* fig. 12; — *Bittium depauperatum* fig. 13; — *B. incile* fig. 14; — *Gaecum atlantidis* fig. 15; — *Natica furva* fig. 16; — *Scalaria rhysa* fig. 17; — *Sc. aspera* fig. 18; — *Sc. fischeri* fig. 19; — *Sc. smithii* fig. 20; — *Ciclis vitrea* t. 20 fig. 21; — *Acl. trilineata* fig. 22; — *Eulima fulva* fig. 24; — *Eul. sordida* fig. 25; — *Eul. badia* fig. 26; — *Eul. raphium* fig. 27; — *Eul. trunca* fig. 28; — *Eul. inconspicua* fig. 29; — *Odostomia omphaloëssa* fig. 30; — *Od. undata* fig. 31; — *Schismope depressa* fig. 32; — *Montacuta triangularis* fig. 33; — *Coralliophaga johnsoni* fig. 34; — *Teredo dalli* fig. 35. —

Friedel, Ernst, die Weichthiere des Müggelsees bei Berlin.
In Zeitschr. f. Fischerei 1897 Heft 3.—

Keine neue Form. Von Interesse sind genauere Angaben über das Vorkommen von *Lithoglyphus*.

Kükenthal, W., Parasitische Schnecken In Abh. Senckenb. naturf. Gesellschaft N. 24 H. 1. Mit 3 Tafeln. Frankfurt 1897.

Besprochen werden *Mucronalia eburnea* Desh., *Mucronalia* sp. ind., *Stilifer celebensis* n., *Thyca pellucida* n., *Th. crystallina* Gld., *Hipponyx australis* Quoy. Sie gehören zu zwei verschiedenen Formenkreisen: der eine führt von *Eulima* über *Mucronalia* zu *Stilifer*, der andere schliesst sich an *Capulus* und *Hipponyx* an.

Böttger, Prof. Dr. O., zur Kenntniss der Fauna der Mittelmioocänen Schichten von Kostež im Banat. In Verh. Siebenb. Verein für Naturw. vol. 46. 1896.

Die Gesamtzahl der von Kostež bekannten Arten wird um 110 vermehrt. Davon sind neu: *Scalaria Kimakoviczi* p. 53; — *Siphonodenralium transsylvanicum* p. 55; — *Bolma mehelyi* p. 60; — *Syrnola repanda* p. 62; — *Rissoina brandenburgi* p. 63; — *Hipponyx phlepsi* p. 64. —

Martens, Ed. von, Biologia Centrali-Americana Mollusca.
Bog. 32—34.

Enthält den Schluss von *Bulinulus*, *Simpulopsis* und von den *Cylindrellidae* die Gattungen *Eucalodium* und *Coelocentrum*. Neu die Untergattung *Resupinata* für *Eucal. speciosum* und Verwandte: — *Coelocentrum gigas* p. 267 t. 16 fig. 27. 28 von Ost-Guatemala; — *Coelocentrum championi* p. 268 t. 16 fig. 26 von West-Guatemala; zum erstenmal abgebildet *Eucalodium strebeli* Pfeffer t. 16 fig. 31—34; — *Coelocentrum clathratum* t. 16 fig. 29. —

Smith Edg. A., on a collection of Land-Shells from New Guinea. In Ann. Mag. N. H. (6) XX. p. 409 pl. 9 (Novbr. 1897).

Eine äusserst interessante Serie, die Mr. Doherty zum grösseren Theile im Distrikt Kapaur an der Südwestküste sammelte. Als neu beschrieben werden: *Rhytida kapauensis* fig. 1—3; — *Chloritis pervicina* p. 411 fig. 8—10; — *Papuina kapauensis* p. 412 fig. 11. 12; — *Perrieria minor* p. 414 fig. 13, die zweite Art der Gattung; — *Lagochilus papuanus* p. 415 fig. 14—16; — *Adelomorpha canefriana* p. 416 fig. 17. 18; — *Adel. globosa* p. 416 fig. 19; — *Ditropopsis* (n. gen.) *papua* p. 416 fig. 20—23; — *D.?* *fultoni* p. 417 fig. 24—26; — *Diplommantina papua* p. 418 fig. 28. 29; — *Palaina dohertyi* p. 418 fig. 30. 31; — *Pal. novoguineensis* p. 419 fig. 32. 33; — *Pupinella hedleyi* p. 419 fig. 34. —

Smith, Edg. A., on a collection of Land- and Freshwater Shells from Rotuma Island. Ibid. p. 519.

Von der völlig isolirt zwischen Viti, den Ellice-Inseln und den Neuen Hebriden gelegenen Insel, die auch als Grenville auf den Karten verzeichnet ist, werden aussen 3 Littorinen 14 sp. verzeichnet, davon neu *Rhytida gardineri* p. 519; — *Charopa perryi*, *rotumana* p. 520; — *Partula leafei* p. 520; — *Succinea rotumana* p. 521; — *Omphalotropis rotumana* p. 522. —

Kimakoricz, M. von, Dr. med. Arthur von Sachsenheims Mollusken-Ausbeute im nördlichen Eismeer an der West- und Nordküste Spitzbergens. In Verhandl. Siebenb. Verein f. Naturkunde XLVI. 1896 p. 67.

Neu *Neptunea sachsenheimi* p. 75; — *Buccinum glaciale* var. *regalis* p. 76; — *Littorina rudis* var. *spitzbergica* p. 78. —

Kobelt Dr. W., Rossmasslers Iconographie Neue Folge Bd. VIII. Erste und zweite Lieferung. Wiesbaden 1897. (Tafel 211—220).

Enthält die Neritinen, eine Tafel Planorbis und die Gattungen Carychium, Zospeum und Alexia. Neue Arten werden nicht beschrieben.

Scharff, Dr. R., the Land Molluska of the Great Skellig. In the Irish Naturalist. 1898 p. 9.

Auf dem steilen, nur bei ganz gutem Wetter zugänglichen, 10 Miles von der Küste entfernten Felsen leben 13 Arten; sie können schwerlich eingeschleppt sein; Pupa cylindracea kommt in der var. anconostoma vor.

The Journal of Conchology, Vol. IX. No. 1.

- p. 8. Masfield, I. R. B., Testacella haliotidea in North Staffordshire.
- p. 9. Hickson, S. I., Presidential Address on „Torsion in the Mollusca“.
- p. 15. Horsley, I. W., Note on some French Shell Names.
- p. 15. Adams, L. E. Paludestrina jenkinsi Smith in Ireland.
- p. 16. Lawson P., British Snails as Human Food.
- p. 24. Adams, L. E., the Sense of Smell in Limax maximus.
- p. 27. Smith, Edgar A., on some Land Shells from Trinidad. Neu Vitrea luntii p. 27 fig. 1. 2; — Sophina trinitaria fig. 3. 4; — Guppya hallucinata p. 28 fig. 7; — Luntia insignis n. gen. et spec Stenogyridarum, p. 28 fig. 8; —
- p. 30. Melvill, I. Cosmo and R. Standen, the Marine Mollusca of Madras and the immediate Neighbourhood. — Neu Cerithium carnaticum p. 31 t. 1 fig. 1; — Colina selecta p. 31 t. 1 fig. 2; — Rissoina (Morchiella) thaumasia p. 31 t. 1 fig. 3; — Syrriola maderaspatana p. 32 t. 1. fig. 4; — Turbonilla coromandelica p. 32 t. 1 fig. 5; — Cadulus anguidens p. 52 t. 1 fig. 6. — (To be cont.)

Brusina, Spir., Gragja zu Neogensku Malakolosku Fauna dalmacije, hrvatske, i slavonske uz neke riste iz Bosne, Hercegovine i serbye. (Materiaux pour la Faune malacologique néogène de la Dalmatie, de la Croatie, et de la Slavonie, avec des espèces de la Bosnie, de l'Herzégovine et de la Serbie.) Avec 21 Planches. Agram 1897.

Brusina hat sich endlich entschlossen, die schon lange bereit liegenden Tafeln mit den Abbildungen der dalmatinischen, kroatischen und slavonischen Conchylien zu veröffentlichen, leider nur mit kurzer Synonymie und ohne eingehende Beschreibung. Immerhin bilden die 21 Tafeln eine sehr dankenswerthe Bereicherung der Literatur über die südalpinen Neogenmollusken und eine sehr angenehme Ergänzung der sonstigen Arbeiten des Autors. Neu aufgeführt werden, soviel aus dem Text erkennbar: *Tacheocampylaea dodderleini* t. 1 fig. 1, 2; — *Planorbis bilici* t. 3 fig. 13-15; — *Pl. vezici* t. 2 fig. 29-32; — *Pl. geminus*=*applanatus* Neum. nec Thom. t. 2 fig. 11-13; — *Pl. pulici* t. 2 fig. 8-10; — *Amphimelania friei* t. 3 fig. 27, 28; — *Melanopsis sostarici* t. 6 fig. 9-12; — *Mel. astathmeta* t. 6 fig. 13-16; *Mel. lepaviniensis* t. 6 fig. 29, 30; — *Mel. hranilovici* t. 5 fig. 12; — *Bythinella?* *contenta* t. 10 fig. 5, 6. — *Byth.?* *dalmatica* t. 9 fig. 11, 12; — *Pyrgula boettgeri* t. 11 fig. 24, 25; — *P. tessellata* t. 11; fig. 26, 27; — *P. serratula* t. 11 fig. 33; — *Coelacanthia stigmatica* t. 10 fig. 15, 16; — *Micromelania klaici* t. 10 fig. 17, 18; — *Mier. turritellina* t. 10 fig. 19, 20; — *Mier. scobina* t. 10 fig. 21, 22; — *Mier. dictyophora* t. 10 fig. 27, 28; — *Mier. ptychophora* t. 10 fig. 31, 32; — *Mier. freyeri* t. 11 fig. 9, 10; — *Vrazia acma* (n. gen. et spec.) t. 10 fig. 13, 14; — *Robicia pyramidella* (n. gen. et spec.) t. 10 fig. 11, 12; — *Prososphenia cincta ecostata* t. 8 fig. 26; — *Pr. neutra* t. 9 fig. 3, 4; — *Hydrobia incerta* t. 9 fig. 34, 35; — *Hydr. sinjana* t. 9 fig. 9, 10; — *Staja adiophora* (n. gen. et spec.) t. 14 fig. 10, 11; — *Fossarulus buzolici* t. 8 fig. 14; — *F. bulici* t. 8, fig. 19, 20; — *Pseudamnicola spreta* t. 10 fig. 9, 10; — *Lithoglyphus fuchsi* t. 12 fig. 6; — *Vivipara bogdanowi* t. 12 fig. 25, 26; — *Valvata bukowskii* t. 14 fig. 1-3; — *V. furiei* t. 13 fig. 23-25; — *Neritodonta venusta* t. 14 fig. 28, 29; *Limnocardium arcaceum* t. 20 fig. 19; — *L. asaphiopsis* t. 20 fig. 20; — *L. okrugiei* t. 20 fig. 5; — *L. heteropleurum* t. 20 fig. 8; — *Sphaerium ozegovici* t. 21 fig. 1-3; — *Sph. filipovici* t. 21 fig. 21 fig. 5-7; — *Sph. stojanovici* t. 21 fig. 8-10; — *Pisidium Ivadiei* t. 21 fig. 15-17; — *Pis. ovulum* t. 21 fig. 31-33; — *Pis. hybonotum* t. 21 fig. 35-38, — *Pis. crassum* t. 21 fig. 27-29, —

The Journal of Malacology. Vol. VI. No. 3 und 4.

p. 33. Smith, Edg. A., on some new Species of Land Shells from the Island of Socotra. — *Neu Ennea cylindrica* p. 34 t. 5. fig. 1; —

Passamaella mirabilis p. 34 t. 5 fig. 5; — *Pass. bentii* p. 35 t. 5 fig. 3; — *Pass. rotunda* p. 35 t. 5 fig. 4; — *Ovella acuta* p. 36 t. 5 fig. 5; — *Ov. innocens* p. 36 t. 5 fig. 6; — *Stenogyra insculpta* p. 37 t. 5 fig. 7; — *Riebeckia decipiens* p. 37; — *Auricula socotrens* p. 37 t. 5 fig. 8; — *Lithidion bentii* p. 38 t. 5 fig. 9. —

p. 44. Gude, G. K., *Plectopylis* recently described in *Science Gossip* (*Pl. smithiana* fig. 1; — *Pl. plectostoma* var. *tricarinata* fig. 2; — *Pl. affinis* fig. 3; — *Pl. elaturatuloides* fig. 4. —

p. 49. Webb, W. M., the British Species of *Testacella* (cont.).

p. 56. The Distribution of British Non-marine Molluses. 1. Hand List for Essex. —

Hoyle, William E., a Catalogue of Recent Cephalopoda. Supplement 1887—1896. In *Proc. Roy. Phys. Soc. Edinb.* 897 p. 363—375.

Eine sehr dankenswerthe Arbeit, welche den 1886 erschienenen Catalog des Verfassers bis zum Jahre 1897 ergänzt. Er enthält 79 neue Arten und 9 neue Gattungen.

Babor, Dr. I. F., Beiträge zur Kenntniss der tertiären Binnenconchylien Böhmens I. In *Sitzungsber. k. böhm. Akademie* 1897.

Als neue Arten werden neben einigen Varietäten beschrieben *Carthusiana oxyspira*, *Trachia chliana*, *Ferussacia insignis*, *Clausilia* (*Cossmannia* n.) *slaviki*, *Serrulina kikoi*. Der Autor zieht auch *bernayi* *Cossm.* und *houlasi* *Cossm.* nicht zu *Agathylla*, sondern zu *Cossmannia*, die mit *Laminifera* Btg. verwandt ist. — Von Interesse ist eine Anmerkung dass *Helix rusicadensis* Let. von *Westerlund* zu *Carthusiana* gestellt, anatomisch zweifellos eine *Monacha* ist.

Martens et Wiegmann, Land- und Süßwassermollusken der Seychellen. — In *Mitth. Zoolog. Sammlung Mus. Berlin* I. I.

Als erste Abtheilung einer neuen Zeitschrift erhalten wir die systematische Bearbeitung der Ausbeute Braners durch Martens, die Anatomie, soweit Spiritusmaterial vorhanden, durch Wiegmann. Gleich zu Beginn wird ein zoogeographisches Räthsel aus der Welt geschütt, *Leptopoma sechellarum* mit grösser Wahrscheinlichkeit als Jugendform von *Tropidophora pulchra*

entlarvt. Als neu beschrieben werden Ennea (Acanthennea) erinaceus p. 8 t. 1 fig. 15—17. nebst var. uniseriata; — Streptaxis (Imperturbatia) constans p. 11 t. 2 fig. 5, mit var. silhouettae; — Str. (Imp.) violascens p. 13 t. 2 fig. 7; — Str. (Imp.) perelegans p. 12 t. 2 fig. 6; — Str. (Imp.) braueri p. 15 t. 2 fig. 8; — Priodiscus n. gen. für Discus serratus Ad. t. 2 fig. 1; — Helix (Pilula n.) praetumida var. mahesiana p. 16 t. 2 fig. 13; — mit var. silhouettae; — Pachnodus fulvicans var. biornatus p. 21 t. 2 fig. 24; — Hapalus braueri p. 24 t. 2 fig. 18; — Ferner noch Rhachis aldabrae p. 28 t. 2 fig. 15. 16 von den Aldabras. — Wiegmann giebt die Zungenbewaffnung oder anatomische Details von Edentulina dussumieri, Acanthennea erinaceus, Streptaxis souleyetianus, constans, braueri, Elma nevillei, Priodiscus serratus, Kaliella subturritula, Pilula praetumida var., Eulotella similaris, Stylodon unidentata, studeriana, Pachnodes ornatus, fulvicans, Achatina panthera, Subulina octona, Succinea mascarena.

Möllendorff, Dr. O. von, *Verzeichniss der auf den Philippinen lebenden Landschnecken*. Sep. Abz. aus Abh. naturf. Gesellschaft Görlitz vol. XXII. 183 P.

Das erste vollständige Verzeichniss der auf den Philippinen lebenden Landmollusken, 90 Gattungen mit 1079 Arten. Es wird unsere Leser interessiren zu erfahren, dass demnächst das erste Heft einer Fortsetzung des grossen Semper'schen Conchylienwerkes aus der Feder Möllendorffs erscheinen wird.

Pollonera, Carlo, *Molluschi terrestri e fluviali dell' Eritrea raccolti dal Generale di Boccard* In Bollet. Museo Torino vol. XIII. No. 313. Con Tavol.

51 Arten, davon 4 aus der Gegend von Massana, die anderen von Hochplateau; als neu werden beschrieben: *Vitrina humilis* p. 2 fig. 1—3; — *V. demissa* p. 3 fig. 4—6; — *V. modesta* p. 3 fig. 10—12; — *Thapsia unguinosa* p. 5 fig. 13—15; — *Pe-raeus boccardi* p. 7 fig. 16, mit var. *obesa* fig. 17; — *Fruticicola assaortina* p. 9 fig. 18—21; — *Sphaerium boccardii* p. 12 fig. 30, 31; — *Sph. abyssinicum* p. 12 fig. 28, 29.

Martens, Ed. von, *Biologia Centrali-americana*. Mollusca Bogen 35, 36 Decbr. 1897.

Enthält die Gattung *Holospira* mit 21 sp. (neu *Hol. claviformis* p. 277 t. 16 fig. 10—16 = *piloceri* Sow. nec Pfr.; — und *Hol-*

fusca p. 281 t. 16 fig. 19—24, beide aus Guerrero), *Cylindrella* (1 sp.) und den Anfang von *Macroceramus*. —

Annals and Magazine of Natural History (7) I.

- p. 191. Collinge, Walter E., on two new species of Slugs of the Genus *Microparmarion*, from Borneo (*M. fultoni* p. 191 t. 9 fig. 1—5; — *constrictus* p. 193 t. 9 fig. 6, 7, beide von Borneo und Lombok).
- p. 196. Melvill, I. Cosmo, a brief bibliographical Resumé of the Erythraean Molluscan Fauna with descriptions of new species from Aden. Es sind jetzt 640 Arten von Aden bekannt. Als neu beschrieben werden: *Nassa* (Hebra) *polychroma* p. 198 t. 12 fig. 1; — *Glyphostoma fenestrata* p. 198 t. 12 fig. 2; — *Coralliophila arabica* p. 199 t. 12 fig. 3; — *Aclis exaereta* p. 199 t. 12 fig. 4; — *Eulima shoplandi* p. 200 t. 12 fig. 5; — *Leiostraca constellata* p. 200 t. 12 fig. 6; — *Leptothyra yemenensis* p. 200 t. 12 fig. 7; — *Calyptrea edgariana* p. 201 t. 12 fig. 8; — *Novaculina xyreces* p. 202 t. 12 fig. 9; — *Tellinella manumissa* p. 202 t. 12 fig. 10; — *Tellina* (*Angulus*) *yemenensis* p. 203 t. 12 fig. 11; — *Gari amianti* p. 204 t. 12 fig. 12; — *Petricola lyra* p. 204 t. 12 fig. 13; — *Semele shoplandi* p. 205 t. 12 fig. 14; — *Pectunculus tegulicus* p. 205 t. 12 fig. 15; — *Thracia adenensis* p. 206 t. 12 fig. 16. —

Shopland, E. R., List of Shells collected at Aden 1892—95.

— In *Journal Bombay Society* X. p. 217—235. —
Non vidi. —

Sturany Dr. R., über die von Dr. H. Rebel in Bulgarien 1896 gesammelten Gehäuseschnecken. — In *Annalen K. K. naturhistorischen Hofmuseums* Vol. XII. Heft II.

Fünfzehn Arten, darunter *Daudebardia rufa* var. *graeca* und als neue Arten *Campylaea haberhaueri* p. 112 t. 3 fig. 6—8, und *Clausilia* (*Idyla*) *rebeli* p. 116 t. 3 fig. 1—5; ausserdem sind einige Varietäten von *Helix lucorum* abgebildet.

Proceedings of the Malacologica Society of London. Vol. III
No. 1. April 1898.

- p. 1. Collett, O., Description of *Streptaxis gracilis* n. sp. from Ceylon (fig.),
p. 2. Suter, H., Revision of the New Zealand Rissoidae. Neu *Rissoia hamiltoni* p. 2 fig. 4; — *R. fumata* p. 5 fig. 1; — *R. foveauxi*—

- ana p. 5 fig. 2: — *R. lubrica* p. 5 fig. 3: — *R. plicata* v. *lyalliana* p. 6: — *Barleia neozeelandica* p. 8 fig. 5. —
- p. 9. Sowerby, G. B., on *Monodonta quadrasi* n. sp., belonging to the subgenus *Austrocochlea*, from the Philippine Islands. (fig).
- p. 10. Fulton, Hugh, Description of *Amphidromus inconstans* n. sp. from the Malay Archipelago. (fig.). (Von Alor oder Anbai.) —
- p. 11. Godwin — Austen, H. H., on *Philalanka* a new subgenus of *Endodonta*, with Descriptions of two new species from the Indian Region (*secessa* n. p. 11 t. 1 fig. 1—5 von Ceylon, und *bolampattiensis* n. p. 13 t. 1 fig. 6, Bolampatti Hills, Süd Indien).
- p. 14. Smith, Edg. A., Description of *Mulleria dalyi* n. sp. from India (fig.). Das Auftauchen der Gattung *Mülleria*, die seither auf Columbien beschränkt war, in Südindien, im District von Mysore, ist wieder ein geographisches Räthsel, das nur durch das hohe geologische Alter unsern Süßwasserfauna und der Familie *Aeetheriidae* erklärt werden kann.
- p. 17. Smith, Edg. A., Description of *Raphanus perakensis* n. sp., with a list of the known species of the Genus. — Die Liste enthält 9 Arten. —
- p. 20. Smith, Edg. A. on a small collection of marine shells from New Zealand and Macquarie Island, with descriptions of new species. — *Neu Mitra albopicta* p. 21 fig. 5: — *Paludestrina hamiltoni* p. 22 fig. 1, 2: — *Macoma suteri* p. 23 fig. 6: — *Mactra ordinaria* p. 23 fig. 7: — *Cyamium oblongum* p. 24 fig. 8, 9: — *Myrina minuta* p. 24 fig. 4: — *Modiolarca bicolor* p. 24 fig. 3: —
- p. 26. Smith, Edg. A., a list of the Landshells of the Island of Lombok, with description of new species. — Zusammen 25 Arten, davon 16 endemisch. Neu sind *Hemiplecta rufolineata* p. 27 t. 2 fig. 2: — *H. internota* p. 27 t. 2 fig. 3: — *H. perinsignis* p. 28 t. 2 fig. 5: — *Everettia* (?) *perglabra* p. 28 t. 2 fig. 7, 8: — *Sitala collinae* p. 28 t. 2 fig. 9, 10: — *Stenogyra lombockensis* p. 29 t. 2 fig. 14: — *Subulina* (*Nothus*) *soror* p. 30 t. 2 fig. 15: — *Noth. brevior* p. 30 t. 2 fig. 16: — *Tornatellina citrea* p. 30 t. 2 fig. 17: — *Cyclotus* (*Pseudocyclophorus*) *lombockensis* p. 31 t. 2 fig. 18: — *Registoma obliquum* p. 31 p. 31 t. 2 fig. 19: — *Diplommatina lombockensis* p. 31 t. 2 fig. 21: —
- p. 33. Smith Edg. A., Descriptions of new species of Land-Shells from New Guinea, North Borneo, and Aldabra Island, Indian Ocean.

- Neu Charopa dilectans p. 33 t. 2 fig. 23, 24, Kapaur an der Südküste von Neu Guinea: — Planispira dulcissima p. 33 t. 2 fig. 20, Kinabalu: — Diplommatina whiteheadi p. 34 t. 2 fig. 26. Zum erstenmal abgebildet ist Rhachis abdabae Mts. t. 2 fig. 25.
- p. 35. Melvill, I. Cosmo and E. K. Sykes, Notes on a second collection of marine shells from the Andaman Islands, with descriptions of new forms of Terebra. With plate III. Neu Terebra andamanica p. 41 t. 3 fig. 3; = T. celidonta p. 42 t. 3 fig. 2; — T. crenulata var. booleyi p. 42 t. 3 fig. 5; — T. nitida var. siccyodes p. 43 t. 3 fig. 8; —
- p. 49. Burne, R. H., a reno-pericardiac pore in Ampullaria urceus Müll. —
- p. 51. Burne, R. H., on some points in the anatomy of Sepia officinalis L.
- p. 57. Crick, G. C., on an example of Acanthoteuthis ferussacia Mstr. from the lithographic stone of Solenhofen, Bavaria, exhibiting the buccal membrane. (with pl. 4).

Kleinere Mittheilungen.

Ueber die systematische Stellung der süd-arabischen *Clausilia schweinfurthi* Mts. schreibt uns Prof. Boettger:

„*Claus. schweinfurthi* bildet für sich eine Sektion, die zwischen Macroptychia (Gruppe der Claus. dystherata Jick.) und Boettgeria (Gruppe der Madeira Clausilien) zu stellen ist, ersterer aber näher steht. Mit *Cl. dystherata* gemeinsam ist der stumpfe Wirbel, die durchlaufende Spirallamelle, die kurze, breite unten zugespitzte Platte des Clausiliums, etc. Aber der Habitus, die Sculptur, die Grösse, die flachen Windungen, die grosse Zahl der Umgänge, kleine Abweichungen im Schliessapparat (der an den gewisser Pirostoma — Arten erinnert und nichts ungewöhnliches hat) würden mich abhalten, die Art in die Sektion Macroptychia zu stellen. Ich würde für sie also eine neue Sektion vorschlagen“.

Wohnortsveränderung.

Herr L. Aug. Paar wohnt jetzt in Ruggel, Post Nendeln, Fürstenthum Lichtenstein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literaturbericht 50-63](#)