

riam et latiore ad umbilicum relinquenter ornata. Spira convexo-conica apice permagno, obtusato, lutescente. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura impressa sulco spirali fortiori marginata discreti, ultimus inflatus, rotundatus, antice valde et profunde convexo-deflexus. Apertura obliqua, lunato-ovata, intus coerulescens, castaneo limbata; peristoma obtusulum, castaneum, marginibus callo castaneo extus bene marginato junctis, externo et basali levissime reflexiusculis, columellaris compresso, acie albida, dilatato, appresso, umbilicum omnino claudente.

Diam. maj. 39, alt 35 mm.

Hab. Pelagonisi insulam Graeciae.

Zwei neue Arten aus Deutsch-Neuguinea

Von

W. Kobelt.

Planispira simbangensis n.

Testa umbilicata, deppressa, fere discoidea, solida, polita, nitida, subtiliter striata, striis aperturam versus fortioribus, interdum costiformibus, albida nigro-castaneo bifasciata, fascia infera latiore, epidermide tenui fugaci lutescente (? levissime pilosa) induita, spira plana, anfractu penultimo tantum leviter prominente, apice excavato; umbilicus perspectivus, ad $\frac{1}{3}$ obtectus. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura profunda discreti, superi lente, inferi celerius aerecentes, ultimus dilatatus, sat inflatus, rotundatus, longe descendens, antice gibboso-cristatus, dein constrictus, ad aperturam iterum dilatatus, et in umbilico distincte serobiolatus. Apertura perobliqua, piriformi-circularis, modice lunata, alba fasciis translucentibus; peristoma expansum et undi-

que late reflexum, tenue, marginibus approximatis sed haud junctis, columellari subsinnato, primum attenuato, dein leviter expanso, umbilici $\frac{1}{3}$, interdum fere $\frac{1}{2}$ obtegens.

Diam. maj. 25., min. 21,5, alt. 14,5, diam. apert. obl. 14 : 14 mm.

Hab. Simbang Novae Guineae germanicae.

Chloritis simbangensis n.

Testa pervie umbilicata, depresso globoso spira plana, tenuiuscula, sed solidula. vix striatula, undique confertissime granulosa, lutescenti alba, (in speciminibus bene conservatis epidermide fusca pilosa induita;) spira vix immersa apice perparvo. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi. sutura profunde impresas discreti, ultimus perinflatatus, ad suturam planus, medio obsoletissime subangulatus, circa umbilicum cylindricum, pervium compresso-cristatus, antice profunde descendens, levissime constrictus. Apertura obliqua, fere diagonalis, lunato-circularis, peristoma albido-carneum marginibus callo tenuissimo junctis, externo brevissime expanso et reflexo, columellari dilatato et fornicatim reflexo.

Diam. maj. 20, min. 16,5, alt. 13 mm.; diam. apert 11 mm.
Hab. Simbang Novae Guinea germanicae.

Literaturbericht.

Pilsbry, H. A., and Charles W. Johnson, a classified Catalogue with Localities of the Land.-Shells of America North of Mexico. Reprinted, with corrections, from the Nautilus 1897—1898. 8°. 31 S.

Es werden im Ganzen 375 Arten aufgeführt, außerdem zahlreiche Varietäten oder Unterarten mit trinominaler Benennung. Die eingeschleppten Arten sind mit eingeschlossen. —

Proceedings of the Royal Physical Society of Edinburgh. Session 1896—97.

p. 336. Goodechild, J. G., Notes on the Mollusca of the Laminarian Zone at Leith. —

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Zwei neue Arten aus Deutsch-Neuguinea 92-93](#)