

stellen, sondern für sie und *X. ptychodia* Bgt., *berenice* Kob., *libyca* Kob., vielleicht auch *tuberculosa* Conr. die libysch-syrische Gruppe *Xeroptychia* Monter. annehmen. Wie Kobelt (p. 356) selbst hervorhebt, sind diese Wüstenformen eher von *Xeroleuca* als von *Turricula* abzuleiten.

Doch genug der kritischen Bemerkungen. Sie dienen eher als Beweis, wie wenig auch ein Fachgenosse dem ausgezeichneten Werke hinzuzufügen findet. Möchte Verfasser seine anregenden und gediegenen Studien bald auch auf die aussereuropäischen Länder, namentlich Asien, ausdehnen, so dass wir bald in den Besitz eines dritten Bandes gelangen!

Kowno, Juli 1898.

Literatur.

The Nautilus vol. XII.

- p. 1. Aldrich T. H., Notes on some Land and Freshwater Shells from Sumatra, with Descriptions of New Species. — Von Marang werden 38 Arten aufgeführt, davon neu: *Hemiplecta marangensis* p. 2 t. 1 fig. 9, 10; — *Sitala carinifera* var. *marangensis* p. 2 t. 1 fig. 6; — *Trochomorpha dohertyi* p. 2 t. 1 fig. 7, 8; — *Lagocheilus marangensis* p. 3 t. 1 fig. 5; — *Omphalotropis dohertyi* p. 3 t. 1 fig. 1, 2; — *Leptopoma fultoni* p. 3 t. 1 fig. 11, 12; — *Diplommatina luvaënsis* p. 4 t. 1 fig. 3, 4. —
- p. 4. Dall, W. H., on a new species of *Fusus* from California (*T. roperi*, Typus der neuen Sektion *Roperia*).
- p. 5. Wright, Berlin H., new Unionidae. (*U. strodeanus* von West-Florida; — *U. cylindricus* v. *strigillatus*, Clinch River, Va.). —

Le Naturaliste Année XIX.

- p. 222. Ancey, C. F., Description d'un Mollusque nouveau (*Leptachatina approximans* von Oahu).
- p. 250. Jousseaume, D., Description d'une Coquille nouvelle (*Cyclophorus veseconesi* aus Ecuador. —

p. 265. Jousseaume, Dr., Description d'une Coquille nouvelle. (*Dryptus flori* von Machala in Ecuador; — *Diabolica*, eine *Nuculida* mit vorn verkümmerten Schloss.

— — Année XX.

p. 14. Jousseaume, Dr., Description de Coquilles nouvelles. — *Hamadryas rabuti* und *Drymaeus andai* von Tana in Ecuador. — (p. 22) *Latiaxis coutierieri* von Neu Britannien (fig.); — *Jssina issina* n. gen. et spec., *Erycina* verwandt. Djibuti p. 81; *Cardium vulva* Japan; p. 106 *Surcula bouvieri* unbekannten Fundortes, *Otitoma otitoma* n. gen. et spec. von Djibouti, *Canilla sura* von den Andamanen, *Thala malvacea* von Djibouti.

Hrvatsko Naravoslovno Drustvo. (Societas Historico-naturalis croatica). X Godina. Agram 1898.

p. 193. Brusina, Sp. Prilog za malakolosku Faunu Novoy Vinodolskoga. Kroatisch. Es werden 50 sp. aufgezählt, für *Cerithium renovatum* Mts.=*vulgatum* var. *pulchella* Phil als ältester Name *Cer. aluchense* (Chieregh.) Nardo eingeführt.

p. 198. *Dreissensia torbari* i srodne joi palearticke vrste. Die fossile *Dreissensia* Slavoniens wird als Art abgetrennt. Br. erkennt folgende lebende Arten des paläarktischen Gebietes an: *Congeria cochleata* Kickx aus Belgien; — *Dreissensia polymorpha* Pall, weit verbreitet; — *Dr. blanci* Westerl. Albanien, Griechenland, Kleinasien; — *Dr. andrusowi* Brus., kaspisches Meer; — *Dr. caspia* Eichw., kaspisches Meer; — *Dr. bugensis* Andr. Bug; — *Dr. pallasi* Andr., Aralsee; — *Dr. bourguignati* Loc., Syrien, Mesopotamien; — *Dr. rostriformis* Desh., Kaspi; — *Dr. grimmi* Andr., Kaspi. —

Andrusov, M., Fossile und lebende Dreissensidae Eurasiens. Mit 15 Figuren im Text und 20 Tafeln. Petersburg 1897.

Russisch geschrieben. —

Gredler, P. Vincenz, zur Conchylienfauna von China. XIX. Stück. — Separatabzug aus dem Gymnasialprogramm von Bozen 1998. Mit Tafel.

Enthält eine Anzahl von Potanin in Gansu gesammelte Nova: *Napaeus Möllendorffi* var. *concolor* p. 4; — *U. vincentii* p. 5 fig. 1; — *Bul. pupopsis* p. 6 fig. 2; — *Zebrina schalfewi* p. 7 fig. 3; — *Bul. hyacinthi* p. 8 fig. 4; — *Bul. rhabdites* p. 9

fig. 5; — *Serina* n. gen. für *Buliminiden* mit doppeltem, weit ausgebreitetem, zusammenhängendem Mundsäum mit 3 Arten: *S. cathaica* p. 11 fig. 7; — *S. ser* p. 11 fig. 8; — *S. sub.ser.* p. 12 fig. 9. — Wir gaben einen Abdruck der Diagnosen, da das Bozener Gymnasialprogramm schwerlich in viele Hände kommt.

Journal de Conchyliologie vol. 45 No. 4 (1897).

p. 209. Fischer, H., *Resumé des travaux de M. F. Bernard sur le développement de la coquille des Pelecypodes.*

p. 225. Hervier, le R. P. J., *Descriptions d'espèces nouvelles de Mollusques provenant de l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie (suite).* Von schon früher beschriebenen Arten werden abgebildet: *Mangilia isodoma* t. 9 fig. 1; — *M. isophanes* t. 9 fig. 2; — *M. colombi* t. 9 fig. 3; — *Mitra amaura* t. 9 fig. 4; — *Costellaria rufobalteata* t. 9 fig. 5; — *Cost. pagodula* t. 9 fig. 6; — *C. humilis* t. 10 fig. 1; — *C. diamesa* t. 10 fig. 2; — *C. ochracea* t. 10 fig. 3; — *C. albotaeniata* t. 10 fig. 4; *C. lanceolata* t. 10 fig. 5; — *Pusia aubryana* t. 10 fig. 6; — *P. loyaltiensis* t. 10 fig. 7; — *P. rhodochroa* t. 10 fig. 8; — *P. roseotincta* t. 10 fig. 9. —

p. 249. Hervier, le Rev. P. I., *Diagnoses d'espèces nouvelles de Triforais provenant de l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie (suite).* *Neu Jniforis cornuta* p. 249; — *Jn. Jousseaumi* p. 250; — *Jn. goubini* p. 251; — *Jn. formosula* p. 251; — *Jn. poecila* p. 252; — (*Mastaniaeforis* (*violacea* Quoy var. *minor* p. 253; — *Jnella montrouzieri* p. 253; *Jn. episcopalis* p. 254; — *Jn. melantera* p. 254; — *Jn. rutilans* p. 255; *Jn. aurea* p. 256; — *Mastonia loyaltiensis* p. 256; — *M. monacha* p. 257; — *M. taeniolata* p. 258; — *M. fulvenscens* p. 258; — *M. papillata* p. 259; — *M. mediotincta* p. 259; — *M. ustulata* p. 260; — *M. leucomys* p. 261; — *M. lucidula* p. 261; — *M. lamberti* p. 262; — *M. troglodytes* p. 263; — *M. turricula* p. 263; — *M. quadrimaculata* p. 264; — *M. amoena* p. 264; — *Viriola intergranosa* p. 266. —

The Journal of Conchology, vol. 9 No. 3. Juli 1898.

p. 75. Melvill, J. C. and Standen, R., *the Marine Mollusca of Madras and the immediate neighbourhood (cont.)*

p. 85. Melvill, J. C., *Note on Cypraea rashleighana.*

p. 86. Oldham, C., *Notes on some Anglesea Land- and Fresh-water Mollusca.*

p. 89. Hann, Rev. A., *Paludestrina jenkinsi* near Middlesborough.

p. 91. Horsley, J. W., *Hyalinia cellaria* in Walworth.

p. 92. Adams, L. E., Observations on the pairing of *Limax maximus* L.

p. 95. Standen, R., Note on *Terebra eximia* Dh.

p. 95. Collinge, Walter, E., Note on a new variety of *Testacella maugei*.

Kobelt, Dr. W., *Studien zur Zoogeographie. Zweiter Band. Die Fauna der meridionalen Subregion.* Wiesbaden, Kreidel 1898. No. 368 P.

Eine eingehende Besprechung dieses Bandes welcher die paläarktische Fauna zum Abschluss bringt, siehe oben.

Verrill, A. E., and Katharine J. Busch, *Revision of the Deep-Water Mollusca of the Atlantic Coast of North America, with descriptions of new Genera and Species.* — *Part I. Bivalvia.* In Proc. U. S. Nat. Museum Vol. 20 p. 775—901. pl. 71—97.

Als neu beschrieben werden: *Martesia* (*Martesiella* n. subg.) *fragilis* p. 777 t. 79 fig. 10; — *Abra longicallis*, var. *americana* p. 778 t. 83 fig. 6, 7; — *Montacuta bidentata* var. *tenuis* p. 779 t. 92 fig. 7; var. *fragilis* p. 780 t. 92 fig. 8; — *M. striatula* p. 780 t. 93 fig. 9; — *M. casta* p. 781 t. 94 fig. 5; — *M. cuneata* p. 782 t. 91 fig. 4 t. 93 fig. 5; — *M. triquetra* p. 782 t. 91 fig. 3; — *Kelliopsis* n. gen. für *Montacuta elevata* Stimps. p. 783; — *Cryptodon insignis* sp. 785 t. 91 fig. 1, 2; — *Cr. croulinensis* var. *altus* p. 787 t. 88 fig. 1, 2; — *Cr. equalis* p. 788 t. 91 fig. 5, 6; — *Cr. planus* p. 788 t. 88 fig. 3, 4; — *Cr. obsoletus* p. 789 t. 89 fig. 1, 2; — *Cr. (Axinulus) n. brevis* p. 790 t. 89 fig. 7, 8; — *Cr. (Ax.) inequalis* p. 791 t. 90 fig. 1, 2; — *Cr. (Ax.) simplex* p. 791 t. 92 fig. 3, 4; — *Cr. (Ax.) pygmaeus* p. 792 t. 86 fig. 3, 4; — *Cr. (Ax.) ovatus* p. 793 t. 91 fig. 7, t. 93 fig. 1; — *Axinopsis orbiculata* var. *inaequalis* p. 794 t. 92 fig. 5, 6; — *Ax. cordata* p. 795 t. 97 fig. 5, 6; — *Axinodon* (n. gen.) *ellipticus* n. p. 796 t. 90 fig. 5, 6, t. 92 fig. 1; — *Leptarinus* (n. gen.) *minutus* p. 797 t. 89 fig. 3—5; — *Cuspidaria turgida* p. 799 t. 72 fig. 7, t. 77 fig. 4; — *C. media* p. 800 t. 71 fig. 5, 6, t. 73 fig. 6; — *C. parva* p. 801 t. 74 fig. 9, t. 77 fig. 7; — *C. ventricosa* p. 802 t. 72 fig. 5, t. 76 fig. 6; — *C. formosa* p. 803 t. 74 fig. 6, t. 79 fig. 9; — *C. fraterna* p. 803 t. 71 fig. 7, 8, t. 75 fig. 6; — *Cardiomya abyssicola* p. 806 t. 73 fig. 4, t. 74 fig. 1, t. 77 fig. 9; — *C. gemma* (= *Neaera paucistriata* Busch nec. Dall.) p. 809 t. 71 fig. 3, 4, t. 14 fig.

11; — *C. glypta* Busch (=ornatissima Dall) p. 810 t. 71 fig. 1, t. 76 fig. 3. 7; — *Halonympha striatella* p. 810 t. 72 fig. 2. 3. t. 77 fig. 3; — *Myonera pretiosa* p. 812 t. 77 fig. 5; — *Poromya sublevis* var. *microdonta* p. 813 t. 76 fig. 1. 2, t. 87 fig. 1; — *Cetoconcha aptycha* p. 814; — *Lyonsiella cordata* p. 818 t. 95 fig. 7. 8; — *Lyonsia granulifera* p. 818 t. 95 fig. 1; — *Clidiophora inornata* p. 818 t. 95 fig. 5. 6; — *Keenerlia brevis* p. 821 t. 88 fig. 7; — *Periploma affinis* p. 822 t. 87 fig. 4; — *Limatula regularis* p. 823; — *L. nodulosa* p. 824; — *L. hyalina* p. 825; — *Chlamys benedicti* p. 834 t. 84 fig. 1. 2 — *Chl. costellata* p. 835 t. 86 fig. 6; — *Hyalopecten dilectus* p. 836 t. 97 fig. 9; — *Cyclopecten namis* p. 837 t. 85 fig. 2—4; — *Cyclopecten subimbrifer* p. 840 t. 85 fig. 8. 9; — *Bathyarca abyssorum* p. 843 t. 76 fig. 9; — *B. anomala* p. 844 t. 77 fig. 8; — *Limopsis sulcata* p. 845 t. 92 fig. 2, t. 95 fig. 9, t. 96 fig. 1; — *Nucula proxima* var. *ovata* p. 852 t. 81 fig. 6, t. 88 fig. 5; — *N. subovata* p. 852 t. 81 fig. 8 t. 83 fig. 5; — *Ledella messanensis* var. *sublevis* p. 856 t. 81 fig. 7; — *Ledella parva* p. 857 t. 81 fig. 1; — *Yoldia (Abranella)n. casta* p. 858 t. 80 fig. 4; — *Yoldiella iris* p. 863 t. 80 fig. 1. 2, t. 82 fig. 11; — *Yoldiella inflata* p. 864 t. 80 fig. 8 t. 82 fig. 5. 6; — *Y. subangulata* p. 865 t. 77 fig. 3, t. 79 fig. 6; — *Y. lenticula* var. *amblya* p. 866 t. 80 fig. 9, t. 81 fig. 4; — *Y. fraterna* p. 867 t. 80 fig. 5, t. 82 fig. 8; — *Y. curta* p. 868 t. 97 fig. 8; — *Y. pachia* p. 868; — *Y. inconspicua* p. 869 t. 79 fig. 3. 5; — *Y. minuscula* p. 870 t. 79 fig. 2. 7; — *Y. dissimilis* p. 872 t. 78 fig. 8, t. 82 fig. 7; — *Malletia abyssorum* p. 875 t. 87 fig. 7; — *M. polita* p. 876 t. 82 fig. 10; — *Neilonella subovata* p. 878 t. 80 fig. 10, t. 82 fig. 3. 4; — *Tindaria callistiformis* p. 881 t. 78 fig. 1, t. 80 fig. 6. 7; — *T. lata* p. 882; — *Solemya grandis* p. 884 t. 86 fig. 1. 2. —

Sturany, Dr. Rud., Katalog der bisher bekannt gewordenen südafrikanischen Land- und Süßwasser Mollusken mit besonderer Berücksichtigung des von Dr. Penther gesammelten Materiales. Vorläufige Mittheilung in Akadem. Anzeiger Wien 1898 No. XVI.

Als neu beschrieben werden: *Ennea perspicuaciformis* p. 1; — *E. gouldi* var. *excedens* *E. transiens*, *E. differens*, *E. separata* p. 2; — *E. ingens*, *E. sejuncta*, *E. instabilis*, *E. ampullacea* p. 3; — *E. multidentata*, *E. durbanensis*, *E. perissodonta* p. 4; —

E. isipingoënsis nebst var. *discrepans*, *simillima* und *cylindrica*
E. leppani p. 5; — *E. amoldi*, mit var. *elongata*, *E. pentheri*,
Achatina pentheri p. 6; — *Livinhacia arnoldi*, *Opeas durbanense*,
Rhachis dubiosus, *Rh. pentheri* p. 7; — *Buliminus moventensis*,
Pupa pentheri, *Succinea dakaënsis*, *Linnaeus dakaënsis* p. 8;
 — *Vivipara unicolor* var. *sambesiensis*, *Unio caffer* var. *pen-*
theri, *Spatha maitenguensis* p. 9. —

*Sarasin, Dr. P. und Dr. F., Materialien zur Naturgeschichte
 der Insel Celebes. Erster, Band: die Süßwasser-Mollusken
 von Celebes. Mit 13 Tafeln. Wiesbaden, Kreidel 1898.*

Der erste Band eines auf drei Bände berechneten Prachtwerkes,
 der zweite soll die Landmollusken behandeln, der dritte die
 geographische Stellung von Celebes. Als neu beschrieben und
 vorzüglich abgebildet werden folgende meist schon im Zoolo-
 gischen Anzeiger beschriebene Arten: *Melania toradjorum* p.
 14 t. 1 fig. 1. 2; — *M. palicolarum* p. 16 t. 1 fig. 3. 4; —
M. patriarchalis p. 17 t. 1 fig. 5. 6; nebst var. *towietensis* p.
 p. 19 t. 1 fig. 7. 8; — *M. gemmifera* p. 20 t. 1 fig. 9. 10; —
M. monacha p. 21 t. 3 fig. 37. 38; — *M. scalariopsis* p. 22
 t. 2 fig. 18. 19; — *M. molesta* p. 23 t. 2 fig. 11. 12; — *M.*
carota p. 28 t. 3 fig. 28. 29; — *M. testudinaria* var. *perconica*
 p. 28 t. 3 fig. 33. 34; — *M. zeamais* p. 30 t. 3 fig. 35. 36; —
M. insulae sacrae p. 32 t. 2 fig. 20 21; — *M. tomoriensis* p.
 33 t. 4 fig. 48. 49; — *M. kuli* p. 35 t. 2 fig. 15—17; — *M.*
centaurus p. 36 t. 2 fig. 13. 14; — *M. asperata* var. *cele-*
bicola p. 37 t. 3 fig. 30—32; — *Tylomelania* (n. gen.) *neriti-*
formis p. 52 t. 4 fig. 56. 57; — *Tyl. carbo* p. 53 t. 4 fig. 50.
 51; — *Tyl. porcellanica* p. 54 t. 4 fig. 52 53 mit var. *connec-*
tens p. 55 t. 4 fig. 54. 55; — *Vivipara crassibucca* p. 60 t. 10
 fig. 131 132; — *Niv. persculpta* p. 62 t. 10 fig. 129. 130; —
Viv. intulenta p. 63 t. 10 fig. 133. 134; — *Viv. rudipellis* p.
 65 t. 10 fig. 135. 136; — *Miratesta celebensis* p. 73 t. 10 fig.
 137—139 (var. *robusta*); fig. 140—142 (var. *ampullacea*); fig.
 143. 144 (var. *gracilis*); — *Jsidora callosa* p. 79 t. 11 fig. 156.
 157; — *Protancylus* (n. gen.) *adhaerens* p. 84 t. 11 fig. 145—
 148; — *Pr. pileolus* p. 86 t. 11 fig. 149—151; — *Corbicula*
matanensis p. 92 t. 11 fig. 158—60; — *C. possoënsis* p. 92
 t. 11 fig. 161. 162. — Von hohem Interesse ist die genauere
 Untersuchung der Melaniendeckel, deren Bau durch Behandeln
 mit concentrirter Salzsäure deutlicher gemacht wurde. Es

lassen sich zwei Typen unterscheiden, der eine cerithienartig, spiral gewunden mit centralem Nucleus, wohl phylogenetisch älter (Palaeomelania), der andere fast nur aus der letzten Windung bestehend mit einem kleinen, oft verkümmerten Nucleus in der unteren Ecke (Neomelania). —

Hofer, Dr., Beitrag zur Molluskenfauna des Kantons Aargau.
In Mitth. aarg. naturfor. Gesellschaft 1898 Heft
8 p. 38—57.

Aus dem Aargau war seither, nur ein Verzeichniss ohne Fundorte von Bronner veröffentlicht, das obendrein vor ca. 50 Jahren erschienen ist. Der Verfasser hat namentlich die Reussgegend von Mellingen bis Brugg, die Braunnegg, die Gegend um Baden und um Kulm berücksichtigt und dem Aargenist besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Die Fauna ist die typische der deutschen Schweiz.

Proceedings of the Malacological Society of London,
Vol. III. No. 2.

- p. 63. Sykes, E. R., Descriptions of two new Species of *Clausilia* from the Province of Che-Kiang, China. (*Claus. timalthea* und *labyrinthoides*, beide in Holzschnitt abgebildet).
- p. 65. Sykes, E. R., List of the Species of *Cataulus* found in Ceylon, with descriptions of some new Land-Shells from that Island. With pl. V. — *Neu Cataulus nevilli* p. 68 t. 5 f. 16; — *C. Colletti* p. 69 t. 5 fig. 15; — *Nicida catathymia* p. 69 t. 5 fig. 9; — *Cyathopoma leptomita* p. 69 t. 5 fig. 8; — *Microcystina lita* p. 70 t. 5 fig. 10. 11; — *Kaliella delectabilis* p. 70 t. 5 fig. 7; — *Sitala pyramidalis* p. 70 t. 5 fig. 18. 20; — *S. operiens* p. 70 t. 5 fig. 12; — *Euplecta praeeminens* p. 71 t. 5 fig. 5. 6; — *Plectopylis* (*Sykesia*) *clathratula* var. *compressa* p. 72 t. 5 fig. 13. 14; — *Pl. (S.) caliginosa* p. 72 t. 5 fig. 21. 22; — *Thysanota eumita* p. 72 t. 5 fig. 17. 18; — *Glessula collettae* p. 73 t. 5 fig. 1; — *Opeas prestoni* p. 73 t. 5 fig. 4; — *Scabrina brounae* p. 73 t. 5 fig. 2. 3. —
- p. 75. Smith, Edg. A. Notes on the Genus *Coxiella*. — Smith erkennt 3 sp. an: *C. striatula* Mke.=*pyrrhostoma* Cox; *confusa* n.=*striatula* Adcock, Cox, nec Mke; und *Gilesii* (*Paludinella*) Angas=*stirlingi* Tate. —
- p. 77. Kenyon. Mrs. A. F., Note on *Cypraea anguis*, Phil., with the description of a new variety of *C. caput serpentis* (var. *caput colubri*; die Varietäten abgebildet).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 121-127](#)