

Neue Arten aus Hinterindien.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Bensonia (Oxytes) laotica.

T. latiuscule umbilicata, umbilico $\frac{1}{6}$ diametri adaequante, depresso-conoidea, tenuiuscula, superne confertim sed distincte costulata, lineis spiralibus minutis decussata, opaca, basi subtiliter plicato-striata, nitens, luteo-cornea. Spira sat elevata, subregulariter conica. Anfr. 6 modice convexi, sutura sat impressa disjuncti, ultimus ad peripheriam carina obtusa sed bene exserta carinatus, pone carinam interdum zona angusta pallide brunnea ornatus. Apertura sat obliqua late elliptica, modice excisa, peristoma rectum, obtusum, ad umbilicum paullo dilatatum, vix reflexiusculum.

Diam. 31,5, alt. 20, apert. lat. 15,5, long. 13,7, alt. 12.

Oberer Mekong im Lande der Laos (Roebelen).

Otesia mecongana.

T. anguste et semioctecte perforata, depressa trochiformis, tenuis, superne subtiliter plicato-striatula, microscopice decussatula, parum nitens, corneo-fulva. Spira modice elevata, fere regulariter conica. Anfr. $6\frac{1}{2}$ convexiusculi, lente accrescentes, sutura per carinam subexsertam marginata disjuncti, ultimus carina acuta utrimque exserta carinatus, basi convexior, minus distincte striatus, sericinus. Apertura modice obliqua, subrotundato-securiformis; peristoma rectum, acutum, margo columellaris superne breviter sed valde reflexus, perforationem semiobtegens.

Diam. 14,5, alt. 8.

Mit voriger Art (Roebelen).

Eulota schanorum.

T. anguste et semiobtecte umbilicata, conoideo-globosa aut globoso-conoidea, solidula, leviter striata, spiraliter minute lineata, pallide luteo-cornea. Spira plus minusve

conoidea. Anfr. $5\frac{1}{2}$ —6 modice convexi, ultimus supra medium obtuse subangulatus. antice breviter descendens, circa umbilicum sat distincte angulatus. Apertura modice obliqua, subcircularis, sat excisa, peristoma modice expansum, intus sublabiatum, margo columellaris superne valde dilatatus, umbilicum medium obtegens.

Diam. 24,5, alt. 18, apert. lat. 15, long. 13,5, alt. 12

„ 21,5, „ 23, „ „ 13,5 „ 12 „ 10,25

Shan Staaten (Hungerford), Kalow, 5000', südliche Shan Staaten (Strubell).

Glessula latestriata.

T. ventricosulo-oblonga, tenuiuscula, subpellucida, striis impressis sat distantibus peculiariter sculpta, corneo-flavescens. Spira modice elongata lateribus convexiusculis, apice acutulo. Anfr. 7 modice convexi, sutura bene impressa, subcrenulata disjuncti. Apert. fere verticalis, rotundato-rhomboidalis, peristoma rectum, obtusum, columella sat torta, abrupte truncata.

Diam. 4,5, alt. 10. apert. long. 3,5, lat. 2,25 mm.

Mit voriger (Strubell).

Rhiostoma strubelli.

T. late et aperte umbilicata, umbilico $\frac{5}{18}$ diametri aequante, conoideo-depressa, solidiuscula, subtiliter sed distincte striatula, griseo-alba, strigis fulguratis castaneis picta, ad peripheriam taenia angusta fusca ornata. Spira breviter conoidea. Anfr. 5 teretes, sutura sat profunde impressa submarginata disjuncti, ultimus longe descendens, breviter solutus, in parte soluta superne carinula obtusa, ad aperturam tubulo crassiusculo munitus. Apert. fere diagonalis, circularis, peristoma breviter expansum, sat incrassatum. Operculum subtestaceum, breviter cylindricum, 2,5 mm. altum.

Diam. 18, alt. 10 mm.

Mit vorigen (Strubell).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: [Neue Arten aus Hinterindien. 165-166](#)