

Diam. 3,1, alt, 3,2 mm.

Touranne.

Es ist sehr schwierig, bei diesen kleinen Arten bestimmte Unterschiede hervorzuheben; ich kann nur sagen, dass ich unter meinem reichen Material aus China, Hinterindien und Indonesien keine Art finde, mit welcher diese Form combinirt werden könnte.

8. *Hemiplecta platytaenia* n. sp.

T. modice sed aperte umbilicata, depressa, solidula, sat distincte plicato-striata, lineis spiralibus valde confertis oblique antrorsum decurrentibus sculpta, olivacea, superne taenia castanea latiuscula, infra peripheriam altera perlata ornata. Anfr. 5 $\frac{1}{2}$  sat celeriter accrescentes, convexiusculi, ultimus ad peripheriam subcarinatus, antrorsum sat dilatatus. Apertura valde obliqua, elliptica, modice excisa; peristoma rectum, obtusum, margo columellaris superne breviter reflexus.

Diam. maj. 61,5, min. 50, alt. 40, apert. lat. 34, long. 30, alt. 25 mm.

Touranne.

Von *H. neptunus* Pfr. verschieden durch die flachere Gestalt, Färbung und Bänderung, die peripherische Kante, welche fast zu einem Kiel entwickelt ist, und die raschere Zunahme der Windungen. (Schluss folgt.)

---

**Ueber einige Landschnecken aus dem südwestl. Marokko.**

Von

Prof. E. v. Martens.

---

Durch Pastor Kleinschmidt sind dem Berliner Museum aus der Gegend um Marrakesch, einem bis jetzt conchyliologisch noch unbekanntem Landstrich, die folgenden Arten zugekommen:

*Parmacella* Deshayesi Moq. Tand. Achmar und Doukkala, ersteres 1 $\frac{1}{2}$  Tagmärsche südöstlich von Safej.

- Helix (Caracollina) lenticula* Fer. Doukkala. Diese Art ist in dem neuesten Verzeichnisse der marokkanischen Landschnecken von Pallary Journ. de Conch. XLVI 1898 nicht erwähnt.
- (*Xerophila*) *alberti* Kobelt, Colomiesiana Mouss., non Bourg., nach Dr. Kobelt's Bestimmung. Doukkala und Achmar.
- (*Xeroleuca*) *subsuta* n. Bouslaffen. Beschreibung s. u.
- — *Mograbina* Morelet. Drenkat und Bouslaffen.
- — *turcica* Chemn. Achmar.
- (*Euparypha*) *delmei* Rossm. Bouslaffen.
- (*Macularia*) *lactea* Müll. var. *punctata* Müll. (myriostigma Bourg.) Drenkat.
- — *grossularia* n. Drenkat, Beschreibung s. u.
- Rumina decollata* L. Drenkat und Doukkala.
- Ferussacia mabilleana* Paladilhe var. Pallary Journ. de Conch. 1898 pl. 9 fig. 5. Doukkala.

*Helix (Macularia) grossularia* n.

Testa imperforata, globosa, laevis, opaca, fuscescens, punctis albis incrassatis et fasciis parum distinctis rufofuscis 4 picta; spira convexo-depressa, apice obtuso laevigato; anfr. 4<sup>1/2</sup>, convexiusculi, sutura superficiali juncti, ultimus supra et infra subaequaliter inflatus, antice valde deflexus: apertura perobliqua, subelliptica, parum excisa peristomate leviter patulo, crassiusculo, flavido-albido, intus fuscolimbato, marginibus appropinquatis, externo valde arcuato, marg. columellari stricto, non expanso, fusco, sulco impresso limitato; margine parietali fusco.

Diam. maj. 19, min. 15. alt. 12, apert. diam. 10, lat. incl. peristomate 9<sup>1/2</sup> mm.

Südwestliches Marokko, bei Drenkat, 2 Tagmärsche südlich von Marrakesch.

In Grösse und Gestalt an die Gruppe *Allognathus* erinnernd, aber nach der Bildung des Columellarrandes und der Färbung zur Gruppe der *H. lactea* gehörig, innerhalb welcher sie die kleinste und am meisten kugelige Art sein durfte.

*Helix (Xeroleuca) subsuta* n.

Testa peranguste umbilicata, subconico-lenticularis, subtiliter rugulosa, pallide griseo-flavescens, saepius maculis fuscis subquadratis supra carinam picta vel basi unifasciata; anfr.  $5\frac{1}{2}$ , subplani, spiram obtuse conoideam formantes, ultimus ad carinam dilatato-expansus, carina acuta, subirregulari, antice vix descendens, infra prope carinam paulum excavatus, dein versus umbilicum leviter convexus; apertura securiformis, sat obliqua, extus acuminato-rostrata, peristomate recto, acuto, margine supero stricto, infero bene arcuato.

Diam. maj. 19—20 $\frac{1}{2}$ ; min. 17—18, alt.  $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ , apert. diam.  $8\frac{1}{2}$ —10, lat. (alt. obliqua) 7—8 mm.

Südwestliches Marokko, bei Bouslaffen, 1 Tag-marsch nordwestlich von Marrakesch. Nächstverwandt mit *H. lacosteana* Morel., aber mit viel engerem Nabel.

Subsuta, nach unten angeflickt, wegen der wie eine Falbel vorspringenden und abwärts hängenden Kielplatte, nach Horaz serm. I, 2, 29 „subsuta instita veste“.

---

Literatur.

Putzeys, Dr., *Diagnoses de quelques espèces et d'un Sous-genre nouveau provenant de l'état indépendant du Congo.* — In Bull. Séances Soc. mal. Belgique 1899. p. LV.

Neu *Cyclophorus rugosus* p. 55 fig. 1, Manyema: — *Streptaxis micans* p. 55 f. 2, ibid.; — *St. pseudowensis* p. 55 fig. 3, ibid.; — *Ennea nyangwensis* p. 56 fig. 4, ibid.; — *E. albida* p. 56

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Martens Carl Eduard von

Artikel/Article: [Über einige Landschnecken aus dem südwestl. Marokko. 121-123](#)