

Gattung	Perak	Kelantan	Samui
Opisthostoma	paulucciae perakense	laidlawi	
Diplomatina	canaliculata nevilli ventriculus diminuta superba	sinulabris	samuiana
Alycaeus	gibbosulus conformis perakensis kapayensis thieroti diplochilus oligopleuris microdiscus parvulus microconus jousseumi montero- satiana	gibbosulus per. altispirus kelantanensis	per. roebeleni canaliculatus monter. samuiana

### Literatur.

Boettger, Prof. Dr. O., zur Kenntnis der Fauna der mittelmiocänen Schichten von Kostej im Krasso-Szörenyer Komitat II.

Sep. aus Verh. Siebenb. Verein Naturw. 1901 vol. 51.

Der Fundort an der ungarischen Südostbahn im ehemaligen Banat, nicht allzuweit von dem altberühmten Lapugy gelegen, hat sich als eine der reichsten Localitäten des Mittelmiocäns erwiesen. Die vorliegende Arbeit enthält 570 Arten Gastropoden, 1 Pteropoden und 5 Brachiopoden; die ebenso artenreichen Bivalven sind einer späteren Arbeit vorbehalten, die dann auch die

Abbildungen der massenhaften neuen Arten bringen soll. Dabei sind die Lager immer erst zum Theile ausgebeutet. Ueberraschend ist die grosse Anzahl tropischer Formen, welche dem Mittelmeer fehlen und die Bezeichnung „Mediterranenschichten“ nicht mehr ganz zutreffend erscheinen lassen. *Conus*, *Ancillaria*, *Mitra*, *Terebra*, *Ranella*, *Cancellaria*, *Pyramidella*, *Triforis*, *Rissoina*, *Tinostoma*, und namentlich die kleinen Pleurotomiden sind in einer geradezu überraschenden Anzahl vorhanden. Als neu beschrieben werden: *Conus wagneri* p. 7; — *Trivia selmae* p. 10; — *Erato hörnesi* p. 10; — *Costellaria annae* p. 14; — *Mitra werneri* p. 15; — *Nitidella embryonalis* p. 16; — *Mitrella sophiae* p. 17; — *Nassa dispar* p. 20; — *N. banatica* p. 20; — *N. altera* p. 21; — *N. adae* p. 22; — *Argobuccinum emmae* p. 26; — *Ranella kostejana* p. 27; — *Murex pseuderinaceus* p. 28; — *Muricidea kostejana* p. 29; — *M. giselae* p. 30; — *Pollia augustae* p. 34; — *P. seraphinae* p. 35; — *Fusus kostejanus* p. 36; — *Cancellaria brandenburgi* p. 38; — *Surcula carolinæ* p. 41; — *S. tenerima* p. 42; — *Drillia rotundicostata* p. 44; — *Dr. etelkae* p. 45; — *Dr. pseudosigmoidea* p. 46; — *Donovania miocaenica* p. 47; — *Clathurella amphiodon* p. 49; — *Cl. minnae* p. 50; — *Cl. annamariae* p. 50; — *Cl. compacta* p. 51; — *Cl. henrichi* p. 52; — *Cl. caroli* p. 53; — *Peratotoma parahystrix* p. 53; — *P. microhystrix* p. 54; — *P. theodolindae* p. 55; — *P. vesicalis* p. 56; — *P. herminiae* p. 56; — *P. subpurpurea* p. 57; — *P. subaequalis* p. 57; — *P. augustae* p. 58; — *P. alwinae* p. 59; — *P. transiens* p. 59; — *P. ringicula* p. 60; — *P. echinus* p. 60; — *P. unica* p. 61; — *P. evelinae* p. 62; — *P. hildae* p. 62; — *Mangilia brandenburgi* p. 63; — *M. subreticulata* p. 64; — *M. perfragilis* p. 64; — *M. banatica* p. 65; — *M. fuchsi* p. 66; — *M. bittneri* p. 67; — *M. subfoliata* p. 68; — *M. paulae* p. 68; — *M. detmersiana* p. 69; — *M. paucilirata* p. 70; — *M. biconica* p. 71; — *M. sororeula* p. 72; — *M. subaurea* p. 73; — *M. quadrata* p. 73; — *Rhaphitoma sparsa* p. 74; — *Rh. giselae* p. 74; — *Rh. subcylindrata* p. 75; — *Rh. fraterna* p. 76; — *Rh. pseudobrachystoma* p. 77; — *Rh. subvellicata* p. 78; — *Rh. parabrachystoma* p. 79; — *Rh. halavatsi* p. 80; — *Naticina kostejana* p. 82; — *Scalaria kostejana* p. 85; — *Sc. loerentheyi* p. 85; — *Pliciscala bimonilifera* p. 86; — *Pl. transsilvanica* p. 87; — *Aclis trilirata* p. 88; — *Eulima subdepressa* p. 90; — *Eu. emmae* p. 90; — *Eu. jickelii* p. 90; —

*Eu. transsilvanica* p. 91; — *Eu. halavatsi* p. 92; — *Stilifer aberrans* p. 93; — *Pyramidella digitalis* p. 94; — *P. seminula* p. 95; — *P. similis* p. 96; — *Odostomia pararissoides* p. 97; — *Od. subcrenata* p. 97; — *Od. subgibbosa* p. 98; — *Od. bielzi* p. 98; — *Od. vesti* p. 99; — *Od. deubeli* p. 99; — *Od. peregrina* p. 100; — *Od. micropeas* p. 100; — *Od. brusinae* p. 101; — *Od. perrara* p. 101; — *Syrnola wernerii* p. 103; — *S. pyramus* p. 104; — *Menestho peculiaris* p. 104; — *M. affinis* p. 105; — *Pyrgulina peraffinis* p. 105; — *P. unica* p. 106; — *Parthenia rara* p. 106; — *P. hungarica* p. 108; — *T. paraterebralis* p. 109; — *P. banatica* p. 111; — *P. theclae* p. 111; — *P. lanceiformis* p. 112; — *P. selecta* p. 112; — *P. bimonilifera* p. 113; — *Oscilla miocaenica* p. 113; — *Torinia marthae* p. 115; — *T. berthae* p. 115; — *Discohelix corniculum* p. 116; — *Cerithium olgae* p. 117; — *C. evae* p. 118; — *C. banaticum* p. 118; — *Triforis emiliae* p. 122; — *Tr. paulae* p. 122; — *Tr. imperatrix* p. 123; — *Tr. aequilirata* p. 124; — *Tr. clarae* p. 125; — *Tr. eugeniae* p. 125; — *Cerithiopsis irmae* p. 126; — *C. ulricae* p. 126; — *C. johannae* p. 127; — *C. elsaei* p. 127; — *C. heleneae* p. 128; — *C. opaca* p. 129; — *C. adelae* p. 129; — *C. norae* p. 131; — *Cerithiella kostejana* p. 132; — *C. christiana* p. 133; — *Sandbergeria densesulcata* p. 134; — *S. cylindrata* p. 134; — *Littorina kostejana* p. 135; — *Lacuna hoernesii* p. 135; — *L. banatica* p. 136; — *Fossarus microstomus* p. 136; — *F. proambiguus* p. 137; — *Rissoa johannae* p. 138; — *Alvania brachia* p. 139; — *A. heleneae* p. 140; — *A. giselae* p. 141; — *A. alexandrae* p. 139; — *A. elliae* p. 143; — *Microliotia brandenburgi* p. 144; — *Pseudonoba* (n. gen.) *peculiaris* p. 145; — *Scaliola semperi* p. 146; — *Alaba elata* p. 148; — *Rissoina semidecussata* p. 148; — *R. sororecula* p. 150; — *R. eleonorae* p. 150; — *R. neriniformis* p. 151; — *Hydrobia peregrina* p. 152; — *Mathilda praecleara* p. 155; — *M. clara* p. 155; — *Gegania banatica* p. 156; — *Vermetus sexcarinatus* p. 157; — *V. septemcarinatus* p. 158; — *V. semicostatus* p. 158; — *V. circumlobatus* p. 159; — *Narica transylvanica* p. 161; — *Collonia transylvanica* p. 163; — *C. globuliformis* p. 163; — *Monodonta kimakoviczi* p. 165; — *Gibbula renatae* p. 166; — *Cyclostrema kostejanum* p. 163; — *Tinostoma frequens* p. 167; — *T. fuchsi* p. 168; — *T. auingeri* p. 168; — *T. microdiscus* p. 169; — *Adeorbis semilaevis* p. 171; — *Ad. torniformis* p. 171; — *Propilidium circulare*

p. 173; — *Cocculina miocaenica* p. 174; — *Actaeon subpunctulatus* p. 174; — *A. reussi* p. 175; — *Bulla bitaeniata* p. 177; — *Cylichmya subangusta* p. 178; — *Coleophysis latesulcata* p. 179; — *C. frequens* p. 180; — *Pulsellum miocaenicum* p. 182; — *Megathyris praecursor* p. 184; — *Cestella subcordata* p. 185; — *C. subeuncata* p. 185; — *Crania subrostrata* p. 186.

*Knipowitsch, N., Zoologische Ergebnisse der Russischen Expedition nach Spitzbergen. Mollusca & Brachiopoda I.*  
— In: Ann. Mus. Zool. Acad. St. Petersburg 1901 v. 6.

122 Arten und Varietäten, davon neu: *Philine intermedia* t. 19 fig. 34, 35; — *Montacuta spitzbergensis* t. 19 fig. 43—45.  
Zahlreiche andere Arten sind photographisch abgebildet.

*Issel, Raffaële, Osservazioni sopra alcuni animali della fauna termale italiana.* — In: Atti Società ligustica Sc. nat. geogr. 1901, v. 12. Mit 2 Tafeln.

Behandelt namentlich die Verbreitung der toskanischen *Melanopsis*, die der Autor, ein Sohn des bekannten Genueser Forschers, sämmtlich unter *M. etrusca Villa* vereinigt. Ausserdem sind auch einige Formen von *Neritina*, *Limnaea* und *Bythinia* abgebildet. (Der Autor hat übrigens eben eine zweite grössere Arbeit unter der Feder, welche die gesammte Fauna der mittelitalienischen Thermalquellen behandelt.)

*Steusloff, M., xerophile Heliceen im Osten Mecklenburgs.* — In: Arch. Mecklenburg 1901, v. 55, p. 176.

Der Autor hat im östlichen Mecklenburg nicht nur *Xer. ericetorum*, *obvia* und *candidula*, sondern auch *intersecta* und *striata* nachgewiesen. Die Bestimmungen der vier ersten ist durch die Untersuchung der Pfeile gesichert.

---

#### Eingegangene Zahlungen:

Hocker, F., Rentamtmann, Gotha, Mk. 6.—; Bickhardt, C. H., Postsekretär, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Gallenstein, Hans von, K. K. Professor, Görz, Mk. 6.—; Westerlund, Dr. G. A., Ronneby, Mk. 6.—; Ricklefs, Pfarrer, Minsen, Mk. 6.—.

---

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.  
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 28. Juli.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen  
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 149-152](#)