

Eine im Mai 1900 von mir nach Strelna unternommene Excursion hatte in dieser Hinsicht negative Resultate ergeben. Weitere Funde müssen somit entscheiden, ob *A. arbustorum* als heimatberechtigt in unserem Gebiet anzusehen ist.

Neue Landschnecken.

Von

H. Rolle.

1. *Porphyrobaphe grandis* Rolle.

T. subfusiformi-oblonga, solida, leviter plicato-striata, lineis spiralibus nullis, violascenti-grisea, strigis subflammulatis fuscis et albis variegata, medio subdistincte taeniata. Anfr. 7—7½, superi planulati, inferi convexiusculi, ultimus magnus, modice convexus. Apertura parum obliqua, elongata, subauriformis; peristoma modice expansum, sat incrassatum, reflexiusculum, margo externus hepaticus, basalis recedens, albidus; columella sat torta, superne subplicata, alba, extus hepatica, callo modico hepatico cum margine externo juncta.

Diam. 42, alt 100,5, apert. lat. 26,7, long. 46,5 mm.

Hab.?

Original im Mus. Berlin.

2. *Pseudachatina perelongata* Rolle.

T. perelongata turrita, solida, mediocriter plicato-striata, lineis spiralibus evanescentibus decussata, cuticula straminea rugulosa decidua obducta. Anfr. 9 convexiusculi, sutura distincte marginata subcrenulata disjuncti, infra suturam subangulati, ultimus infra suturam impressus, tum distinctius, nec non ad peripheriam angulatus. Apertura modice obliqua, oblongo-ovalis; peristoma sat expansum, albolabiatum, basi magis effusum. Columella subrecta,

modice torta, basi subtruncata, cum margine basali sinulum sat profundum formans.

Diam. 39,7, alt. 99,5, apert. lat. 25, long. 38,9, alt. 36 mm.

Hab. Kamerun (Old Calabar).

Original im Mus. Berlin.

3. *Papuina phaeostoma* Marts.

Von der Insel Kung bei Neu Meklenburg (Neu Irland) erhielt ich diese von Neu Pommern (Neu Britannien) beschriebene Art in mehreren Formen:

a) *typica*. Mit dem Original im Berliner Museum ganz übereinstimmend.

b) *raremaculata* n. Mit viel spärlicherer Fleckenzeichnung, welche namentlich in der Mitte der letzten Windung verschwindet.

c) *fulgurata* n. Gestalt wesentlich höher, diam. 24,4, alt. 27,8 statt 28:25 mm. Schöne ausgesprochene Zickzackstreifen, braune Färbung fast über die ganze Lippe ausgedehnt.

d) *densepicta* n. Kleiner, 22:24 mm., entschieden gestreift, schwach gekantet, dichte, selten unterbrochene Zickzackstriemen; sie nähert sich sehr der *P. densestriata* Fulton, die daher wohl auch nur ein Extrem der Reihe *P. lamberti-phaeostoma* ist.

Literatur.

Martens, Ed. von, *die Meeresconchylien der Cocos-Insel*. —

In: S.-Ber. Ges. naturf. Berlin 1902 No. 6, p. 137.

Keine neue Art, die Gesammtfauna mit der der amerikanischen Westküste stimmend. Von besonderem Interesse ist das Vorkommen der sonst nur von den Molukken- und Sunda-Inseln bekannten *Acmaea striata*.

Kobelt, Dr. W., *Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien*. — Wiesbaden, Kreidel — Dritten Bandes erste Lieferung. Mit 4 Tafeln.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Rolle Franz Hermann

Artikel/Article: [Neue Landschnecken 211-212](#)