

Neue Landschnecken von Niederländisch Indien.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Chloritis romaensis Mlldff.

T. rimata, globosa, solidula, irregulariter plicato-striatula, minutissime pilosa, quasi pruinosa, luteo-cornea. Spira valde elevata, globoso-convexa, apice impresso-punctato. Anfr. 5 modice convexi, ult. magnus, bene convexus, antice descendens denique subito deflexus, subcoarctatus. Apert. valde obliqua, subcircularis; perist. labiatum modice expansum, reflexiusculum.

Diam. 16,5, alt. 14 mm.

Insel Roma bei Alor.

Xestina rugosissima Mlldff.

T. perforata, globoso-conoidea aut conoidea, leviter et irregulariter plicato-striatula, densissime oblique rugosa, opaca, carneo-lutea. Anfr. 5 convexiusculi, ult. plus minusve acute carinatus, supra carinam taenia perangusta castanea ornatus. Apert. valde obliqua, elliptica, modice excisa; perist. rectum obtusum, margo columellaris superne sat late triangulariter reflexus.

Diam. 30 alt. 19 mm.

„ 24,4 „ 18 „

Insel Roma.

Neue Amphidromus-Formen.

Von

H. Rolle.

Amphidromus waterstraati Rolle.

T. imperforata, solida, subtiliter striata, malleata, nitens, flava. Anpr. 6 modice convexi, sutura appressa

albida disjuncti. Apert. valde obliqua ovalis; perist. valde incrassatum, revolutum, columella valde dilatata, crassa, subtorta.

Diam. 33,2, long. 78,8. Ap. long. 32, lat. 25,5.

Zur Gruppe von leucoxanthus. Fundort: Palawan.

Amphidromus laevus Müll.

Fundort des Typus noch immer unbekannt, nach Martens-Pilsbry neuerdings Insel Kefing.

Von der Insel Roma n.ö. von Timor erhielt ich eine var., welche unzweifelhaft zu laevus gehört, aber bei aller Veränderlichkeit der Bänderung einen anderen Gesamtcharakter hat und sich als var. *romaensis* Rolle halten lässt.

Diam. 26. long 44 mm.

Eine zweite var. von der Insel Kissu ist gedrungenere dünnschaliger, Grundton der Färbung weisslich, die Spiralbänder schwarzbraun und gelb: var. *kissuensis* Rolle.

Diam. 16,2 long. 30 mm.

„ 17 „ 32 „

Amphidromus inconstans Fult. var. *gracilis* Rolle

immer mit rötlichem Columellarfleck, mitunter oberhalb desselben mit einem grünlich-braunen Band. Insel Roma.

a. nur mit rötlichem Columellarfleck: f. *subsimplex*.

b. mit grünem Band: f. *viridistriata*.

c. rötlicher Columellarfleck, darüber grüne Binde, darüber eine zweite, die mitunter verschwindet, dann senkrechte grünliche Striemen, welche sich nach oben in Fleckenreihen auflösen: f. *subporcellana*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Rolle Franz Hermann

Artikel/Article: [Neue Amphildromus-Formen 156-157](#)