

Pupa (Pupilla) muscorum (Müller, [nec Linné].)

Vertigo ventricosa elatior Sterki.

Vertigo pygmaea (Draparnaud, *Pupa*.)

Cionella lubrica (Müller, *Helix*.)

Hyalina Draparnaldi (Beck.)

Euconulus fulvus (Müller.)

Sphyradium edentulum (Draparnaud.)

Noch auffallender erscheint der gänzliche Mangel der übergrossen Gattung *Clausilia* (und *Buliminus*), welche gerade in China und Japan so reichliche Vertretung haben, dass man ihre Schöpfungszentra dahin verlegen möchte.

Kleinere Mitteilungen.

Eine neue *Pholadomya*. Die zweite Art der fossil so reich entwickelten Gattung hat der Albatross, das Forschungsschiff der nordamerikanischen Regierung, im Jahre 1906 in den japanischen Gewässern entdeckt. Dall beschreibt sie als *Ph. pacifica*. Sie ist 48 mm lang. Eine Abbildung wird demnächst erfolgen.

Die Angaben unseres Nachrichtenblattes über *Petricola pholadiformis* Lam. kann ich vervollständigen. Seit 55 Jahren habe ich fast regelmässig den Strand der Nordsee nach höhern Fluten abgesucht und nie diese Muschel gefunden. Erst 1906 sind mir solche vom Jadebusen gesandt. Auch dort habe ich früher den Strand besucht, ohne zu finden. Sie scheint mit einemmale gekommen zu sein und nun regelmässig angespült zu werden.

Waddenwarden. Ihr treuester Ricklefs, Pastor.

Literatur:

Proceedings of the Malacological Society of London, vol. VII.
no. 5, June 1907.

p. 246. Woodward, B. B., what evolutionary processes do the mollusca show? Inaugural Adress by the President.

- p. 260. Bourne, G. C., Note to correct the name Jousseaumia (Bourne nec Sacco neque Coutière). Der Name wird in Jousseumiella umgeändert.
- 261. Kennard, A. S. and B. B. Woodward, Notes on the Post-pliocen Mollusca of the Mylne Collection.
- 264. — & —, Notes on some Holocene Shells from Ightham.
- 266. Preston, H. B., Descriptions of four new species of *Melania* from New Ireland and Kelantan (novae-hiberniae, browni, melvilli, kelantanensis, alle mit Textfiguren).
- 269. Crick, G. C., on the arms of the Belemnite. With pl. 23.
- 280. Newton, R. Bullen, Relics of Coloration in Fossil Shells. With pl. 24. Spuren von Zeichnung gehen bis in das Oligocän zurück.
- 293. Suter, Henry. Notes on New Zealand Polyplacophora with descriptions of five new Species. — *Neu Ischnochiton luteoroseus* *Callochiton sulculatus*, *Chiton torri*, *Ch. clavatus*, *Onithochiton nodosus*, sämtlich mit Textfiguren.
- 299. Sowerby, G. B., Descriptions of new marine Mollusca from New Caledonia. With. pl. 25. — *Neu*: *Conus bougei* p. 299, t. 25, f. 1, 2; — *Cythara striatissima* p. 299, t. 25, f. 3; — *C. optabilis* p. 300, t. 25, f. 4; — *Pleurotoma abbreviata* var. *li-fuensis* p. 300, t. 25, f. 5; — *Mitra accincta* p. 300, t. 25, f. 6; — *Triphora eupunctata* p. 301, t. 25, f. 7; — *Tr. fuscozonata* p. 301, t. 25, f. 9; — *Mormula excellens* p. 302, t. 25, f. 10; — *Soletellina hedleyi* p. 302, t. 25, f. 12, Südaustralien; — *Scapharca fultoni* p. 302, t. 25, f. 11, Manila; — *Cryptodon murchlandi* p. 303, t. 25, f. 13, Capverden.
- 304. Da Costa, S. J., Descriptions of new species of *Drymaeus* from Peru, Mexico etc. With pl. 26. — *Neu*: *Dr. punctatus* p. 304, t. 26, f. 1, Chanchamayo, Peru; — *Dr. incognita* p. 304, t. 26, f. 4, Bogota; — *D. boucardi* p. 305, t. 26, f. 5, Chiriqui; — *Dr. ponsonbyi* p. 305, t. 26, f. 5, Surco, Peru; — *Dr. conicus* p. 305, t. 26, f. 7, Oaxaca, Mexico.
- 306. Gude, G. K., Descriptions of a new species of *Vallonia* from South India (miserrima, mit Textfigur).
- Cox, J. C., a list of Cyclophoridae found in Australia, New Guinea and adjacent groups of islands.* — Sydney, 1907 8°, 28 S.

Wesentlich auf meine Monographie im Tierreich begründet, aber mit zahlreichen kritischen Bemerkungen und Zusätzen.

Taylor, J. W., Vitrina elongata in Ireland. An Addition to the Fauna of the British Isles. — In: The Irish Naturalist, 1907, August, p. 215, pl. 26.

Die Art ist von Herrn Grierson bei Collon in der Grafschaft Louth zahlreich gefunden worden.

Weiss, Dr. A., Beiträge zur pleistocänen, alluvialen und recenten Conchylienfauna der Umgebung von Gera (Reuss). — In: Jahresber. Fr. Naturw. Gera 46—48, p. 115 bis 116.

Recent nur drei Arten.

Vohland, Albert, die Land- und Süßwassermollusken des Triebisch Fluss- und Bach-Gebietes mit Berücksichtigung der im Robschützer Kalktuff vorkommenden Fossilien. — Aus J.-Ber. naturf. Gesellschaft Leipzig 1907. — 48 S.

Eine moderne Fauna, welche ein kleines, scharf ungrenztes Gebiet gründlich durcharbeitet, Lokalität für Lokalität und Art für Art. Der jungdiluviale Travertin ist zur Vergleichung herangezogen. Das Thal ist interessant durch das zahlreiche Vorkommen der beiden *Daubardia*, an die sich eine var. *inflata* von *D. rufa* schliesst. V. kommt zur Ansicht, dass die Lokalität für *Daubardia* durchaus nicht feucht zu sein braucht, dass aber eine Hauptbedingung lockeres Steingeröll oder kluftreiche Felsen und Mauern sind; erwachsen sind sie meist im Juni, vereinzelte sind erst im Herbst halbwüchsig und überwintern; die meisten ziehen sich im Vorsommer in die Erde zurück und sterben ab. — Auch sonst sind zahlreiche biologische Beobachtungen beigelegt. Es wäre zu wünschen, dass in recht vielen Teilen Deutschlands derartige gründliche Durchforschungen begrenzter Gebiete vorgenommen würden, wie diese und die Geyer'schen in Württemberg.

Strebel, Dr. H., Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna der Magalhaen Provinz. V. Mit 8 Tafeln und 6 Abbildungen im Text. — In: Zoolog. Jahrbücher 1907, vol. 25, Heft 1.

Enthält die Fissurelliden, Patelliden und Pulmonaten. Neu-? *Megatebennus patagonicus* p. 98, t. 2, fig. 23; — *Tugalia antarctica* p. 106, t. 2, fig. 26; — *Acmaea ceciliana* var. *magellanica* p. 108. t. 3, fig. 35. 36, 59; — *Patinella delicatissima* p. 145, t. 6. fig. 71, 72, 94, 95; — *Patula michaelsoni* p. 160, t. 8, fig.

97; — *Limnaea patagonica* p. 164, t. 8, fig. 103; — *Chilina monticola* p. 169, t. 8, fig. 108.

Sturany Dr. R., Kurze Beschreibungen neuer Gastropoden aus der Merdita (Nordalbanien). — In: *Akadem. Anzeiger* 1907, no. 12.

Neu: *Campylaea zebiana*, *C. dochii*, *C. munelana*, *Buliminus meriditanus*, *B. zebianus*, *B. latifianus*, *B. winneguthi*, *Chondrula quadridens nicollii*, *Clausilia apfelbecki*, *Cl. thaumasia*.

Bartsch, Paul, a new parasitic Mollusk of the Genus Eulima.

— In: *Pr. U. St. Nat. Museum* vol. 52, no. 1548. —

(*Eulimina ptilocrinicola* von Britisch Columbia, auf *Ptilocrinus pinnatus* Clark schmarotzend, mit Taf. 53).

Schmalz, K., Pleurotomaria hirasei Pilsbry eine Varietät von Pl. beyrichi, Hilgendorf. — In: *Novae Symbolae Joachimicae*. — Mit 3 photographischen Tafeln.

Journal de Conchyliologie, vol. 54, No. 4, 30. Mai 1907.

p. 251. Suter, Henry, le genre *Placostylus* dans la Nouvelle Zélande Avec pl. VIII, fig. 1—3. Neu *Pl. hongii*, subsp. *ambagiosus*.

— 257. Dautzenberg, Ph., Description d'une nouvelle espèce terrestre Néo-Calédonienne (*Videna marteli* t. VIII, fig. 7—9).

— 260. Dautzenberg, Ph., de la présence d'une *Cypraea vinosa* Gmel. dans une sépulture franco-merovingienne. Mit Textfig.

— 263. Dautzenberg, Ph., quelques déformations chez des *Cypraea* de la Nouvelle-Calédonie. Avec pl. IX.

— 267. Preston, H. B., Descriptions of two new species of *Nassa* from Fiji and New-Caledonia. — (*mamillata* Textfig. 1, Neu Caledonien; — *oberwimmeri* Textfig. 2, Fiji).

— 270. Fischer, H. & C. Chatelet, sur l'habitat du *Glandina Lamyi*. Der genaue Fundort ist Cardenas in der mexikanischen Provinz San Luis de Potosi.

Journal de Conchyliologie, vol. 53, no. 2 (25. Aug. 1907).

p. 123. Coutourier, M., Etude sur les Mollusques Gastropodes, recueillis par M. L. G. Seurat dans les archipels de Tahiti, Paumotu et Gambier. Neu: *Tritonidea seurati* p. 137, t. 2, fig. 1—3; — *Murex triquetus* var. *emanuensis* p. 142; — *Epidromus digitalis seurati* p. 147; — *Rissoina zeltneri paumotuensis* p. 162, t. 2, fig. 9, 10; — *Teinostoma vayssieri* p. 171, t. 2, fig. 11—14.

Journal de Conchyliologie, vol. 55, No. 1 (15. Juni 1907).

p. 5. Lamy, Ed., Revision des *Arca* vivants du Museum d'Histoire naturelle de Paris. Avec pl. 1. — Ausser zahlreichen Berichtigungen der Synonymie werden als neu beschrieben oder zum erstenmal abgebildet: *Barbatia wendti* Schmeltz p. 45, t. 1, fig. 11—13, Ellice Inseln; — *Arca legumen* Rochebrune mss. p. 74, t. 1, fig. 3, 4, Westafrika; — *A. fischeri* p. 76, t. 1, fig. 5, 6, Tonrane, Hinterindien; — *A. nigra* p. 106, t. 1, fig. 7—10, Philippinen; — *A. signata* Dunker t. 1 fig. 12.

Dall, W. H., *Descriptions of new Species of Shells chiefly Buccinidae from the Dredgings of the U. S. S. Albatross during 1906, in the Northwestern Pacific, Bering, Okhotsk and Japanese Seas.* — In: Smiths. Miscell. Collections, Quarterly Issue, vol. 50, part 2, No. 1727. — Washington 1907.

Vorläufige Beschreibung, der bald die Abbildungen und eine Bearbeitung der reichen Gesamtausbeute folgen sollen. Beschrieben werden: *Pleurotomella simplicissima* p. 140; — *Buccinum zelandicum* p. 141; — *B. opisoplectum niponense* p. 142; — *B. enismatum, diplodetum* p. 143; — *B. epistomium, sigmatopleura* p. 144; — *B. polium, vedematum* p. 145; — *B. acutispiratum suruganum* p. 146; — *B. kadiakense, aniwanum* p. 147; — *B. sakhalinense, ectocyma* p. 148; — *B. bombycinum, limnoideum* p. 149; — *B. simulatum, bulimuloides, rossicum* p. 150; — *B. pemphigus* p. 151; — *B. oreotundum, fucanum* p. 152; — *B. eugrammatum, Chysodorus insularis constrictus* p. 153; — *Chr. variciferus, pericochlion parallelus* p. 154; — *Chr. adelphicus, oncodes* p. 155; — *Chr. eulimatus, trochoideus* p. 156; — *Ancistrolepis damon* p. 157; — *A. grammatus, Tritonofusus calamaeus* p. 158; — *Plicifusus polypleuratus, elacodes* p. 159; — *Pl. rhipsus, aurantius* p. 160; — *Pl. croceus* p. 161; — *Mohnia micra, sordida* p. 162; — *M. clarki, Volutopsius middendorffi emphaticus, V. kennicotti incisus* p. 163; — *V. limatus, simplex, harpa var. dexius* p. 165; — *Liomesus bistratus, Boreotrophon elegantulus* p. 165; — *Metula elongata, Galeodea leucodoma* p. 166; — *Astraea (Astridium) persica* p. 167; — *Basilissa babelica, Microgaza fulgens* p. 168; — *Cocculina japonica, Dentalium crocinum* p. 169; — *Nucula mirifica* p. 170; — *Chlamys erythromatus* p. 170; — *Crenella grisea, diaphana* p. 171; — *Modiolaria impressa, Liocyma aniwana, Pholadomya pacifica* p. 172.

Martini & Chemnitz, systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Auflage.

Lfg. 517. Viviparidae, von Kobelt. Enthält wesentlich Hinterindien und die Gattung Neothauma. — Neu: *V. naticoides theobaldi* t. 30, fig. 10, 11.

— 518. Helicinidae, von Wagner. Enthält die Unterfamilien Apiopomatinae mit den Gattungen Waldemaria, Miluna und Hendersonia; — Pseudochatellinae und Helicinae, Gen Sulfurina. Die neuen Arten sind schon früher in den Helicinenstudien aufgestellt.

— 519. Cyclostomacea, von Kobelt. Enthält den (vorläufigen) Schluss von Japonia, die Gattung Theobaldius und den Anfang von Cyclophorus. — Neu Theobaldius deplanatus beddomei t. 71, fig. 1—3; — Th. annulatus nilagiricus t. 71, fig. 9—13; — Zum erstenmal abgebildet sind: Japonia bifimbriata Mlldff. t. 68, fig. 3, 4; — J. quadrasi Mlldff. t. 68, fig. 5—10; — J. macromphala Mlldff. t. 69, fig. 1—5; — J. trochulus olivacea Bttg. t. 69, fig. 9, 10; — J. hypselospira Mlldff. t. 69, fig. 11—13; — J. stenomphala Mlldff. t. 69, fig. 14, 15; — J. rollei Mlldff. p. 554, t. 69, fig. 16—18.

Proceedings of the Malacological Society of London, vol. VII. no. 6, Septbr. 1907.

p. 310. Lang, W. D., on the pairing of *Linnæa pereger* with *Planorbis corneus*.

— 310. Smith, Edg. A., Note on an „Octopus“ with branching arms.

— 310. Cooper, J. E., Holocene Mollusca from Staines.

— 311. Smith, Edg. A., Note on the occurrence of pearls in *Haliotis gigantea* and *Pecten* sp.

— 312. Sykes, E. R., the name Bourcieria. — Wird wegen der gleichnamigen älteren Vogelgattung in *Pseudhelicina* umgetauft.

— 313. Smith, Edg. A., Notes on *Achatina Dennisoni* Reeve and *A. magnifica* Pfr. (fig.).

— 315. Suter, Henry, Review of the New Zealand Aemaeidae, with descriptions of new species and subspecies. — Neu: *A. intermedia* p. 316, t. 27, fig. 6—8; — *roseoradiata* p. 317, t. 27, fig. 9, 10; — *parviconoidea* (nom. nov. für *conoidea* Hutton nec Quoy) var. *leucoma* und var. *nigrostella* n. p. 322, t. 27, fig. 26—29; — *daedala* nom. nov. für *flammea* Hutton nec Quoy t. 27, fig. 30—32; mit subsp. *subtilis* p. 324, t. 27, fig. 33; — *scapha* p. 324, t. 27, fig. 34, 35.

— 327. Eliot, Sir, C. N. E., Nudibranchs from New Zealand and the Falkland Islands, with pl. 28. Neu *Antipella novaezealandica* p.

331; — *Archidoris fulva* p. 336; — *Otenodoris* n. subg. für *Staurodoris pecten* El. und *Doris flabellifera* Cheeseman p. 338; — *Garganiella novazealandica* p. 341; — *Aphelodoris* Cheesemani p. 342; — *Aph. affinis* p. 343; — Von den Falkland-Inseln: *Cratena Valentini* p. 352, t. 28, fig. 4, 5; — *Galvina falklandica* p. 354, t. 28, fig. 7. — *Staurodoris falklandica* p. 356; — *Acanthodoris falklandica* p. 358, t. 28, fig. 8.

— 362. Fulton, Hugh, C., Descriptions of new species of Australian Planispira and Chloritis; neu: *Trachiopsis acuticostata* und *Austrochloritis hedleyi*, beide von Queensland, mit Textfig.

— 364. Fulton, Hugh C., the presence of a double wall in some species of the Diaphora group of Ennea (mit Textfig).

Dall, W. H., *Notes on some Upper Cretaceous Volutidae, with Descriptions of new Species and a Revision of the Groups to which they belong.* — In: Smiths. Miscellan. Coll. quart. Issue, vol. 50, part I, 1907, (No. 1704).

Eine wichtige und hochinteressante Arbeit, welche die Entwicklung des Volutiden-Typus von seinem ersten Auftreten in der oberen Kreide bis zum Miocän, wo er seinen vorläufigen Abschluss gefunden zu haben scheint, vorführt. Das Auftreten erfolgt ziemlich gleichzeitig in Indien, in den ostalpinen Gosau-Schichten, in der Kreide von Aachen, in den Grünsand-Mergeln von New-Jersey, in den Ripley-Schichten der Golf-Staaten, dem Pugnellus-Sandstein in Colorado und den Chico-Schichten in Californien. Die Arbeit ist eines Auszugs leider kaum fähig. Von Interesse ist, dass in der Kreide nur Volutinae auftreten und die Caricellinae erst im Eocän kommen.

Hilbert, Dr. R., *weitere Beiträge zur Preussischen Molluskenfauna.* In: Schriften Phys. oekonom. Ges. Königsberg 1907, vol. 47, p. 155—167, Taf. XXVII.

Die Fauna zählt jetzt 158 Arten und 70 Varietäten. Neu: *Vivipara vivipara elvirae* p. 158, t. 27, fig. 1. Ein Verzeichnis aller bekannter Arten ist beigegeben.

Kobelt, Dr. W., *Rossmuesslers Iconographie, Neue Folge, Bd. XIII. Lfg. 5 und 6.*

Die Schluss-Lieferung des dreizehnten Bandes enthält Pomatias (nach Wagner), die Böttger'schen Minutien aus dem Sarusgenist, die Wagner'schen neuen Hyalinen aus den Südalpen, die Daubebardia nach Wagner und auf 5 Tafeln die seither zu *Xerophila variabilis* gestell-

ten grösseren braunlippigen Xerophilen aus Süditalien und Sizilien von denen die meisten unter *Xerophila peninsularis* Monterosato mss. vereinigt werden. Neu oder zum erstenmal abgebildet sind: *Helicogena speideli* Bttg. fig. 2190; die sämtlichen Wagner'schen *Hyalina* und *Crystallus* (nach Zeichnungen von Wagner); — *Xerolauta peninsularis clitumni* n. Mittelitalien fig. 2215, 2216; — *X. pen. neptunensis* n. Nettuno, fig. 2217; — *X. p. interam-nensis* n., Terni, fig. 2219; — *X. p. virginea* n. Mte. Vergine fig. 2220; — *X. p. alburni* n. Mte. Postiglione, fig. 2221; — *X. p. lauriensis* n., Lauria, fig. 2222–24; — *X. p. sybaritica* n. Ebene von Sybaris, fig. 2225; — *X. p. moranensis* n. Morano, fig. 2225; — *X. p. messapiensis*, Terra d'Otranto fig. 2227 bis 28; — *X. p. sapriensis*, Sapri, fig. 2229; — *X. timei* Mtrs. mss. Taormina, fig. 2230; — *X. grossa* Mtrs. mss. Süd-Sizilien, fig. 2232; — *X. fenecta* Mtrs. Girgenti, fig. 2233; — *X. accusata* Mtrs. mss. Trapani fig. 2234; — *X. variata* var. *regularis* Mtrs. mss. Palermo, fig. 2238.

Eingegangene Zahlungen:

M. Lodder, Launceston, Mk. 6.—; Dr. A. Luther, Helsingfors Mk. 12.—; Kroat. Zool. Landesmuseum, Agram, Mk. 6.—; W. A., Lindholm, Moskau, Mk. 6.—; R. Haygy, Upsala, Mk. 6.—; Dr. E. Hermann, Gelsenkirchen, Mk. 6.—; Professor Dr. Simroth, Mk. 6.—; W. Blume, München, Mk. 6.—; Kreisarzt Dr. Pfeffer, Genthin, Mk. 6.—; K. K. Notar A. Köhler, Hohenelbe, Mk. 6.—; J. Ponsonby, London, Mk. 6.—; H. Schlesch, Kopenhagen, Mk. 6.—; F. Borcharding, Vegesack, Mk. 6.—; C. M. Steenberg, Kopenhagen, Mk. 6.—; Pfarrer Ricklefs, Waddenwarden, Mk. 6.—; C. Schwefel, Küstrin, Mk. 6.—; D. Knipprath, Höchst a. M., Mk. 6.—; C. Pollonera, Turin, Mk. 12.—; Naturwissenschaftl. Museum, Hermannstadt, Mk. 10.—; Erzbischöfl. Seminar u. Obergymnasium, Travnik, Mk. 6.—.

Neue Mitglieder:

Dietrich Knipprath, Höchst a. M.
A. Partz, Hamburg, 22. Flachsland 49.
Erzbischöfl. Seminar u. Obergymnasium, Travnik.

Ausgetreten:

Naturwissenschaftl. Museum, Hermannstadt (Siebenbürgen).
F. Ulrich, Berlin.
Alfred Uhlemann, Leipzig.

Redigiert von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben: 15. Januar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 41-48](#)