

S c h w e d e n .	
Göteborg	Herr Dr. A. W. Malm, Intendant vid Göteborgs Naturhist. Museum.
Orebro	„ Dr. C. Hartmann.
Ronneby	„ Dr. C. Ag. Westerlund.
A m e r i c a .	
New-Bedford U.St. Mass	„ John. H. Thomson, Box 440, Postoffice.
New-Cöln U. St.	„ P. Th. A. Bruhin, verm. Herrn Buchhändler F. Schulthess in Zürich.
Rio Janeiro	„ Dr. H. Nägely.
Cordoba, Republica Argentina	„ Dr. Adolf Döring, Laboratorio quimico de la Universidad de Cordoba.*
A u s t r a l i e n .	
Sydney New-South-Wales	„ Chevalier Gerard Krefft, Curator and Secretary of the Museum.
„ „	„ Dr. James C. Cox, Philipp Street.
C h i n a .	
Peking	„ Dr. O. v. Möllendorf, deutsche Gesandtschaft; Pakete durch d. Buchhandl. von H. Tzschaschel in Görlitz, Schlesien.

 Man bittet um schleunigste Berichtigung etwaiger Irrthümer.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

Drei neue Meeres-Conchylien der norwegischen Fauna.

Vorläufige Mittheilung aus dem conchyliologischen Bericht über die Nordseefahrt
der „Pommerania“ im Sommer 1872
von
W. Dunker und A. Metzger.

Laiochochlis Pommeraniae nov. gen. et spec.

Testa sinistrorsa, acuminato-turrita, unicolor alba, tenuicula, subpellucens, anfractibus XII aequaliter convexis, transversim costatis et liratis, sutura profunda divisus instructa; anfractus embryonales per longitudinem plicati; apertura subrhombica a canaliculo brevi lato et aperto paullulum torto terminata; columella laevis subrecta; labrum internum leviter sulcatum. Long. 22, diam. max. 7 mill.

Tritonofusus (Fusus) Moebii nov. spec.

Testa subovato-fusiformis, undique lactea, epidermide setigera pallide olivacea obducta; anfractus 8 tumidi rotundati, embryonales obtusi, bene aequaliterque spirati, sutura valde incisa subscalati, transversim tenuiterque costulati, lineis incrementi subtilibus undulatis clathrati, ultimus spira satis longior; apertura ovata; columella sinuata; rostrum breve perparum resupinatum; canalis latissimus. — Long. 54, diam. max. 30 mill.

Lathyrus albellus nov. spec.

Testa fusiformis cinerea vel albida, anfractibus senis-septenis modice convexis sutura distincta divisus, per longitudinem plicato-costatis transversimque aequaliter striatis instructa; anfractus ultimus spira paullo longior, anfractus embryonalis submamillatus oblique tortus; apertura oblonga; labrum internum laevigatum; columella torta obsoleteque biplicata; canalis apertus subcurvus. — Long. 18, diam. max. $7\frac{1}{2}$ mill.

Verzeichniss der auf meiner Reise nach dem Rothen Meere in Europa aufgegriffenen Mollusken.

a. Krain, Bahnstation Eisenbrück,

während eines viertelstündigen Aufenthaltes:

Limax (Agriolimax) agrestis L. 2 Exemplare.

Helix (Trichia) Bielzii Ad. Schm.

Helix (Tachea) austriaca Mühlf.

Pupa (Torquilla) frumentum Drap.

Clausilia commutata Rossm.

Clausilia itala G. v. Mart.

Pomatias septemspirale Razoum.

Cyclostoma elegans Müll.

b. Italien, Triest, Campagna Goseletti.

Testacella sp. ? juv.

Ich fand nur ein kleines Exemplar in Gesellschaft von *Amalia marginata* unter faulendem Holzwerk. Das lebende

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Metzger A., Dunker Wilhelm (Guilielmus)
Bernhard

Artikel/Article: [Drei neue Meeres- Conchylien der norwegischen
Fauna. 7-8](#)