

Auch unsere Bibliothek erlauben wir uns bei dieser Gelegenheit unseren Mitgliedern noch einmal dringend ans Herz zu legen. Die neuen Posteinrichtungen in Deutschland erleichtern ihre Benutzung auch den auswärtigen Mitgliedern ausserordentlich und der Gesellschaftssecretär ist gerne bereit, die in derselben enthaltenen Bücher jedem Mitglied auf Verlangen zuzuschicken. Wir bitten nur unsere Mitglieder in diesem Falle einen unterschriebenen Schein mitschicken zu wollen, da ohne diese Einrichtung eine geordnete Bibliothek Einrichtung schwer aufrecht zu erhalten ist. Zugleich bitten wir aber unsere Mitglieder, welche Bücher, Separatabzüge etc., in mehreren Exemplaren besitzen, ihre Doubletten unserer Bibliothek zuweisen zu wollen*).

D. F. Heynemann,
Präsident.

Dr. W. Kobelt,
Secretär.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozologie.

Diagnosen neuer Arten.**)

Argentinische Landschnecken,

(von Dr. Döring im Boletin de la Academia nacional de Cordoba beschrieben).

1. *Agriolimax meridionalis* Döring.

l. c. p. 434.

Animal corpore elongato, laevi, obscuro, superne nigro, fusco vel fusco-griseo; capite nigrescente; tentaculis obscuris, punctis nigricantibus conspersis; pallio supe-

*) Das Verzeichniss der Mitglieder folgt in nächster Nummer.

***) Unter dieser Ueberschrift beabsichtigen wir von jetzt ab die uns zu Gesicht kommenden Beschreibungen neuer Arten zu bringen, welche nicht in den eigentlichen Fachzeitschriften Malacozool. Blätter, Journal de Conchyliologie, Bolletino italiano, Annales belgiques, Proceedings of the London zool. Soc.) enthalten sind; aus diesen werden wir nur die Diagnosen europäischer Arten zum Abdruck bringen. Die Red.

rius verrucis vermiculatis; corpore posteriori breve carinato; solea albescente. Long. max. 30—35, lat. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ Mm.

Concha abscondita ovalis, obliqua, depressa vix convexiuscula, gibbata. Long. $4\frac{1}{2}$ Mm., alt. $\frac{3}{4}$ Mm.

Habitat: Sierra de Cordoba.

2. *Streptaxis (Scolodonta) Sempëri* Döring.

I. c. p. 439.

Testa late umbilicata, depressa, superne planiuscula, basi convexa, tenuis, albido hyalina, diaphana, nitida, perspicue radialiter striatula; spira parum elevata; sutura angusta, profunda; anfractus $4\frac{1}{2}$ rotundati, regulariter accrescentes, ultimus antice nec dilatatus; primus embryonalis laevis, ceteri eleganter oblique transversim striatuli; ultimus antice non descendens; apertura rotundato-semilunaris, subobliqua. Peristoma simplex acutum, margine supero paulum dilatato, columellari arcuato, marginibus conniventibus. Umbilicus latus, pervius. — Diam. max. 3, min. 2,6, alt. 1,5 Mm.

Hab. Sierra de Cordoba et S. de Mendoza.

3. *Helix (Aglaja) Yocotulana* Döring.

I. c. p. 446.

Testa mediocriter umbilicata, solidula, valde depressa, sublaevigata, nitidula, minutim striata, albido calcarea vel flavescens, rufo-unifasciata; spira vix elevata, planiuscula; sutura profunda; anfr. $4\frac{1}{2}$ depressiusculi, superi albidi vel fuscolutei, ultimus antice mediocriter descendens, subtus pellucide calcareus, supra peripheriam anguste rufo-unifasciatus; apertura rotundato-lunata; peristoma undique expanso-reflexum, labiatum, subincrassatum, ad columellam dilatatum, breviter subangulatim reflexum. Diam. maj. 20—22, min. 16—18, alt. 9—10 Mm.

Hab. Sierra de Belen, Catamarca.

4. *Helix (Epiphragmophora) Hieronymi* Döring.

l. c. p. 447.

Testa late umbilicata, subcalcareo, parum nitidiuscula, saepius pallide rufo-unifasciata; convexiuscula, depressa; sutura profunda; anfr. $4\frac{1}{2}$ —5 convexi, ultimus vix depressiusculus, antice paulum descendens; apertura lunato-ovalis, subcircularis; peristoma subsimplex, acutiusculum, expansum, intus leviter albido-labiosum, marginibus approximatis, columellari subarcuatim reflexiusculo. Diam. maj. 18—20, min. 15—17, alt. 8—10 Mm.

Hab. Quebrada del Tala, Catamarca.

5. *Bulimus (Odontostomus) multiplicatus* Döring.

l. c. p. 452.

Testa profunde rimata, ovato-oblonga, confertim regulariter striata, solidula, opaca; spira elongata, apice attenuato-acuta; anfractus 7 vix convexiusculi, ultimus vix $\frac{2}{5}$ longitudinis aequans, basi vix subcristatus; apertura subverticalis, ovata, dentibus 8—10 fere clausa; dentibus 3 crassis primo angulato, tortuoso; sulcato in pariete aperturali; secundo linguaeformi, excavato in columella; tertio tortuoso in margine dextro; 3—5 minutis in parte basali, 2 obsoletis in parte supera marginis dextri; plica transversa in fundo aperturae; peristoma subincrassatum, labiatum expansum, reflexiusculum; marginibus callo tenui junctis, dextro superne subangulato. — Long. 27, diam. 10 Mm.; apertura cum peristomate $10\frac{1}{2}$ Mm. longa, 8 lata.

Hab. Cerro de Chepe, Prov. de la Rioja.

6. *Bulimus (Odontostomus) Olainensis* Döring.

l. c. p. 454.

Testa rimata, fusiformi-turrita, corneo-albida, sericea, subdiaphana, minutissime striata; spira obtusa; anfractus

9 convexiusculi, primi sublaevigati, caeteri confertim subtilissime striati; ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans, latere depressus, profunde scrobiculatus; apertura irregularis, pentagonalis, basi angustata, truncata, dentibus 5 coarctata; dente quinto dilatato in margine dextro. Long. 12, diam. $3\frac{2}{3}$ Mm., apertura cum peristomate $3\frac{1}{2}$ Mm. longa, $2\frac{1}{2}$ lata.

Hab. Pampa di Olain, Sierra de Cordoba.

7. *Bulimus (Odontostomus) Riojanus* Döring.

l. c. p. 454.

Testa rimato-perforato, fusiformis, sublaevigata, cinereo-albida, punctis maculisque pellucide cinereo-corneis conspersa, confertim rugoso-striata, maculisque cinereo-corneis aliquot ornata: anfractus 9 convexiusculi, primi cinereo-fusci costuloso-striati, caeteri maculati; ultimus $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ longitudinis adaequans; peristoma album, labiosum. Long. 19—20, lat. 6 Mm., apertura cum peristomate $5\frac{1}{2}$ Mm. longa, 4 Mm. lata.

Hab. Sierra de la Roja.

8. *Bulimus (Odontostomus) subsexdentatus* Döring.

l. c. p. 454.

Testa profunde rimata, fusiformis, ventricosa, crassa, opaca, calcareo-albida, ruguloso striata; anfractus 10 vix convexiusculi, primi saepius albido-cornei; ultimus $\frac{1}{3}$ longitudinis subaequans, peristoma labiosum. Long. $23\frac{1}{2}$, diam. 8 Mm.; apertura cum peristomate 8 Mm. longa, 4 lata.

Var. major, ventrosa, saepius dente sexto in margine dextro. Long. 27, lat. 9 Mm.

Hab. Sierra de Cordoba.

9. *Bulimus (Odontostomus) Martensii* Döring.

l. c. p. 455.

Testa fusiformis, ventricosa, cinereo-fusca, confertim costulato-striata, lineis impressis spiralibus, minutis

subdecussata; maculis longitudinalibus irregularibus distantibus fusco-corneis variegata; spira ventricosoturrita, apice attenuato, acutiusculo; anfractus 8 convexiusculi, ultimus $\frac{2}{5}$ longitudinis aequans; peristoma vix incrassatum, marginibus callo tenui junctis. Long. 19, diam. $7\frac{1}{3}$ Mm.; apertura $6\frac{2}{3}$ Mm. longa, $4\frac{1}{2}$ lata.

Hab. Totoral (Prov. Córdoba).

10. *Bulimus (Odontostomus) maculosus* Döring.

l. c. p. 455.

Testa cylindraceo-fusiformis, tenuis, confertim ruguloso-striata, corneo-fusca, striis albidis compositis irregularibus strigatim maculosa; spira elongato-turrita, obtusiuscula; anfractus 10 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans; peristoma acutum. Long. 18—20, diam. $4\frac{1}{2}$ —5 Mm.; apertura cum peristomate $4\frac{1}{2}$ Mm. longa, $3\frac{1}{3}$ lata.

Hab. Sierra de Cordoba.

11. *Bulimus (Odontostomus) profundidens* Döring.

l. c. p. 455.

Testa fusiformis, cylindracea, gracilis, non nitens, cinereo-ochracea, saepius maculis pellucido-corneis, obsoletis bistrigatim variegata, confertissime ruguloso-striata vel minutissime costulata; spira turrita, obtusiuscula; anfractus 9 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans. Peristoma acutum. — Long. 15, lat. $3\frac{2}{3}$ Mm., apertura cum peristomate 4 Mm. longa, $2\frac{2}{3}$ —3 Mm. lata.

Hab. Sierra de Achata, Córdoba.

12. *Bulimus (Odontostomus) tumulorum* Döring.

l. c. p. 456.

Testa cylindraceo-fusiformis, pumila, solidula, sublaevigata, vix nitidula, albida, pellucido-corneo variegata; spira

fusiformi-turrita, obtusiuscula; anfractus 9 vix convexiusculi, primi luteo cornei, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans. — Dentes aperturæ incrassati. Peristoma crassum. Long. 12—13, diam. $3\frac{2}{3}$ —4 Mm., apertura cum peristomate $3\frac{1}{2}$ Mm. longa, $3\frac{2}{3}$ lata.

Hab. Sierra de Cordoba.

13. *Bulimus (Odontostomus) Pucaranus* Döring.

l. c. p. 456.

Testa cylindraceo-fusiformis, fusco-cornea, vix nitidula, minutim striata, plerumque striis albidis, interruptis, irregularibus subvariegata; spira fusiformis turrita, apice obtusiuscula; anfractus 9 vix convexiusculi, ultimus $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans; peristoma album crassum, marginibus callo compresso junctis. Long. 13—14, diam. $3\frac{1}{2}$ —4 Mm., apertura cum peristomate $3\frac{1}{2}$ Mm. longa, $2\frac{3}{4}$ lata.

Hab. Valle del Rio Primera (Cordoba).

14. *Bulimus (Odontostomus) Philippii* Döring.

l. c. p. 456.

Testa fusiformi-cylindracea, gracilis, solidula, opaca, cinerea-lutea, confertim albido costulata; spira elongato-turrita, obtusiuscula; anfractus $10\frac{1}{2}$ vix convexiusculi; ultimus vix $\frac{1}{4}$ longitudinis aequans, antice pallescens; peristoma album, incrassatum, marginibus callo compresso junctis. Long. 17—19, diam. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ Mm.; apertura cum peristomate 4 Mm. longa, $3\frac{1}{2}$ lata.

Hab. circa Totoral (Cordoba).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Döring Adolf

Artikel/Article: [Argentinische Landschnecken 3-8](#)