© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog
der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

N. B. Die Preise in Reichsmark per Stück.

Helix	ℳ
advena, Webb. Cap verd. I. à 0,25 bis	0,40
aemula, Rossm. Trentino	0,30
Ammonis, A. Schm. Solferino	0,15
„ var. Mantua	0,30
dictyodes Pfr. Neu-Caledonia	0,90
candida, Porro. Verona	0,25
candidescens, Ziegl. „	0,25
cantiana, var. da Campo, Villa Lombardei	0,30
cincta, Müll. v. minor. Solferino	0,25
cingulina, Strob. Mantua	0,30
cingulata, Stud. v. anaunien-sis, de Betta. Ob.-Italien	0,30
colubrina, Jan. „	0,25
inaequalis, Pfr. Neu-Caledon.	0,60
Gobanzii, Frfld. Trentino, Ob.-It.	0,60
Hermesiana, Pini. Bergamo	0,50
hirsuta, Say. Wisconsin, V.-St.	0,20
Martensiana, Tiberi. Apennin	0,40
microdonta, Redf. Bermuda	0,30
multifasciata, Weinl. & Ma. Bahamas. etw. def.	1,50
roseotincta, Forbes. Algier	0,25
striata, Drap. Verona	0,25
secernenda, Rssm. Dalmatia	0,30
tigrina, Jan. Bergamo	0,40
Omphalotropis in ca. 10 meist bestimmten Species. Südsee-Inseln	0,25

Bulimus	ℳ
Kelletti, Rve. Ecuador	12
Fungairinoi, Hidalgo. „	8
Saturnus, Pfr. „	6
Hartwegi Pfr. „	3
Thompsoni Pfr. 2 bis	3
„ varietas.	3,50
porphyrostomus Pfr. Neu-Caledonien	2
graecus, Beck Morea	0,30
reversalis, Biels. var. venera-bilis, Parr. Siebenbürgen	0,20
Zebra, Olivier. Nauplia	0,20
Pomatias	
tesselatum, Rossm. Corfu	0,25
Henrici, Strobel. Trentino	0,25
Canestrinii, Adami. n. sp. Ob.-Italia	0,65
patulum, Drp. Kärnthen	0,10
Carychium	
tridentatum, Risso. Mantua	0,15
Clausilia	
Bielzii, Parr. Siebenbürgen	0,20
cincta, Brumati. Kärnthen	0,20
critica, Bielz. Siebenbürgen	0,20
costulata, Jan. Comasco	0,40
dacica, Friv. Bosnien	0,20
exarata, Ziegl. Dalmat.	0,20
exoptata, A. Schm. Ob.-Ital.	0,35
Fussiana, Bielz. Siebenbürgen	0,30
gracilis, Rossm. Baden	0,20
grisea, Desh. Nauplia	0,20
interrupta, Ziegl. Kärnthen	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk
leucostigma, Ziegl. Abruzzo	0,20
Kephissiae, Roth. Mt. Parnass	0,30
Lischkeana, Parr. Siebenb.	0,20
macarana, Ziegl. Dalmatien	0,20
parvula, Stud. Baden	0,10
patula, Charp. Acropolis	0,30
plumbea, Rossm. Siebenb.	0,20
„ var. cornea „	0,20
Reiniana, Kob. nov. sp. Japan	3
satura, Ziegl. Dalmatien	0,20
solida, Drp. Pisa	0,10
Sordellii, Adami. n. sp. Brescia	0,60
Strobeli, Porro. Comasco	0,40
Stabilei, Charp. Bergamo	0,40
sulcosa, Ziegl. Dalmatien	0,10
straminicollis, Parr. Siebenb.	0,20
Baleo-Clausilia	
livida, Mnke. Siebenbürgen	0,20
Haueri, Bielz. „	0,30
Pupa	
Brondelii, Brug. Algier	0,15
Bergamensis, Charp. Bergamo	0,10
Caprearum, Phil. Calabrien	0,15
cinerea, Phil. Brescia	0,15
Ferrari, Porro. Edolo	0,25
frumentum, Drp. var. Italien	0,10
iostoma Pfr. Portorico	0,25
Martensii, Weinl. Bahamas	2
pagodula, Desm. Edolo	0,30
Weinlandi Kurr. Baham. gute	2,50
Desgleichen etwas defect	1
dilucida, Ziegl. Ob.-Italien	0,10
Philippii Cantr. Athen	0,15
truncatella, Lm. Kärnthen	0,10
Vertigo Venetzii, Chrp. Mant.	0,10
„ ventrosa, Heynem. Holstein	0,20

	Mk
Gonospira fusus, Lam. Mauritius	1
Vitrina	
elongata, Drp. Mantua	0,25
Cionella.	
Salleana, Pfr. Hayti	0,30
Stenogyra.	
octona, var. L. Hayti	0,20
Cylindrella.	
arcuata, Weinl. & Ma. Hayti	1
suturalis „ „	0,80
Weinlandi, Pfr. „	0,80
obesa, Weinl. & Ma. „	1,20
Cyclostoma.	
Emilianum, Weinl. Hayti	0,45
Habichii, „ „	1,50
Rollei, „ „	0,20
umbricola „ „	0,40
semilabre, Lam. Bahamas	0,75
Helicina.	
calida, Weinl. Bahamas	0,20
rugosa, Pfr. Hayti	0,35
Alcadia.	
mammilla, Weinl. Hayti	0,75
Bithynia.	
Lacheineri, Charp. O.-Italien	0,15
Neritina.	
aquatilis, Rve. N.-Caledonien	0,50
brevispina, Lam. N.-Guinea	0,20
Chimmoi, N.-Caledonia	0,70
nucleus, Morelet, „	0,25
serratilineata, Ziegl., Mantua	0,15
trifasciata, Mnke. „	0,15
aequinoctialis, Morelet. Prinzen-I.	0,20

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.
Physa.	
hypnorum, L. Mantua	0,10
Ancylus.	
capuloides, Jan. Graecia	0,25
Melania.	
Arthurii, Brd. N.-Caledonia	0.40
Lamberti, Crosse. „	0,50
villosa, Phil. „	0,60
Foremanni, Lea. Coosa Riv.	0,30
Haysiana „ „	0,30
rubiginosa „ „	0,30
Melanopsis.	
Dufourei v. Graellsi, Rossm. Valencia.	0,15
Melampus.	
Montrouzieri, G. N.-Caled.	0,40
Adamsii, Gass. „	0,30
Alasmodonta.	
Bonelli, Fér. Mantua	0,60
Mycetopus n. sp.? Ecuador	1,75
Anodonta n. sp.? „	2,50
Unio.	
corrosus, Villa. Lago di Iseo	0, 0
Spinelli, „ „ Idro	0,60
sinuatus, Lam. Mantua	1,50
Verreauxiana, Lea. Cap. g. H.	1
Dahuricus, Midd. Japan	2
Conus.	
acuminatus, Brug. Mare rubr.	0,50
„ var. grossa. „	2
„ v. unicolor. „	3
arenatus, Brug. kleine. „	0,20
arenatus, Brug. grosse. „	0,40
bandanus, Brug. Philippinen.	1-1,50
capitaneus, L. Philippinen	1-1,50
classiarius, Brug. M. rubr.	0,60—1
columba, Hwass. W.-Indien	0,10-0,25
Deshayesi, Reeve. Mare rubr.	2
distans, Hws. Tahiti	1,50
erythræensis, Beck. Mare rubr.	0,60
flavidus, Lam. Tahiti	0,30-0,50
gladiator, Brod. Panama	0,75
gubernator v. terminus, Lam. Iud. Oc.	1-2
imperialis, L. Tahiti	1,50
literatus, L. Pacific	1-2
lividus, Brug. „	0,30-0,50
magus, Lam. & var. Ind. Ocean	0,40-1
mediterraneus, Brug. M. med. & Senegal	0,30-0,50
mus, Hwass. W. Indien	0,40
nemocanus, Hws. Ind. Oc.	0,80-1,30
nocturnus, Hws. Molukken	1,50-2,50
obesus, Brug. Ind. Oc.	0,80-1,20
paniculus, Lam. Borneo	0,25
planorbis, Born. Pacific	0,50-0,75
pulicarius. Hws. Molukken	0,50-0,90
pygmaeus, Rve. Mexico	0,40
pyriformis, Rve. W. Columbia	2-3
quercinus, Hws. Ind. Oc.	0,30-0,80
radiatus, Gmel. Viti-I.	0,60-0,75
sponsalis, Chm. Tahiti	0,70-1
striatus, L. „	0,60-1,20
tahitensis Hws. v. rattus Lam.	1-1,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		Mk
tesselatus, Born.	Ind. Oc.	0,50-0,80
textile, Lam.	Pacific	0,50-1
verrucosus, Hws.	Atlant. Ocean	0,10-0,30
virgo, Rve.	Ind. Oc.	0,40-1
vitulinus, Hws.	„	0,50-0,80
Oliva.		
elegans, Lam.	Viti-I.	0,30
flammata, Lam.	Tahiti	0,40
luteola, Lam.	Viti-I.	0,35
ventricosa,	„	0,35
Cypraea.		
annulus, L.	Ind. Oc.	5-10
arabica L.	„	0,40
arenosa, Gray.	Anaa-I.	1
argus, L.	Ind. Oc.	0,50-1
atomaria, Gmel.	Pacific	0,60
caput serpentis, L.	„	0,30
camelopardalis, Perry.	M. rubr.	0,50-1
carneola, L.	Pacific	0,30-0,50
cicercula, L.	Anaa-I.	0,20-0,60
clandestina, L.	Viti-I.	0,40
eburnea, Born.	Pacific	3
erones, L.,	„	0,20
erosa, L.	„	0,40
exanthema, L.	Panama	0,50-1
helvola L.	Pacific	0,10
intermedia, Rve.	„	0,80
isabella, L.	Mauritius	0,15-0,25
lurida, L.	M. medit.	0,20
lynx. L.	Ind. Oc.	0,10-0,20
moneta, L.	„	0,5-0,10
pantherina, Solan.	„	0,40-1
poraria, L.	Südsee	0,20
punctata, Gray.	Panama	0,60
pustulata, L.	„	0,50
reticulata, Mart.	Pacific	0,50

		Mk
spurca, L.	W. Indien	0,50
staphylea, L.	Ind. Oc.	0,20
scurra, Chm.	Pacific	0,80-1
talpa, L.	„	0,60
tigris, L.	„	1
turdus, L.	Mar. rubr.	0,20
undata, Sol.	Ind. Oc.	0,45
ventriculus, L.	Austral.	0,60-0,80
ziczac, L.	Ind. Oc.	0,10-0,20
Trivia.		
coccinella, Lam.		0,5
cicercula, L.	Tahiti	0,50
pediculus, L.,	Antillen	0,10
suffusa, Gray.	„	0,10
nucleus, L.	Tahiti	0,40
Mitra.		
ambigua, Swain.	Viti-I.	0,50
„ „ major.	Viti-I.	1,50
cardinalis, Meus.	Tahiti	1,50
chrysalis, Rve.	Samoa-I.	0,40
dactylus, L.	Tahiti	1,50
exasperata, Chm.	Viti-I.	0,80
filosa, Lm. & var.	Viti-I. u. Tahiti	0,80
literata L.	Viti-I.	0,80
nodosa, Swains.	Tahiti	0,70
pacifica, Rve.	Soc.-Ins.	0,45
paupercula, L.	Viti-I.	0,75
pontificalis, L.	Tahiti	0,80
rubitincta, Rve.	„	0,75
semifasciata, L.	Viti-I.	0,60
serpentina, L.	„	0,75
sphaerulata, Mart.	Tahiti	1,50
turgida, Rve.	Samoa-I.	0,50
vulpecula, L.	Viti-I.	0,80

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

		ℳ
Neptunea.		
lirata, Mart. etw. besch.	Alaska	3
Tritonium.		
oregonense, Redf.	Alaska	1-3
Nassa.		
bicolor, Homb.	Samoa-I.	0,40
granifera, Kien.	Tahiti	0,25
pauperata, L.	Viti-I.	0,25
Ranella.		
bufonia, Gm.	Tahiti	1,50
gyrinus, L.	Ind. Oc.	0,50
Terebra.		
affinis, Gray.	Tahiti	0,40
Natica.		
albumen, L.	Viti-I.	0,40
lactea, Sow.	„	0,40
melanostoma, Gmel.	„	0,25
Sistrum.		
nassoides, Qu. & Gaim.	Cooks-I.	0,25
Columbella.		
festiva Kien.	Viti-I.	0,25
margarita, Rve.	Tahiti	0,20
micans,	Cooks-I.	0,20
turturina. L.	Viti-I.	0,30
Turbo.		
margaritaceus, L.	Viti-I.	0,50
chrysostomus, L.		0,70
Collonia		
costulata, Dkr.	Samoa-I.	0,25
Stella.		
confragosa, Gould.	Tahiti	1,50
asperata, Lm.		0,80
n. sp.?	Cooks-I.	1
Polydonta.		
granosa Lm.	Viti-I.	0,60
verrucosa, Gmel.		0,70
fenestrata, Gmel.	Samoa-I.	0,50
Architectonica.		
perspectiva, L.	Tahiti	1
Bulla.		
australis Q. & G.	Viti-I.	0,75
naucum, L.	„	0,60
cylindrica, L.	„	0,75
ampulla, L.	„	0,50
Truncatella.		
Vitiensis, Gould.	Viti-I.	0,20
semicostata, Mouss.	„	0,25
acusticostata	„ Pameosa-I.	0,20
granum, Gould.	Viti-I.	0,20
Venus.		
indica, Hanley.	Viti-I.	0,50
puerpera, L.	„	1,50
Tellina.		
clathrata, Q. & G.	Huahni-I.	0,20
rugosa, Born.	Tahiti	0,70
jubar, Hanley.	„	0,80
scobinata, Desh.	„	1,50
Cardium.		
unedo, L.	Viti-I.	1-1,50
Cardita.		
variegata, Brug.	Samoa-I.	0,75
Anapa.		
triquetra, Hanl.	Viti-I.	0,50
Rocellaria.		
lamellosa, Desh.	Viti-I.	0,50
Tectura.		
cassis, Esch.	Alaska	0,30-0,40
patina, „	„	0,30-0,50
digitalis, Esch.	„	0,30-0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eine bedeutende Sammlung englischer und irländischer Conchylien zum Verkauf erhalten, unter denen folgende hervorhebe:

Pisidium Henslowianum, Shep. England	Mk	0,30
ferner Pisidium fontinale und var. cinerea; pusillum und var. obtusalis; nitidum u. var. globosa.		
Hydrobia similis, Drp. u. var. alba. Themse-Gräben .		0,30—0,50
„ ventrosa, Mont. „ .		0,5
Planorbis nitidus, Müll. u. var. riparius; Pl. lineatus, Walker.		
Planorbis albus u. var. Draparnaldi, Shepp. etc. etc. .		0,5—0,20
„ dilatatus, Gould. Manchester neu		0,40
Sphaerium pallidum, Gray. „		0,40
„ corneum L. var. pisidioides, Gray. Manchester		0,20
Limnea involuta, Thomps. Irland		0,20—0,50
Limax flavus, L. (Schale) England		0,30—0,40
Testacella haliotidea, Drp. (Schale) England		0,60
„ Maugei, Fér. „ „		0,50
Hyalina alliaria, Mill. „		0,30
„ excavata, Blan. „		0,90
Helix fusca, Mont. „		1,00

„ concinna, Jeff. und die meisten englischen Helices, wie auch übrigen Land- und Süsswasser-Conchylien.

Eine bedeutende Anzahl irländischer und englischer See-Conchylien, unter denen nur folgende nenne:

Galeomma Turtoni; Loripes lacteus; Lucina spinifera maxima; Diplodonta rotundata; Tellina squalida; Thracia convexa; Teredo megotara und malleolus nebst einer grossen Anzahl Gastropoden. Auf eine vollständige Auswahl der vorräthigen englischen Land-, Süsswasser- oder Meeres-Conchylien, oder aller drei Sorten, wird ein Sconto für baar von 25% bewilligt. *T. A. Verkrüzen.*

Gesellschafts-Angelegenheiten.

Neue Mitglieder:

Herr *W. Puppe* in **Szczakowa**, Schlesien.

„ *N. Besselich* in **Trier**.

„ *J. G. Anthony*, Esqu. in **Cambridge**, Mass., Museum of Comp. Zool.

„ *H. Vendryes* Esq. Solicitor in **Kingston**, Jamaica.

„ *Lehmann*, Schulrath in **Offenburg**, Baden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: Tausch-Catalog 9-14