

## Mittheilungen aus dem Gebiete der Malakozoologie.

### Malakologische Fauna der gräfl. Egger'schen Herrschaft St. Georgen am Längsee.

Von Dr. S. Ressmann.

Die Herrschaft St. Georgen am Längsee, gegenwärtig im Besitz des Herrn Grafen Gustav von Egger befindlich, umschliesst in einem Gebiet von etwa 15 Quadratkilometer soviel interessante Conchylienarten, dass deren Zusammenstellung wohl von Interesse sein dürfte. Die in der Aufzählung genannten Fundorte sind: der Magdalensberg bei Hochosterwitz, 1130 Meter hoch, Urschiefer; — der Odwinskogel bei St. Georgen, 819 Meter hoch, Uebergangskalk, das Kreiger Schlösschen, 830 Meter hoch, Urschiefer, Liebenfels, 748 Meter auf Urschiefer, Treibach, 682 Meter auf Kreidemergel und Rosenbichl, 622 Meter auf Urschiefer.

Die von mir seit vielen Jahren daselbst aufgefundenen Arten sind:

*Vitrina elongata* Drap. Magdalensberg.

— *pellucida* Müll. St. Georgen.

— *diaphana* Drap. "

*Hyalina cellaria* Müll. St. Georgen, Magdalensberg.

— *nitens* Mich. St. Georgen, Polling, Rothenstein.

— *nitidula* Drap. St. Georgen.

— *crystallina* Müll. "

*Hyalina hyalina* Fér. Magdalensberg.

— *nitidosa* Fér. St. Georgen, Magdalensberg.

— *fulva* Müll. "

*Zonites verticillus* Fér. Magdalensberg, Monsberg.

*Helix rupestris* Drap. Ueberall häufig.

— *pygmaea* Drap. St. Georgen.

— *rotundata* Müll. Ueberall.

— *ruderata* Stud. Treibach.

- Helix solaria* Menke. Magdalensberg, Hochosterwitz.  
— *obvoluta* Müll.  
— *holoserica* Stud. St. Georgen, Hochosterwitz.  
— *personata* Lam. "  
— *unidentata* Drap. Magdalensberg, Treibach.  
— *edentula* Drap. Monsberg.  
— *leucozona* Ziegl. Treibach.  
— *hispida* L. St. Georgen.  
— *sericea* Drp. St. Georgen, Launsdorf.  
— *strigella* Drp. St. Georgen, Stadelhoff.  
— *fruticum* Müll. Magdalensberg.  
— *incarnata* Müll. Häufig.  
— *umbrosa* Partsch. Oellach.  
— *pulchella* Müll. St. Georgen.  
— *costata* Müll. St. Georgen, Fresendorf, Rothenstein.  
— *aculeata* Müll. Treibach.  
— *obvia* Hartm., St. Georgen.  
— *planospira* Lam. Magdalensberg, Kreigerschlösser.  
— *foetens* C. Pfr. Kreigerschlösser, Triesach.  
— *arbustum* L. Häufig.  
    var. *alpestris* Ziegl. Gurkbrücke bei Treibach.  
— *austriaca* Mühlf. St. Georgen.  
— *nemoralis* L. Häufig.  
— *pomatia* L. Ueberall.
- Bulimus montanus* Drap. St. Georgen, Magdalensberg,  
Kreigerschlösser.  
— *obscurus* Drap. Häufig.  
— *tridens* Müll. Magdalensberg, Rosenbichl.
- Cionella lubrica* Müll. Gemein.  
— *nitens* Kokeil. St. Georgen.  
— *acicula* Müll. Hochosterwitz.
- Pupa frumentum* Drap. Häufig.  
— *dolum* Mich. Gemein.  
— *gularis* Rossm. Rothenstein, Magdalensberg.

Pupa doliolum Brug. Magdalensberg.

- truncatella Pfr. Häufig.
- pagodula Desm. Magdalensberg, St. Georgen, Rothenstein.
- muscorum L. Magdalensberg, St. Georgen.
- minutissima Hartm., St. Georgen.

Vertigo laevigata Kokeil (ventrosa Heyn.) St. Georgen.

- antivertigo Drp. St. Georgen.
- pygmaea Drp. "
- pusilla Müll. "
- angustior Jeffr. "

Clausilia laminata Mtg. Ueberall.

- ungulata Zgl. Kreigerschlösser.
- fimbriata Zgl., " Magdalensberg.
- cerata Rossm. Hochosterwitz.
- ventricosa Drp. Launsdorf, St. Georgen, Oellach.
- densestriata Zgl. Hochosterwitz, Kreigerschlösser.
- plicatula Drp. Gemein.
- Eggeri Ffld. Magdalensberg.
- attenuata Zgl. Hochosterwitz.
- mucida Zgl. Magdalensberg, St. Georgen.
- parvula Stud. Kreigerschlösser.
- filograna Zieg. Häufig.

Balea fragilis Drp. Liebenfels, Hochosterwitz.

Carychium minimum Müll. Gemein.

Acme lineata Drp. St. Georgen.

Pomatias maculatum Drp. Häufig.

Succinea putris L. Häufig.

- bullina Fér. Simming-Weiher.
- Pfeifferi Rossm. Launsdorf, Simmning.

Limnaea palustris Müll. Thalsdorf.

- fusca Pfr. Nadelhoff.
- peregra Müll. Gemein.
- truncatula Müll. St. Georgen.

— 90 —

- Limnaea auricularia* Drp. St. Georgen.  
— *vulgaris* C. Pfr. Launsdorf.  
*Physa hypnorum* L. Nadelhoff.  
*Planorbis marginatus* Drp. St. Georgen, Nadelhoff.  
— *albus* Müll. St. Georgen, Rosenbichl.  
— *spirorbis* Müll. Nadelhoff,      "  
— *contortus* Müll.      "      "  
— *nitidus* Müll.      "      "  
*Ancylus fluviatilis* Müll. Simming.  
— *lacustris* Drp. Oellach.  
*Paludina vivipara* Drp. St. Georgen.  
*Bithynia tentaculata* L.      "  
*Hydrobia viridula* Kok. Simming.  
*Valvata piscinalis* Müll. St. Georgen.  
— *contorta* Menke.      "  
*Anodonta cellensis* Schr.      "  
— *latissima* Kokeil.      "  
*Cyclas cornea* Drp. Treibach. Gurk.  
*Pisidium fontinale* C. Pfr. Treibach, Rosenbichl, Gurk,  
Simming.
- 

Eine neue transcaucasische Clausilia.

*Clausilia acrolepta* sp. n.

Testa breviter rimata, ventricose fusiformis, confertim striatula, subsericea, flavidofusca; spira valde attenuata, prope apicem gracilis; anfr. 11, primi tres subaequales, laeves, sequentes convexiusculi, sutura simplici sat profunda divisi, penultimus ventricosus, ultimus distanter ruguloso costulatus, basi leviter bigibbosus, gibbere inferiore subcristaeformi; apertura parva, late piriformis, peristoma continuum, breviter solutum, vix expansum, crassiusculum, flavido-album; lamella superior et inferior parvae, illa marginem attingens; lunella conspicua;

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Ressmann S.

Artikel/Article: [Malakologische Fauna der gräfl. Egger'schen Herrschaft St. Georgen am Längsee, 87-90](#)