

Chlorkalk und Salzsäure man nehmen darf; man fange mit wenig an, zumal von letzterer. Wer es liebt, kann, wenn trocken, noch mit feiner Lammswolle, die unbedeutend mit feinem Oel benetzt ist, abreiben. Bei zarten Individuen und wo die Epidermis erhalten werden soll, nehme man sich mit jeder Behandlung in Acht.

T. A. Verkrüzen,

Neue Mainzer Strasse 6, Frankfurt a. M.

Literaturbericht.

Journal de Conchybiologie. 1876. Nr. 3.

- p. 217. *Watson, Rev. R. B.*, Note sur les coquilles terrestres communes a Madère et à d'autres contrées, considérées au point de vue de la distribution géographique.

Der Autor nimmt die Zahl der bekannten Arten nach Ausscheidung der zweifelhaften und der Strandbewohner mit 176 an, von denen 146 der Inselgruppe eigenthümlich sind, während nur 33 auch an andern Punkten vorkommen. Diese sind alle weitverbreitete Europäer mit Ausnahme von *Vitrina Teneriffae*, welche auch auf den Canaren vorkommt, *Helix armillata* Lowe und *paupercula* Lowe, welche mit den Azoren gemeinsam sind.

- p. 232. *Fischer, P.*, Description d'un nouveau genre de Coquille des mers de la Chine (*Hoplopteron*, verwandt mit *Scalaria*).
- p. 236. — —, Descriptions d'espèces nouvelles de l'Afrique occidentale (*Murex hoplites*, *Arca despecta* [*Moussole* Adans.], *A. Bouvieri*).
- p. 240. *Morlet, A.*, Notes sur quelques Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Alsace.
- p. 242. *Lataste, F.*, sur des tronçatures successives d'un *Helix aspersa* en forme de corne d'abondance.
- p. 247. *Tribolet, M. de*, Note sur le genre *Posidonomya*, et en particulier sur les *P. alpina* Gras et *P. ornati* Quenst., suivie d'une liste des *Posidonomyes* jurassiques.
- p. 257. *Fischer, P.*, Note sur les Coquilles des Chotts du Nord de l'Afrique. Es werden *Cardium edule*, *Melania tuberculata* und *Melanopsis cariosa* genannt, doch ist aus dem Texte nicht mit Bestimmtheit ersichtlich, ob *C. edule* im Schott el Melrir wirklich noch lebt.

Martini-Chemnitz Conchyliencabinet. Neue Auflage.

Lfg. 250. *Pleurotoma* von H. C. Weinkauff. Neu: *Clavus Dunkeri*, *Drillia Schillingi*, *Surgula radulaeformis*, *Drillia Appellii*, *Clavus polygonalis*, *Crassispira cinerea*.

Lfg. 251. *Turbinella* und *Fasciolaria*, von Kobelt (Schluss).

Küster, H. C., Die Binnenconchylien Dalmatiens mit Zuziehung der Faunen von Triest, Istrien und Montenegro. III. Die Gattung *Clausilia*. Separatabdruck aus dem X. Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg.

Leider unvollendet geblieben, liegt uns jetzt Küster's letzte Arbeit vor und es wird sich nicht leicht Jemand finden, der sie im Geiste ihres Verfassers weiter führt.*) Wir werden über sie und die zahlreichen neu aufgestellten Arten im Jahrbuch eingehender berichten.

Clessin, S., *Deutsche Excursionsmolluskenfauna.* Lfg. 2.

Enthält die Xerophilen, *Arionta*, *Tachea* und *Pomatia*, *Buliminus*, *Cionella*, *Pupa* mit zwei neuen Untergruppen *Edentulina* und *Pagodulina*, *Clausilia* und *Succinea*.

Rossmässler's Iconographie. fortgesetzt von Kobelt. Band IV. Lfg. 2—4, mit 15 Tafeln.

Enthält ausschliesslich *Helices* und nächst Verwandte. Abgebildet werden: Taf. 96 fig. 1003—11 und Taf. 97 fig. 1012—15 *Helix desertorum* und ihre Varietäten; 1016—17 *Hel. turcica*, 1018—21 *Hel. mograbina* und *mogadorensis*. — Taf. 98 *Hel. lucorum*. — Taf. 99 fig. 1028, 19 *Hel. Buchii*, fig. 1030, 31 *Hel. pachya*, 1032, 33 *Hel. solida*. — Taf. 100 fig. 1034, 35 *Hel. anctostoma*, 1036 *Hel. melanostoma*, 1037, 1040—43 *Hel. ligata* var., 1038, 39 *Hel. figulina* var. — Taf. 101 fig. 1044 *Hel. engaddensis*, 1045 *Hel. prasinata*, 1046 *Hel. cavata*, 1047, 48 *Hel. Nordmanni*, 1049 *Hel. tristis*. — Taf. 102 fig. 1050—52 *Hel. foetens*, 1053 *Hel. Argentellei*, 1054 *Hel. Kollari*. — Taf. 103 fig. 1055—59 *Hel. planospira*. — Taf. 104 fig. 1060 *Hel. setosula*, 1061 *Hel. schlaerotricha*, 1062 *Hel. benedicta*, 1063 *Hel. comephora*, 1064 *Hel. confusa*. — Taf. 105 fig. 1065 *Hel. Kleciachi*, 1066 *Hel. praetextata*, 1067 *Hel. insolita* var., 1068 *Hel. crinita*, 1069

*) Soeben erfahre ich, dass Dr. Westerlund die Fortsetzung übernommen hat.

Hel. setigera. — Taf. 106 fig. 1070—74. — Taf. 107 fig. 1075—77 Hel. cingulata, 1078, 79 Hel. Gobanzi. — Taf. 108 fig. 1080, 81 Hel. Hermesiana, 1082 Hel. frigida, 1083—87 Hel. cyclolabris. — Taf. 109 fig. 1088 Hel. cyclolabris var., 1089 Hel. noverca, 1090 Hel. pellita, 1091 Hel. graphicotera, 1092 Hel. pellita var., 1093 Hel. lecta, 1094, 95 Hel. Möllendorffi, 1096, 97 Hel. Velascoi, 1098, 99 Hel. cantabrica. — Taf. 110 fig. 1100 Zonites chloroticus, 1101 Z. verticillus var., 1102 Z. albanicus, 1103 Z. corax. — Die den Schluss des vierten Bandes bildende Doppellieferung mit den Tafeln 111—120 erscheint noch in diesem Jahre.

Malocozoologische Blätter. Bd. XXIII. Bogen 10—13.

- p. 170. *Weinland, D. F.*, Diagnoses molluscorum Haitiensium. (Glandina Cleriei, Cyndrella innata, Kraussiana, Stenogyra octonula, Planorbis Weinlandi, Truncatella haitensis, Chondropoma, scripturatum, Cyclostoma Kazika.)
- p. 196. *Pfeiffer, L.*, Bemerkungen zum achten Bande meiner Monographia Heliceorum.

Quarterly Journal of Conchology, ed. by W. Taylor. Vol. I. Nr. 8, Februar 1876.

- p. 113. *Daniel, J. E.*, Shells from Heidelberg. 105 Arten werden aufgeführt, darunter auch Testacella haliotidea nach einer angeblich im Schlossgarten gefundenen Schale in der Lommel'schen Sammlung. Die Einschleppung von Cl. itala wird bezweifelt, da diese Art weit verbreitet sei; die Verpflanzung von Weinheim nach Heidelberg ist übrigens bewiesen, die mit Reben in den Babo'schen Garten nach Weinheim kaum zweifelhaft. — Pupa umbilicata ist wohl auch ein wenig zweifelhaft.
- p. 118. *Smith, Edgar A.*, Descriptions of some new species of Land and Freshwater Shells and Remarks on other species found in Japan. (Helix Goodwinii, Clausilia bilabrata, dieser Name neben Cl. bilabiata kaum annehmbar, Cl. Kobensis, Melania niponica, Limnaea Goodwinii.) Es ist keine Abbildung gegeben und muss genauem Studium überlassen bleiben, in wiefern diese Arten mit den von E. von Martens und mir beschriebenen zusammenfallen.
- p. 128. *Bland, Th.*, Note on the Genus Bourcieria. Die Stellung bei den Helicinaceen wird bestätigt.
- p. 128. *Hemphill, Henry*, Note on Helix pulchella Müller. Derselbe fand die Art auch in Nevada und Idaho, und zwar so

häufig und verbreitet, dass an eine Einschleppung nicht zu denken ist.

- p. 129. *Blatch, W. G.*, Notes on the occurrence of rare and local shells in unrecorded localities. Einige neue Fundorte für englische Arten.
- p. 131. *Marshall, J. T.*, Species versus Varieties.
- p. 133. *Gloyne, C. P.*, Note on the identity of various european Helicidae. — Nach Originalexemplaren wird *Azeca Mabileana* Fagot für die typische tridens, *Nouletiana* Dup. für eine Varietät davon erklärt; *Caec. anglica* und *Liesvillei* für absolut identisch mit *acicula*; *Helix nubigena* Charp. für eine Varietät von *carascalensis*, was ich nach meinen Exemplaren bestreiten muss, da meine *Hel. nubigena* wie die *Moquin-Tandons* zweifellos eine Xerophile ist. Auch die Wiedervereinigung von *Claus. rugosa* Drp. und *nigricans* Pult., sowie die von *Meissneriana*, *Küsteri* und *Adjaciensis* scheint mir etwas problematisch.
- p. 134. *Angas, G. F.*, Remarks on the South Australian Helices, with a notice of all the species known up to the present date. — 28 Arten werden aufgeführt.
- p. 136. *Marrat, F. P.*, Descriptions of five new Marginellae. (*M. Tyermanni*, *perla*, *praecallosa*, *Warrenii*, *callosa*.)
- p. 138. *Hatcher, W. H.*, Land Shells from the Scilly Islands. 18 Arten, darunter von besonderem Interesse *Hel. revelata* Fer. und *acuta* Müll.

Schepmann, M. M., Over *Leucochroa degenerans* Mouss. en *Helix mograbina* Morelet en hunne Plaats in het System.

Die Zugehörigkeit beider Arten zu *Helix* wird bestätigt, ihre Art-selbstständigkeit aber durch eingehende anatomische Untersuchungen nachgewiesen. Vergl. die obenstehende Notiz des Verfassers.

Jahrbücher der deutschen malacozoologischen Gesellschaft. III. 1876. Heft 4.

- p. 288. *Vest, W. von*, Ueber *Adacna*, *Monodacna* und *Didacna* Eichwald und verwandte Formen.
- p. 317. *Schacko, G.*, Ueber die Zungenbewaffnung der Gattung *Struthiolaria*.
- p. 323. *Kobelt, W.*, Catalog der Gattung *Ranella* Lam.
- p. 334. *Martens, Ed. von*, Binnenmollusken von Chiwa.
- p. 338. — —, Einige neue griechische Schnecken.
- p. 344. *Kobelt, W.*, Zur Fauna Italiens (Schluss).
- p. 357. *Martens, Ed. von*, Ueber einige japanesische Landschnecken.

p. 364. *Martens, Ed. von*, Transkaukasische Mollusken, gesammelt von Dr. O. Schneider.

p. 371. *Kobelt, W.*, Beiträge zur arctischen Fauna (Schluss).

Kobelt, W., *Illustriertes Conchylienbuch*. — Nürnberg bei Bauer & Raspe. Erste Lieferung, mit zehn schwarzen Tafeln. Preis Rmk. 6.

Es ist dieses Werk dazu bestimmt, dem Mangel eines für den Anfänger geeigneten illustrierten Werkes über Conchylien abzuhelpfen, gleichzeitig aber auch dem Besitzer einer kleineren Sammlung die Möglichkeit zu geben, seine Sammlung zu ordnen und zu bestimmen. Zu dem Ende wird es auf 80—90 Tafeln etwa fünfzehn Hundert Arten zur Abbildung bringen; dabei werden in erster Linie die europäischen Arten, dann die in den Sammlungen verbreiteteren Exoten berücksichtigt, ausserdem aber möglichst von jeder anerkannten Gattung und wichtigeren Untergattung eine typische Art aufgenommen, so dass das Werk auch als Handbuch der Conchylienkunde dienen kann. Neben den abgebildeten Arten werden auch deren nächste Verwandte kurz charakterisirt. Die deutschen Binnenconchylien werden sämtlich zur Abbildung gelangen.

Die erschienene erste Lieferung enthält ausser der ausführlichen Einleitung die Cephalopoden, Pteropoden und Heteropoden, soweit sie für den Conchyliensammler in Betracht kommen, die Muriciden inclusive *Fusus*, die Pyruliden inclusive *Busycon* und die Tritoniden; abgebildet sind 115 Arten. — Die ferneren Lieferungen werden in Zwischenräumen von etwa zwei Monaten erscheinen.

A n n o n c e n .

Mülleria lobata d'Orb von Neu-Granada

ist in schönen Exemplaren gegen Einsendung von franco M. 9. zu beziehen durch

L. W. Schaufuss sonst E. Klocke
in Dresden.

Dem Herausgeber sind eine Anzahl conchyliologischer Werke, aus dem Nachlasse Küster's, zur Verwerthung übergeben; dieselben werden ungefähr zum halben Ladenpreis abgegeben. Näheres auf directe Anfragen bei der Redaction.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Literaturbericht 140-144](#)