

Die Ausbeute des „Valorous.“

In der von Mr. Gwyn Jeffreys als Präsidenten der biologischen Section der British Association bei der Versammlung zu Plymouth am 16. August 1877 an seine Section gerichteten Adresse finden wir eine Zusammenstellung der auf der Fahrt des Valorous von den Herren Jeffreys und Carpenter jr. erbeuteten Tiefseearten. Bekanntlich erlitt der Dampfer beim Antritt seiner eigentlichen Untersuchungen eine schwere Beschädigung und konnten in Folge derselben nur vier Drakezüge im eigentlichen tiefen Wasser, — über 1000 Faden tief — gemacht werden, zwei in der Davisstrasse, die beiden anderen zwischen Cap Farewell und dem 26° westlicher Länge. Im Ganzen wurden, abgesehen von unbestimmbaren Fragmenten, 75 Arten erbeutet, darunter 46 neu. Wir drucken das Verzeichniss nebst den Tiefenangaben und sonstigen Bemerkungen hier ab, da das Original schwerlich in die Hände vieler deutschen Conchologen kommen wird.

Brachiopoda.

Tiefe in Faden

<i>Terebratula tenera</i> Jeffr.	1450
<i>Atretia gnomon</i> Jeffr.	1100—1750
<i>Discina atlantica</i> King	690—2400 F. im Coralline Crag.

Conchifera.

<i>Pecten fragilis</i> Jeffr.	1000—1783
<i>Amussium lucidum</i> Jeffr.	156—1450
<i>Lima ovata</i> S. Wood	1450 F. im C. C. und am Monte Mario.
— <i>subovata</i> Jeffr.	49—1450
— <i>gibba</i> Jeffr.	1450—1785
<i>Idas argenteus</i> Jeffr.	994—1450
<i>Dacrydium vitreum</i> Müll.	30—2435 F. in Sicilien.
<i>Nucula acuminata</i> Jeffr.	420—1470

	Tiefe in Faden.	
<i>Leda acuminata</i> Jeffr.	20—1750	
= <i>Messanensis</i> Seg.		F. in Sicilien.
— <i>pusio</i> Phil. var.	257—1750	desgl.
— <i>pustulosa</i> Jeffr.	202—1470	desgl.
— <i>expansa</i> Jeffr.	690—1750	
— <i>lata</i> Jeffr.	165—1785	
— <i>sericea</i> Jeffr.	740—1450	
<i>Glomus nitens</i> Jeffr.	557—1750	
<i>Limopsis tenella</i> Jeffr.	1450	
— <i>cristata</i> Jeffr.	292—1095	
<i>Arca pectunculoides</i> Sc.	20—1100	F. in C. C. u. Sicilien
<i>Malletia excisa</i> Phil.	1443—1750	F. in Sicilien.
— <i>cuneata</i> Jeffr.	718—1800	
<i>Montacuta Dawsoni</i> Jeffr.	3—1750	In der Tiefe nur Fragmente.
<i>Kellia symmetros</i> Jeffr.	488—1750	
<i>Axinus cycladius</i> S. Wood	30—1750	F. in C. C.
— <i>eumyrius</i> M. Sars	114—1456	
— <i>Croulineensis</i> Jeffr.	20—1785	
— <i>incrassatus</i> Jeffr.	40—1750	
<i>Diplodonta Torelli</i> Jeffr.	30—1450	In der Tiefe nur Fragmente.
<i>Isocardia cor</i> L.	40—1785	In der Tiefe nur Brut (<i>Kelliella abyssicola</i>).
<i>Tellina calcarea</i> Ch.	1—1750	F. in Sicilien; in der Tiefe nur Fragmente.
<i>Poromya rotundata</i> Jeffr.	1450	
<i>Pecchiolia abyssicola</i> M. Sars	110—1450	In der Tiefe nur Fragmente.
— <i>gibbosa</i> Jeffr.	1450	Nur ein Fragment.
— <i>tornata</i> Jeffr.	1785	desgl.
<i>Neaera striata</i> Jeffr.	435—1450	
— <i>exigua</i> Jeffr.	1450	

	Tiefe in Faden.	
<i>Neaera notabilis</i> Jeffr.	1450	
— <i>circinata</i> Jeffr.	994—1450	
— <i>papyria</i> Jeffr.	1450	
— <i>angularis</i> Jeffr.	290—1785	In der Tiefe nur Fragmente.

Solenococonchia.

<i>Dentalium candidum</i> Jeffr.	410—2435	
— <i>capillosum</i> Jeffr.	220—1785	
— <i>ensiculus</i> Jeffr.	740—1785	
— <i>subterfissum</i> Jeffr.	1000—1476	Fragmente.
— <i>vagina</i> Jeffr.	1450—1785	

Siphonodentalium vitreum

Sars	150—1750	
— <i>affine</i> Sars	100—1450	
— <i>Lofotense</i> Sars	20—1750	
<i>Cadulus tumidosus</i> Jeffr.	110—1450	
— <i>Olivi Scacchi</i>	539—1450	F. in Sicilien.
— <i>cylindratus</i> Jeffr.	1215—1476	

Gastropoda.

<i>Propilidium ancyloides</i> Forbes =		
<i>Rostrisepta parva</i> Seg.	60—1450	F. in Sicilien.
<i>Puncturella profundi</i> Jeffr.	740—1750	
<i>Scissurella crispata</i> Flem.	7—1095	F. in Sicilien.
<i>Sc. tenuis</i> Jeffr.	1450	
<i>Cyclostrema basistriatum</i> Jeffr.	50—1095	F. in Sicilien.
<i>Acirsa praelonga</i> Jeffr.	994—1450	
<i>Eulima stenostoma</i> Jeffr.	50—1466	
<i>Natica affinis</i> Gmel.	5—1100	In der Tiefe nur Fragmente.
— <i>sphaeroides</i> Jeffr.	1750	Ein junges Gehäuse.
<i>Seguenzia formosa</i> Jeffr. =		
<i>monocingulata</i> Seg.	325—1785	F. in Sicilien.

	Tiefe in Faden.	
<i>S. carinata</i> Jeffr.	690—1095	
<i>Cerithium procerum</i> Jeffr.		
= <i>Danielsoni</i> Friele	400—1450	
<i>Trophon Fabricii</i> Beck	35—1450	In der Tiefe nur Bruchstücke.
<i>Fusus attenuatus</i> Jeffr.	690—1215	
— <i>Sabini</i> Gray	100—1450	desgleichen.
<i>Pleurotoma tenuicostata</i> Sars	40—1622	
— <i>exarata</i> Möller	5—1230	
<i>Cylichna alba</i> Brown	7—1400	F. in Sicilien.
<i>Utriculus lacteus</i> Jeffr.	1443—1450	Fragmente.
— <i>substriatus</i> Jeffr.	1750	
<i>Actaeon exilis</i> Jeffr.	49—1450	F. in Sicilien.
<i>Scaphander punctostriatus</i> Migh. et Ad.	26—1450	desgl. — In der Tiefe nur Fragmente. K.

**Verzeichniss der bei dem Besuche von H. M. S. Peterel
auf den Galapagos gesammelten Mollusken.**

Von

Edg. Smith

(Aus Proc. zool. Soc. London 1877).

a. *Meermollusken.*

- Purpura patula* L.
— *Callaoensis* Gray.
Engina crocostoma Reeve.
Rhizochilus (*Coralliophila*) *parvus* n. sp.
Columbella fuscata Sow.
Latirus varicosus Reeve.
— *tuberculatus* Brod.
Strigatella tristis Swains.
Conus nux Brod.
Cerithium maculosum Kiener.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Die Ausbeute des "Valorous." 87-90](#)