

T a u s c h - C a t a l o g
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

| | | <i>M</i> | | <i>M</i> |
|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------|
| | <i>Helix</i> | | <i>Pupa</i> | |
| albolabris, Say, | Ohio | 0,35 | megachilos, Jan. v. bigor- | . |
| anomala, Pfr., | Jamaica | 0,60 | riensis Charp. Gallia merid. | 0,15 |
| caribea, Weinl., | Bahamas | 0,40 | edentula, Drp., Germ. mer. | 0,5 |
| carmelita, Fér., | Jamaica | 1,80 | granum, Dr. v. Michel, Fér. | |
| edentula, Drp., | Schwaben | 0,25 | Gall. mer. | 0,25 |
| graminicola, C. B. Ad., | Jam. | 0,40 | modiolus, Fér., Mauritus | 0,40 |
| hirsuta, Say, | Ver. St. | 0,35 | Newtoni, | 0,80 |
| hispida, L., | Norwegen | 0,15 | pagódula, Desh., Italia | 0,20 |
| implicata, Pfr., | Mauritus | 0,50 | palanga, Morelet, Maurit. | 0,40 |
| inversicolor, Fér., | " | 0,40 | pusilla, Müll., Germ. merid. | 0,5 |
| leucostyla, Pfr., | " | 0,40 | pygmaea, Drp., Germania | 0,5 |
| mauritiana, Pfr., | " | 0,40 | pyrenearia, Boub., Gall. mer. | 0,15 |
| obvia, Ziegl., | Transsylvania | 0,15 | quinquedentata, Born, Italia | 0,15 |
| " | Germania | 0,10 | teres, Pfr. Mauritus | 0,40 |
| " v. candicans., | Serbien | 0,20 | umbilicata, Drp. England | 0,15 |
| obvoluta, Müll., | Germania | 0,10 | variabilis, Drp. Gallia mer. | 0,20 |
| personata Lam., | " | 0,15 | ventrosa, Heynem., | |
| Rawsonis Barcl., | Mauritus | 0,60 | Frankfurt a. M. | 0,15 |
| rufa, | " | 0,30 | Strophia mumia, Brug. | |
| rufo-tincta | " | 0,35 | v. infanda, Shuttl. Bahamas | 0,80 |
| varians, Mnke., | Bahamas | 0,35 | <i>Cylindrella</i> | |
| Hyalina osculans, Ad., | Jam. | 0,20 | brevis, Pfr. & v. obesa, Jam. | 0,40 |
| Zonites verticillus, Fér., | | | elongata, Chm., Jamaica | 0,50 |
| | Germania | 0,25 | cylindrus, v. rosea Pfr., " | 0,40 |
| Achatina panthera, Fér., | | | agnesia, C. B. Ad., " | 0,50 |
| | Madagascar | 1,20 | Maugeri, Wood in 5 var. " | 0,20 |
| " umbilicata, Mauritus | | 0,70 | sanguinea, Pfr., " | 0,40 |
| Bulim. microdon, Pfr., | Jam. | 0,25 | seminuda, C. B. Ad., " | 0,40 |
| " pullus Gray, Abyssin. | | 0,30 | <i>Cyclostomus</i> | |
| Clausilia tau, Böttger, Japan | | 0,60 | articulatus, Gray, Rodriguez | 1 |
| " bilabrata, Ed. Smith, | " | 1 | Barclayi, Pfr., Mauritus | 1 |
| " platydera, v. Mart., | " | 0,70 | Listeri, | 0,30 |
| " mamertina, Gul., Gozzo | | 10,— | ligatus, Müll., " | 0,30 |
| " serrulata, Midd., Kauk. | | 10,— | Michaudi, rothe Lippe | 1,20 |

| | | <i>Mf</i> | | | <i>Mf</i> |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| tricarinatum, | Mauritius | 1,80 | Harpa ventricosa, L., schön | | |
| undatum, | " | 0,25 | | Mauritius | 2 |
| unicolor, | " | 0,25 | " Cabritii, Fisch., " | | 2 |
| div. neue Spz., lebend ent- | | | " minor, Rumph., " | | 0,40 |
| deckt unter grossen Stei- | | | " nobilis, Mart., Amboina | | 1,50 |
| nen am Meere, Mauritius | | 0,50-60 | " ? sp. n. Mauritius | | 1 |
| Choanopoma lima, C. B. Ad., | Jamaica | 0,70 | Hydatina physis, L., " | | 0,40 |
| Tudora arena, Sow., " | | 0,25 | Aplustrum aplustre | " | 0,30 |
| Melampus lividus, Maurit. | | 0,25 | Akera soluta, Chm., " | | 0,70 |
| cingulatus, Jamaica | | 0,15 | Aplysia depilans, L., " | | 0,50 |
| div. neue Spz. v. Celebes | | | Nassa nodulosa, Pow., " | | 0,60 |
| & Sulu-Inseln | | 0,25 | " marmorata, " | | 0,30 |
| Plan. opercularis, Gld., Oreg. | | 0,20 | " canalifera, Lm., " | | 0,40 |
| Litorina lineata, D'Orb., | | | " Kraussii, Phil., Panama | | 0,35 |
| Mauritius | | 0,25 | Terebra chlorata, L., Maurit. | | 0,35 |
| " angulifera, Lam. " | | 0,20 | " muscaria, Lm., " | | 0,35 |
| " scabra, L. | " | 0,35 | " pertusa, Rve, " | | 0,30 |
| " pulchra, Swains., | Panama | 0,50 | " maculata, L., Diego | | 0,70 |
| | | | " arenosa? rara, Maurit. | | 0,40 |
| Nerita histrio, L., Austral. | 20- | 0,40 | Cerithium obeliscus, Brug., | | |
| Murex clavus, Kien. Schön, | | | | Mauritius | 0,35 |
| Mauritius | | 25 | " lacteum, Kien., " | | 0,15 |
| " " jünger, " | | 15 | " asper, L., " | | 0,25 |
| Coralliophila squamosa, | | | Calypt. tectum sinense, L., | | |
| Desh. Mauritius | | 0,50 | | Mauritius | 0,60 |
| Epidromus maculosus, Lm., | | | Leptoconchus striatus, Rüp., | | |
| Mauritius | | 3 | | Mauritius | 1 |
| " Cumingii, Ad., " | | 2 | " Rüppellii, Desh., " | | 1 |
| " No. 247 | " | 0,40 | " Lamarckii, " " | | 1,40 |
| " No. 248 | " | 0,35 | " Robillardii, " " | | 1 |
| Ranella cruentata, Sow., " | | 0,80 | " 4 versch. unbenannte | | |
| " granifera, Lm, " | | 1 | Species, Mauritius | | 0,75 |
| " rhodostoma, Sow., " | | 0,70 | Conus imper., L. var. Diego | | 3 |
| Latirus nassatula, Lm., " | | 0,35 | " maldivus, Brug., Maur. | | 1,70 |
| " eraticulatus, L., " | | 0,50 | " cernicus, Adams, " | | 1,30 |
| Triton rubecula, L., | " | 0,70 | " distans, Brug., " | | 1,20 |
| " anomalous, Rve., " | | 0,70 | " pygmentatus, Ad. & R., | | |
| " chlorostomus, L., " | | 0,30 | Cargados | | 1,50 |

| | Mk. | | Mk. |
|--|------|--|--------|
| <i>Conus lithoglyphus</i> , Meus., Mauritus | 0,70 | <i>picta</i> , Rve., Mauritus | 0,70 |
| " <i>tahitensis</i> , Brug., " | 0,70 | <i>pyramidalis</i> , Rve., " | 1,50 |
| " <i>catus</i> , Hwass., " | 0,50 | <i>rubiginea</i> , Ad., rara, " | 3,50 |
| " <i>rosaceus</i> , Chm., Algoa-Bay | 1,50 | <i>umbonata</i> , Sow., " | 0,90 |
| " <i>minimus</i> , L., Mauritus | 0,40 | <i>variegata</i> , Rve., " | 0,80 |
| " <i>omaria</i> , Hwass., " | 3 | <i>venustula</i> , Rve., " | 0,40 |
| " <i>pertusus</i> , Brug., " | 7,50 | <i>virgata</i> , Rve., Sulu-Inseln | 0,40 |
| " <i>multistriatus</i> , " | 3 | Mauritia Barclayi, Ad., Maur. | 5 |
| " <i>litteratus</i> , L., sehr schön, Mauritus | 2 | <i>Cypraea onyx</i> , L. var. " | 0,80 |
| " <i>millepunctatus</i> , L., sehr schön, Mauritus | 1,50 | " <i>tabescens</i> , Solan., " | 0,50 |
| <i>Oliva ponderosa</i> , Duc., Diego Dolabella Rumphii, Rve., Mauritus | 0,70 | <i>Trivia oryza</i> , Lm., " | 0,20 |
| | 0,80 | " <i>staphylaea</i> , L., " | 0,40 |
| | | " " v. <i>granulata</i> , Mauritus | 0,50 |
| <i>Mitra</i> | | <i>Cytherea nivea</i> , Lm., schön, Aden | 1,60 |
| <i>cadaverosa</i> , Rve., Mauritus | 0,35 | " <i>purpurata</i> , Lm., " | 1,30 |
| <i>circulata</i> , Kien., " | 1,20 | " <i>Listeri</i> , Gray, Maurit. | 1 |
| <i>coronata</i> , Lam., " | 0,60 | <i>Cypicardia angulata</i> Lm., Mauritus | 1 |
| <i>crocea</i> , Rve., v. | 1,50 | <i>Spondylus</i> , div. unbenannte Species Mauritus | 1—2 |
| <i>cucumerina</i> , Lm., " | 0,30 | <i>Chama & Ostrea</i> , div. unbekannte Sp. Mauritus | 0,40-1 |
| <i>ferruginea</i> , Lm., " | 1 | <i>Alectryonia</i> , div. unbenannte Species, Mauritus | 0,50 |
| <i>filosa</i> , Lam., " | 0,50 | <i>Avicula</i> , 1 Sp. " | 1,50 |
| <i>flammea</i> , Quoy | 0,70 | <i>Peeten corallinoides</i> , D'Orb. | |
| <i>flavescens</i> , Rve., " | 0,40 | " Mauritus | 4 |
| <i>fulva</i> , Swains., " | 0,75 | " <i>madreporarum</i> , Petit, Mauritus | |
| <i>fusiformis</i> , Lm., " | 0,80 | " <i>senatorius</i> , Gmel., Aden | 0,70 |
| <i>impressa</i> , Ant., " | 0,70 | <i>Magilus antiquus</i> , Lm. in situ, Mauritus | 0,60 |
| <i>multicostata</i> , Brod., " | 1,50 | " " gelöst, " | 8 |
| <i>nivea</i> , Lm., rara, | 3 | | 5 |
| <i>nucea</i> , Gron., " | 1 | | |
| <i>ossea</i> , Rve., " | 0,50 | | |
| <i>pardalis</i> , Küst., " | 0,25 | | |

Zu verkaufen: Eine Sammlung von über 1000 Species meistens exotische See-Conchylien, passend für eine höhere Schulanstalt; Preis nur Mk. 500.—

Der Katalog wird auf Wunsch übersandt.

Ferner eine Prachtsammlung von circa 400 Exemplaren *Nerita polita*, L. in den schönsten Varietäten; Preis Mk. 100.—

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Verkrüzen T.A.

Artikel/Article: [Tausch-Catalog 108-110](#)