

# Bogelfundliche Aufzeichnungen aus dem westlichen Sauerland

C. Demandt, Lüdenscheid

Steinschmäger (*Saxicola oenanthe* o. L.) als Durchzügler im Frühjahr öfters beobachtet: 12. 4. 32 Reblin, 5. 5. 35 Homert, 22. 5. 35 Seebfeld, 15. 5. 35 Rennerde, 15—20 Stück, fast ausschließlich Männchen. *Turdus torquatus* t. (L.), Ringdrossel: 12. 4. 33 singendes Männchen bei Reblin, 9. 4. 36 an der Homert bei Lüdenscheid. Misteldrossel (*Turdus viscivorus* v. L.) in höheren Lagen regelmäßiger Brutvogel. Gelbspötter (*Hippolais icterina* Vieill.) in Baumgärten und Friedhöfen von Lüdenscheid regelmäßig in einigen Paaren. *Acrocephalus palustris* (Bechst.), Getreiderohrfänger: Vereinzelt in Getreidefeldern. *Locustella naevia* n. (Bodd.) Feldschwirl: In jungen Fichtenschonungen bis über 600 m hinaufgehend. *Sylvia curruca* (L.), Klappergrasmück: In höheren Lagen ziemlich selten. *Carduelis carduelis* c. (L.), Stieglitz: In höheren Lagen ziemlich selten. *Fringilla montifringilla* (L.) Bergfink: Regelmäßiger Durchzügler, der auch in die Stadt kommt. *Coccothraustes c. c.* (L.), Kirschenerbeißer: 16. 4. 27 ein lockendes Männchen auf dem Gipfeltrieb einer hohen Buche im Subachtal. Kommt im Winter in einzelnen Exemplaren in der Nähe von Baumgärten an die Vogelfütterungen in der Stadt. *Oriolus oriolus* o. (L.), Pirol. Am 14. 6. 36 zeigte sich ein Männchen im Lasbeckertal bei Nachrodt. *Corvus corone cornix* (L.), Nebelkrähe: Seltener Durchzügler: 8. 3. 27; 28. 11. 37 bei Rennerde ein einzelner Vogel zwischen Rabenkrähen. *Lanius collurio* c. (L.), Rotrückiger Würger: In der Umgebung von Lüdenscheid kaum mehr anzutreffen. *Lanius excubitor* e. (L.), Raubwürger: Als Brutvogel nicht nachgewiesen, kommt aber häufiger zu Gesicht als vorstehende Art: 26. 5. 35 Herscheid, 24. 1. 37 Beckinghausen, 16. 1. 38 Lüdenscheider Exerzierplatz, 16. 10. 38 Brandiger Kopf bei Plettenberg. *Caprimulgus europaeus* e. (L.), Ziegenmelker: Im Ebbe und im Krummenscheid an verschiedenen Stellen, weiter auch im oberen Lasbecktal. *Alcedo ispida* i. (L.), Eisvogel: Nur sehr vereinzelt an den Gebirgsbächen (Methal, Dedenthal). *Muscicapa striata* str. (Pallas), Grauer Fliegenfänger: In höheren Lagen recht selten; 3. 6. 34 bei Lüdenscheid. *Muscicapa collaris* (Bechst.), Halsbandfliegenfänger. Am 26. 5. 38 trieb sich ein Männchen an der Lasbecker Eisenbahnbrücke herum, saß auf dem Eisengeländer und den Ginsterbüschen am Lenneufer. Beobachtung auf 30 m mit achtfachem Glase, daher Verwechslung mit Trauerfliegenfänger ausgeschlossen. *Muscicapa hypoleuca* Pallas, Trauerfliegenfänger: Nur auf dem Durchzug beobachtet, auch ausgefärbte Männchen: 30. 4. 34, 22. 5. 35, 25. 8. 38. *Jynx torquilla* (L.), Wendehals: Nur einmal beobachtet im Sommer 1927 im Bersetal. *Athene noctua* n. (Scop.), Steinkauz, ziemlich selten: Lüdenscheid Stadtpark, Hagen-Delftern. *Falco peregrinus* p. (Tunst.), Wanderfalk: Seit etwa 10 Jahren Brutvogel im Lasbecktal bei Nachrodt und bei Seggen. Jagt zuweilen über der Stadt Lüdenscheid auf Tauben: 5. 1. 30, 30. 1. 34. *Falco subbuteo* s. (L.), Baumfalk: Vermutlich Brutvogel in der Umgebung des Hönnetales, wo er am 31. 8. 30 über Deilinghofen auf Schwalben jagte. Sonst nur Durchzügler: 30. 9. 34 und 30. 4. 37 bei Lüden-

scheid. *Falco columbarius c* (L.), Merlinfalk: Erlegt im Bollmetal 19. 9. 1911 \*\* und im Bersetal 1890 \*\*. Auf dem Durchzuge gesichtet am 4. 11. 1933 bei Lüdenscheid und am 9. 10. 37 an der Sorpesperre. *Milvus milvus m.* (L.), Roter Milan nur als Durchzügler: 27. 7. 27, 8. 3. 30, 29. 4. 36, 26. 9. 38 und 13. 3. 39 bei Lüdenscheid, 18. 5. 39 am Kohlberg. *Milvus migrans m.* (Bodd.), Schwarzer Milan am 9. 6. 1935 bei Buschhausen an der Fuelbecker Talsperre. *Pernis apivorus* (L.), Wespenbussard, regelmäßiger Brutvogel des Kreises Altena, so bei Herscheid 1937, in den Waldungen des Neuenhofes und im Lasbecktal alljährlich, bei Rierspe 1932, an der Fuelbecke 1934. *Pandion haliaetus h.* (L.), Fischadler: Regelmäßiger Durchzügler an unseren Talsperren: 12. 4. 33 Bersesperre, 9. 6. 34 Bollmetal, 16. 10. 38 Sorpesperre. *Accipiter gentilis g.* (L.), Habicht: regelmäßiger Brutvogel in den Wäldern des Neuenhofes in einem Paar, ferner Bersetal bei Haus Habel und im Lennegebiet an verschiedenen Stellen. *Circus cyaneus c.* (L.), Kornweihe, seltener Durchzügler. Weibchen \* erlegt am 9. 11. 1925 bei Altenaffeln. *Streptopelia turtur t.* (L.), Turteltaube, kein Brutvogel. Juli 29 zwei Stück an der Homert bei Lüdenscheid, 17. 5. 37 bei Herscheid. *Columba oenas oe.* (L.), Hohltaube, angeblich Brutvogel bei Nachrodt. Am 11. 10. 38 und 22. 11. 33 in großen Scharen durchziehend. *Tetrao urogallus* (L.), Auerhahn: Brutvogel im Ebbe- und benachbarten Gebieten, angeblich auch noch im Krummenscheid zwischen Lüdenscheid und Altena. *Lyrurus tetrix t.* (L.), Birkhuhn. Im Bestande schwankend, aber stellenweise noch ziemlich häufig: 11. 4. 38 zwischen Heedfeld und Wiblingwerde 13 halzende Hähne. Rackelhähne sind in den verschiedenen Gegenden des Kreises Altena von jeher erlegt worden und wurden auch in letzter Zeit beobachtet. *Tetrastes bonasia rupestris* (Brehm), Haselhuhn, ist in den Niederwäldern des Lennegebietes regelmäßiger Brutvogel. *Rissa tridactyla tr.* (L.), Dreizehenmöve: Im Januar 1937 wurde ein verendetes Exemplar \* auf der Gasmert bei Lüdenscheid aufgefunden. *Colymbus stellatus* Pontopp, Nordseetaucher; im Dezember 1908 wurde ein Exemplar \* am Lüdenscheider Schlachthaus ermattet gegriffen. *Colymbetes arcticus a.* (L.), Polartaucher: Am 10. 5. 1931 ein ausgefärbtes Exemplar auf der Liesfersperre beobachtet. *Porzana porzana* (L.), Tüpfelsumpfhuhn: Am 8. 5. 1931 wurde mir ein Stück gebracht, das gegen einen Leitungsdraht geflogen war und wieder freigelassen wurde, nachdem es sich erholt hatte. *Vanellus vanellus* (L.), Kiebitz: Von seinen früheren Brutplätzen am Nordhang des Ebbe durch die Trockenlegung verdrängt, brütet an der rheinischen Grenze westlich Halver in einzelnen Paaren auf Kartoffeläckern. *Botaurus stellaris st.* (L.), Große Rohrdommel. Am 1. 1. 29 wurde ein Stück an einem kleinen Teiche unweit Lüdenscheid erlegt. Der Balg ist verdorben. *Burhinus oedimemus oed.* (L.), Triel: Im Jahre 1930 wurde ein Triel \* bei Werdohl gefangen. *Tringa hypoleucos* (L.), Flußuferläufer: 8. 5. 37 Bersesperre, 1938 Liesfersperre, 1939 Tubachsperre. *Tringa nebularia* Gunn., Heller Wasserläufer: 25. 8. 1938 am Südufer der Liesfersperre beobachtet. *Tringa ochropus* (L.), Waldwasserläufer: wurde im August 1930 bei Halver erlegt \*. *Phalacrocorax carbo subcormoranus* Brehm, Gemeiner Kormoran: Im Jahre 1934 wurde ein Kormoran\* längere Zeit auf der Glörsperrre und über der Liesfersperre beobachtet.

Anmerkung: Die mit \* bezeichneten Stücke stehen im Heimatmuseum, die mit \*\* bezeichneten in der biologischen Sammlung der Oberchule für Jungen zu Lüdenscheid.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Natur und Heimat](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Demandt Carl

Artikel/Article: [Vogelkundliche Aufzeichnungen aus dem westlichen Sauerland 65-66](#)