

- 21 -

Steinfliegen aus NorditalienProv. Trentino-Alto Adige

(Ein Beitrag zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna Italiens)

(Insecta - Plecoptera)

Nachstehende Plecopteren wurden am 21. u. 24.8.1965 von mir (Me) und von 14.-21.5.1967 vom Ehepaar Lübenau (Lü) an einigen Stellen im Bereich der Provinz Trentino-Alto Adige aufgesammelt. Wegen der kleineren Ausbeuten ist es möglich, die Fundorte gleich bei den einzelnen Arten anzugeben. X

Protonemura brevistyla RIS

2♂ 1♀, 21.8.1965, Stilfser Joch, Westseite rd. 2400 m (Me);
1♀, 21.8.1965, Gavia-Paß, rd. 2300 m (Me)

Protonemura lateralis (PICTET) RIS

19♂ 18♀, 21.8.1965, Stilfser Joch, Westseite, rd. 2400 m (Me)
1♂ 2♀, 21.8.1965, Gavia-Paß, rd. 2300 m, (Me)

Amphinemura sulcirostris (STEPH.)

6♂ 4♀, 21.5.1967, Fiume Chiese, 700 m (Lü)
12♂ 6♀, 21.5.1967, Fiume Chiese, 480 m (Lü)

Nemoura cinerea selene CONSIGLIO

33♂ 8♀, 15.5.1967, Lago d'Ampola, Zu- u. Ablauf, 725 m (Lü)

Nemoura minima AUBERT

1♂, 17.5.1967, Südhang bei Pieve di Ledro, Gebirgsbach, 750 m (Lü)
1♀ 14.5.1967, Val d'Ampola, Gebirgsbach Palvico, 600 m, (Lü)

Diese Art ist nach CONSIGLIO (1967) bisher nur aus Ligurien: Colle del Melogno durch Aubert bekannt!

Leuctra armata KEMPNY

2♀, 21.8.1965, Stilfser Joch, Ostseite, rd. 2300 m (Me)

Leuctra mcshelyi MORTON

2♂, 24.8.1965, kleine Bachschlucht im Rienztal vor Brunico (Me)

Leuctra rauberi AUBERT

2♂ 2♀, 20.5.1967, Val di Chiese, 1480 m (Lü)

Leuctra rosinae KEMPNY

2♂ 2♀, 21.8.1965, Stilfser Joch, Westseite, rd. 2400 m, (Me)

Dictyogenus fontium RIS

1♂ 1♀, 21.8.1965, Stilsfer Joch, Ostseite, rd. 2300 m (Me)

1♂ 1♀, 21.8.1965, Stilsfer Joch, Westseite, rd. 2400m (Me)

Im Gegensatz zu den Tieren dieser Art, die bei uns in den Alpen stets vollflügelig in beiden Geschlechtern vorkommen, zeigen die männlichen Exemplare vom Stilsfer Joch deutliche Brachypterie.

Die Flügel des ♂ von der Ostseite (2300m) sind knapp körperlang, während sie bei dem ♂ der Westseite (2400 m) das Abdomen gerade noch zur Hälfte bedecken.

Entfernung zwischen den beiden Fundorten etwa 2 km Luftlinie. In beiden Fällen wurden die Tiere im Quellbereich gefangen.

Perla maxima (SCOP.)

1♀ + 1 Exuvie, 21.5.1967, Val d'Ampola, 580 m,
Exuvie an Brückenpfeiler gefunden (Lü).

Literatur:

CONSIGLIO, C. 1959: Una nuova sottospecie di *Nemoura cinerea* RETZIUS (Plecoptera). -
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. XXXII: 323-327

CONSIGLIO, C. 1967: Lista dei Plecotteri della regione Italiana.-
Fragmenta Entomologica, V, 1:1-66.

Hans M e n d l
896 Kempten/Allgäu
Lotterbergstraße 18
BR Deutschland

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [12_1](#)

Autor(en)/Author(s): Mendl Hans

Artikel/Article: [Steinfliegen aus Norditalien Prov. Trentino-Alto Adige 21-22](#)