

Steinfliegen aus Kärnten

(Insecta - Plecoptera)

(Ein Beitrag zur Kenntnis der Plecopteren-Fauna Österreichs)

Das Ehepaar K.u.Dr.R.Lübenau brachte dankenswerterweise aus seinem Pflingsturlaub in Kärnten 1966 eine reichhaltige Plecopterenausbeute mit, deren Determinationsergebnis nachstehend mitgeteilt wird. Die Tiere wurden auf botanischen Wanderungen aufgesammelt, was wiederum zeigt, daß es durchaus möglich ist, auch auf Exkursionen mit anderen Zielsetzungen nebenbei auf Steinfliegen zu achten.

Sammelplätze:

1. 28.5.66: Gestreift von Mädesüß an einem kleinen Wiesenbächlein südöstlich von Afritz.
2. 28.5.66: Abgestreift von Gräsern und *Caltha palustris* an einem kleinen Bächlein, das aus einem Waldhang dem Feistritzer Moor von Süden zufließt; pH 5,6.
3. 28.5.66: Weg von Sachsenburg über Gasthaus Ambros in Höhe von ca. 1000 m (kl.Rinnsale).
4. 28.5.66: Fortsetzung des Weges bis ca 1600 m Höhe entlang dem Nigglaibach (wildromantischer Gebirgsbach).
- 5! 28.5.66: Wie 4., leg:Dr.R.Lübenau.
6. 1.6.66: An Bergbächlein im Gebiet der Watschingeralm (ca1600m) aufgelesen und gestreift.
7. 1.6.66: Wie 6., leg:Dr.R.Lübenau.
8. 2. 6.66: Drau-Ufer bei Sachsenburg.
9. 2.6.66: Gestreift im Gitschtal an der Gitsch zwischen Weißbriach und St.Lorenzen.
10. 2,6.66: Gestreift bei der Grabachbrücke bei Steinfeld/Drau.
11. 3.6.66: Gestreift bei starkem Wind im Maltatal westlich von Malta.
12. 3.6.66: Gestreift an der Lieser zwischen Spittal und Gmünd.
13. 3.6.66: Gestreift an Gebirgsbach bei Twenz, ca. 1200 m.
14. 3.6.66: Wie 13., von Dr.R.Lübenau von Gräsern, Brennesseln und Büschen abgelesen.
15. 3.6.66: Abgelesen von Steinen im Gebirgsbach kurz vor der Paßhöhe bei Obertauern, ca. 1650 m.
16. 3.6.66: Gestreift an Gebirgsbach bei der Vorderen Gnadenalpe zwischen Obertauern und Rastatt, ca.1400m.
17. 3.6.66: Wie 16., von Dr.R.Lübenau abgelesen von Pflanzen.
18. 4.6.66: Gestreift am Bachufer oberhalb Leogang westlich Saalfelden.
19. 4.6.66: Gestreift und abgelesen von Sumpfschachtelhalm, Fieberklee und Sumpfgräsern in Schwemmsumpfgelände östlich von Hochfilzen, K.u.Dr.R.Lübenau.

Materials:

- Rhabdiopteryx alpina KÜHTREIBER 1♂ (3), 4♂♂ 1♀ (4), 1♂ (5)
- Protonemura auberti ILLIES 1♂ (9)
- Protonemura umbrosa (PICTET) 3♂♂ (1), 1♂ 1♀ (10), 1♀ (12), 1♂ (13),
3♂♂ 1♀ (18)
- Protonemura lateralis (PICT.)RIS 1♀ (3), 1♂ (11), 3♀♀ (15)
- Protonemura nimborum RIS 1♀ (6), 1♀ (16), 2♀♀ (17)
- Amphinemura sulcicollis (STEPH.) 1♀ (18)
- Amphinemura triangularis RIS 2♂♂ (13), 2♂♂ (14)
- Nemoura cinerea (RETZ.) 4♂♂ 6♀♀ (6), 3♂♂ 2♀♀ (7), ♂♂ ♀♀ zahlreich (19)
- Nemoura marginata PICTET 1♂ (4)
- Nemoura mortoni RIS 1♂ (6), 4♂♂ (13), 1♂ (16)
- Nemoura spec. 1♂ 1♀ (2), 1♀ (3), 5♀♀ (9), 2♀♀ (13), 1♀ (14),
2♀♀ (19)
- Nemurella picteti KLAPALEK 2♀♀ (2), 1♂ (7), 1♂ 2♀♀ (19)
- Leuctra armata KEMPNY 2♂♂ (4), 5♂♂ 4♀♀ (6), 5♂♂ 3♀♀ (7)
- Leuctra hippopus KEMPNY 1♀ (12)
- Leuctra inermis KEMPNY 1♂ 2♀♀ (8), 33♂♂ 23♀♀ (13), ♂♂ ♀♀ zahlr. (14),
1♂ (16), 1♂ 4♀♀ (18), ♂♂ ♀♀ zahlreich (19)
- Leuctra nigra (OLIVIER) 1♂ (9)
- Leuctra rauscheri AUBERT 2♀♀ (3), 3♂♂ 2♀♀ (4), 2♂♂ 2♀♀ (5), 1♂ (12),
1♂ 1♀ (13), 1♂ 1 ♀ (14), 6♂♂ 2♀♀ (16),
2♂♂ (17)
- Leuctra rosinse KEMPNY 1♂ (16)
- Isoperla grammatica (PODA) 1♂ (9)
- Isoperla rivulorum (PICTET) 6♂♂ 4♀♀ 6 Exuv. (13), 3♂♂ 5♀♀ (14)
- Isoperla spec. (rivul.?) 1♀ (18)
- Perlodes intricata (PICTET) 2♀♀ (19).

Hans M e n d l
896 Kempten /Allgäu
Lotterbergstr. 18
BR Deutschland

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [12_1](#)

Autor(en)/Author(s): Mendl Hans

Artikel/Article: [Steinfliegen aus Kärnten. 23-24](#)