

Erhard Dörr

Ergebnisse der Allgäu-Floristik für das Jahr 1970

Unsere Arbeit an der Erforschung der Allgäu-Flora haben 1970 wesentlich gefördert:

Herr Universitätsprofessor Dr.H.MERXMÜLLER, Direktor des Institutes für Systematische Botanik in München, seine Mitarbeiter, vornehmlich Herr Dr. LIPPERT, Herr Dr.A.BRESINSKY und Herr Dr.GRAU. Dem Entgegenkommen von Herrn Prof.Dr.MERXMÜLLER verdanken wir auch die Möglichkeit, jederzeit die reichhaltige Staatssammlung besuchen zu können.

Wissenschaftliche Hilfe gewährten ferner Herr Prof.P.AELLEN (Basel) und Herr Dr. PATZKE (Aachen). Ausführliche Angaben zur Verbreitung Allgäuer Phanerogamen lieferten Herr Rektor G.W.BRIELMAIER (Wangen), Herr E.GLÖGGLER (Ottobeuren), Herr H.HACKEL (Mindelheim) und Frau E.SUTTER (Kempten). Wertvolle Anregungen verdanken wir auch diesmal Herrn Oberlehrer A.ESCHELMÜLLER, (Sulzberg) und Herrn W.GUTERMANN (Graz).

Für Förderung verschiedenster Art habe ich zu danken:

Herrn O.BRETTAR (Kaiserslautern), Herrn L.FREY (Obergünzburg), Herrn HENSELER (Obergünzburg), Herrn Dipl.Gärtner E.GÜNTHER, dem Schwäbischen Naturschutzbeauftragten, Herrn Dr.O.KLEMENT (Kreuzthal-Eisenbach), Frau KOHLHAUPT (Sonthofen), Frau Dr.u. Herrn K.LÜBENAU (Sankt Mang), Herrn Gymnasialprof.L.MÜLLER (Kempten), Herrn Th.MÜLLER (Kempten), Familie NAAKE (Unggenried), Herrn V.NIGG (Füssen), Herrn Bergwacht-Abschnittsleiter W.PÖTZL (Kempten), Herrn R.REGELE (Landsberg), Herrn Apotheker A.SCHRÖPPEL sen. und J.SCHRÖPPEL jun.(Pfronten), Herrn Ofm.STADLER (Mindelheim) und Herrn Of.STEININGER (Erisried).

Bei den Fundortangaben wurde jeweils der Erstfinder an erster Stelle genannt.

Abkürzungen von Findernamen: Bri = Brielmaier, Gu = Gutermann, Glö = Glögger, Ha = Hackel, Su = Sutter, !! = Dörr.

best. = bestätigt.

I. Neue Arten im Allgäu

1. Sorgum halepense(L.)PERS. (Wilde Mohrenhirse)
Ostmediterrane Adventivart. Müllplatz Sonthofen (19.8.1970:!!),
aufgelassener Schuttplatz nördlich Kaufbeuren (6.10.1970:!!).
2. Sorgum vulgare PERS. (Gemeine Mohrenhirse)
An dieser Stelle müssen wir uns berichtigen. Was wir bisher
als Sorgum vulgare ansprachen, ist wohl Echinochloa pyramidata!
Die Mohrenhirse fanden wir auf den Müllplätzen Durach
(22.9.1970:!!) und Sonthofen (4.10.1970:!!).
3. Panicum colonum L.
Einwanderer aus dem Mittelmeer bzw. aus Übersee.
Schuttplatz Buxheim (19.9.1970:!!).
4. Phoenix dactylifera L. (Dattelpalme)
Zahlreich auf einem aufgelassenen Schuttplatz nördlich Kauf-
beuren. Deutlich zu erkennen an der Dattelfrucht, die noch an
den Keimblättern haftete (25.7.1970: Brettar,!)- Wohl auch
an anderen Orten, aber als "Dattelpalme" kaum zu erkennen.
Übersteht den Allgäuer Winter nicht!
5. Amaranthus graecizans L. (Wilder Fuchsschwanz)
Adventiv aus dem Mittelmeer. Schuttplatz der Stadt Memmingen
am Bf.Ungerhausen (30.8.1970:!!).
6. Ficus carica L. (Feigenbaum)
Adventiv auf dem Müllplatz Sonthofen (4.10.1970:!!).
7. Chenopodium urbicum L. (Straßen-Gänsefuß)
Neu für das bayerische Allgäu! In ganz Deutschland äußerst
selten und fast ausgestorben.- Waldrand bei Kempten-Steufzgen
(Vogelfutterplatz??). Entdeckt von Frau Elisabeth Sutter,
bestätigt !! (30.8.1970).
8. Chenopodium opulifolium SCHRAD. (Schneeballblättriger Gänsefuß)
Schuttplatz zwischen Wengen und Nellenbruck (13.10.1970:!!).
9. Atriplex nitens SCHK. (Glanz-Melde)
Adventiv im Bf.Leutkirch (6.9.1970:Bri,!). Wärmeliebende
Adventivart.
10. Silene conica L. (Kegelfrüchtiges Leimkraut)
Kleeacker nordwestlich Stockheim bei Türkheim (4.7.1970:!!/Glö,
H_a).
- 11) Gypsophila muralis L. (Mauer-Gipskraut)
Adventiv im Bf.Leutkirch (19.7.1970:!!). Kalkfeindlich!
12. Herniaria hirsuta L. (Rauhes Bruchkraut)
Adventiv auf Schutt nw.Kaufbeuren (25.7.1970:Brettar,!).
13. Epimedium pinnatum FISCH. (Gefiederte Sockenblume)
Eglofstal bei Wangen (21.5.1970:!!). Burggartenverwilderung??

14. Barbarea verna (MILL.) ASCHERS. (Frühes Barbarakraut)
Adventiv im Güterbf. Memmingen (30.5.1970: Glö, !!).
15. Cotoneaster horizontalis DECNE (Flache Zwergmispel)
Felsen am Zwieselberg bei Roßhaupten, entfernt von jeder Siedlung (5.8.1970: !!). Stammt aus China.
16. Ulex europaeus L. (Stechginster)
Ruggburg bei Hörbranz, vor Jahren von Brielmaier entdeckt, noch am 21.5.1970: !!).
17. Citrus (Zitrone oder Orange)
In diesem Jahr traten Citrus-Keimlinge auf verschiedenen Müllplätzen des Allgäus auf. Die genaue Artendefinition ist wegen des unentwickelten Zustandes der Pflanzen bisher nicht möglich gewesen: nördlich Kaufbeuren (25.7.1970: Brettar, !!), Sonthofen (8.1970: !!), zwischen Wangen und Nellenbruck (13.10.70: !!).
18. Lythrum meoanthum LINK.
Westmediterrane Adventivart, die heuer auf etlichen Schuttplätzen des Allgäus auftrat: Müllplatz Landsberg (2.9.1970: !!, Regele), Durach (16.9.1970: !!, Su), zwischen Wengen und Nellenbruck (14.10.1970: !!).
19. Epilobium lamyi F. SCHULTZ (Graugrünes Weidenröschen)
Adventiv im Bf. Leutkirch (19.7.1970: !!).
20. Ammi majus L. (Große Knorpelmöhre)
Adventiv im Bf. Mindelheim (28.6.1970: Glö).
21. Solanum rostratum DUNAL (Geschnäbelter Nachtschatten)
Stammt aus dem Nordamerikanischen Präriegebiet.
Adventiv auf dem Müllplatz nahe Bf. Ungerhausen (10.7.1970: !!).
22. Datura stramonium ssp. tatula (L.) TORR
· Unterscheidet sich von der gängigen Stechapfelpflanze durch
· bläuliche Blüten und bläulich überlaufene Stengel.
Landsberg (2.9.1970: !!, Regele).
23. Euphrasia nemorosa MART.
Adventiv am Rande des Müllplatzes Bf. Ungerhausen (12.9.70: !!).
24. Dipsacus sativus SCHOLL. (Weberkarde)
Adventiv auf dem Müllplatz Sonthofen (19.8.1970: !!, Patzke).
Früher als Nutzpflanze gebaut.
25. Carthamus tinctorius L. (Färber-Saflor)
Früher als Färberpflanze gebaut; heuer aus unerklärlichen Ursachen plötzlich an etlichen Müllplätzen: Oberreitnau/Kr. Lindau (7.7.1970: !!), Kempten (27.7.1970: !!), Herzmanns bei Kempten (26.7.1970: !!, Brettar), Buchloe (1.8.1970: !!), Illerbeuren (17.8.1970: !!), nördlich Kaufbeuren (27.7.1970: !!).
26. Achillea pannonica SCHEELE (Ungarische Schafgarbe)
Trockenrasen nw. Stockheim bei Wörishofen (24.8.1970: !!).
Vielleicht eingeschleppt?

II. Neue Standorte bereits registrierter Allgäuer Arten:

1. Selaginella selaginoides LK. (Gezählter Moosfarn)
Premer Filz bei Lechbruck (4.9.70:!!).
2. Selaginella helvetica LK. (Schweizer Moosfarn)
Wertachdamm nördlich Stockheim mehrfach (19.5.70: Ha,!!).
3. Phyllitis scolopendrium NEWM. (Hirschzunge)
Felsen bei Eglofstal, also Hbo (7.5.70.:!!).
Wengen gegen Sonneck (7.11.70:!!).
4. Taxus baccata L. (Eibe)
Hafenmauer von Lindau; verwildert? (24.6.1970:!!).
5. Larix decidua MILL. (Lärche)
Steilhänge bei Griestal nächst Ronsberg; der Bestand an alten
Bäumen sieht nicht so aus, als ob er gepflanzt worden wäre.
(3.5.70:Ha, best.:!!).
6. Polystichum lonchitis ROTH. (Lanzen-Schildfarn)
Auf einem Felsblock im Rohrach bei Emsgritt (6.6.70:!!).
7. Potamogeton alpinus BALB. (Alpen-Laichkraut)
Gennachhausener Moor bei Kaufbeuren (13.6.70:!!),
Bernbacher See (14.6.70:!!).
8. Glyceria maxima HOLMB. (Großer Schwaden)
Lobach b.Seeg (3.9.70:!!), völlig isoliertes Vorkommen!
9. Poa remota FORS. (Entferntblütiges Rispengras)
Lechsberg bei Walhaupten mehrfach (19.5.70:Ha,!!).
10. Lolium temulentum L. (Tamel-Lolch)
Müllplatz Dietmannsried (27.8.70:!!), Müllplatz Westerhofen b.
Sonthofen (8.70:!!), Müllplatz nördl.Kaufbeuren (27.7.70:!!).
11. Hordeum jubatum L. (Mähnergerste)
Massenhaft auf dem Müllplatz von Wangen (6.9.70:!!).
12. Calamagrostis arundinacea ROTH. (Rohr-Reitgras)
Wenige Stöcke im "Hochfürst" westl.Erisried (30.7.70:!!),Ha).
Determ.bestätigt von PATZKE/Aachen. Damit haben wir diese Art
erstmalig sicher für das Allgäu belegt. Frühere Angaben sind
zweifelhaft;Allgäu-Belege im Staatsherbar München erwiesen sich
bei genauerer Prüfung als zu Calamagrostis varia gehörig. Leider
ist der Bestand am Hochfürst nur schwach entwickelt, was auch
darauf hindeutet, daß die Art hier bei uns eine gewisse Verbrei-
tungsgrenze erreicht hat.
13. Setaria verticillata P.B. (Wirtel-Borstenhirse)
Steufzgen b.Kempten (30.8.70:Su,!!), Rothenstein b.Grönenbach
(3.10.70:!!).

14. Alopecurus geniculatus L. (Geknieter Fuchsschwanz)
Moor östl. Pless /Kr. Memmingen, ursprünglicher Wuchsort
(30.5.70:!!; Glö).
15. Alopecurus aqualis SOB. (Gelbroter Fuchsschwanz)
Lehmiger Weiler bei Heimenegg (Juli 70:Ha).
16. Panicum capillare L. (Haar-Hirse)
Müllplatz am Bf. Ungerhausen (12.9.70:!!), Müllplatz nördl. Kauf-
beuren (16.9.70:!!).
17. Carex chardorrhiza EHRH. (Strickwurzel-Segge)
Goimcos b. Immenstadt (1.7.70:Su), Ghagertslauch b. Schongau am
Lech (22.6.70:!!).
18. Carex vulpina L. (Fuchs-Segge)
Gennachhauser Moor b. Kaufbeuren (13.6.70:!!/Glö), Ghagerts-
lauch b. Schongau massenhaft (22.6.70:!!; hier entdeckt von
HÖLLER).
19. Carex lexicetorum POLL. (Heide-Segge)
Enzenstetten bei Seeg (18.4.70:!!), Baisweil (9.5.70:!!),
Elleghöhe bei Oy (5.70:Su).
20. Carex leersii F. SCHULTZ
Bahnhof Mindelheim (4.7.70:!!).
21. Carex pseudocyperus L.
Karsee /Kr. Wangen (2.8.70:!!).
22. Juncus squarrosus L. (Sparrige Binse)
Kalle-Alpe bei Thalbirchdorf (2.8.70:Su).
23. Allium ursinum L. (Bären-Lauch)
Kronburg b. Memmingen (2.5.70:!!) .
24. Allium cleraceum L. (Roß-Lauch)
Bahnkörper zwischen Seifen und Oberdorf nahe der "Tanne"(8.70:!!).
25. Scilla bifolia L. (Zweiblättrige Sternhyazinthe)
Park der Villa "Amsee" in Lindau (2.4.70:!!).
26. Scilla anemona L. (Schöne Sternhyazinthe)
Schwangau (3.5.70:Su).
27. Muscari botryoides MILL. (Kleine Traubenhyazinthe)
Oberhalb Märzried b. Kaufbeuren (6.5.70:!!), Hörmannshofen
b. Kaufbeuren (13.5.70:Su,!!), Lindau, alte Parkanlage (2.4.70:!!,
Bri, L. Müller), Hohenschwangau (3.5.70:Su).
28. Streptopus amplexifolius DC. (Knotenfuß)
Argensee/Kr. Wangen (6.9.70:Bri, best.!!).
29. Leucojum vernum L. (Märzenbecher)
Spielmannsau (31.5.70:Su), Bacherloch, ca 1300 M, (17.6.70:!!).

30. Galanthus nivalis L. (Schneeglöckchen)
Südlich Irsee (22.4.70:!!,Su), Steig bei Wildpoldsried (24.4.70:!!).
31. Narcissus pseudonarcissus L. (Gelbe Narzisse)
Südlich Irsee (22.4.70:!!,Su), Syrgestein b.Eglofstal (7.5.70:!!).
32. Narcissus poeticus L.
Niedersonthofen (30.5.70:Su).
33. Crocus albiflorus KIT. (Weißer Safran)
Einmal bei Immenthal und dreimal bei Obergünzburg (27.4.70:Ha/Henseler, best.:!!).
34. Gladiolus palustris GAUD. (Sumpf-Gladiole)
Faulensee b.Füssen, damit seit Jahren erstmals in Ho links des Lech! Entdeckt von E.Günther/Augsburg, bestätigt !(25.7.70.).
35. Spiranthes spiralis CHEV. (Herbst-Drehwurz)
An der Adelegg b.Rohrdorf (14.10.70:Enderle/Finkenzeller,Bri, best.:!!); Emerlanden im Kürnachtal (14.10.70:Nusser,Bri,best.:!!); Bolsterlang b.Fischen (18.10.70:Dr.Hegner/Kempten,best.:Su u.!!).
36. Orchis ustulata L.(Brand-Knabenkraut)
Wertachauen östl.Stockheim (6.6.70:Ha).
37. Corallorhiza trifida CHAT. (Korallenwurz)
Rand des Seilachmooses bei Lengenwang (3.9.70:!!)
38. Orchis incarnata L.ssp.straminea RCHB.
An einer Stelle bei Seeg (Wahl,Braun,Nigg,best.:!,17.6.70:!!).
39. Epipactis sessilifolia PET. (Violette Sumpfwurz)
Rand des Gennachhausener Moores b.Kaufbeuren (6.9.70:!!).
40. Traunsteinera globosa R. (Kugel-Orchis)
Schwangau (20.6.70:!!) in Ho!!
41. Acorus calamus L. (Kalmus)
Oberreitnau (7.7.70:!!),Nassenbeuren (30.7.70:Ha,best.:!!).
42. Betula humilis SCHRANK (Strauch-Birke)
Ghagertslaich b.Bernbeuren (22.6.70:!!).
43. Viscum album ssp.album (L.) (Laubmistel)
Zwischen Wasserburg und Nonnenhorn (7.5.70:!!);heute in Hbu selten geworden.
44. Rumex maritimus L.(Ufer-Ampfer)
Sachsenrieder Weiher b.Reichholzried (27.8.70:!!).
45. Rumex pulcher L. (Schöner Ampfer)
Müllplatz Kaufbeuren(25.7.70:!!,Brettar), Rothenstein b.Grönenbach (28.7.70:!!).

46. Rumex alpinus L. (Alpen-Ampfer)
Unweit des Gennachhausener Moores b. Frankenried (13.6.70:!!!, Glö).
47. Fagopyrum esculentum MOENCH (Buchweizen)
Müllplätze von Landsberg (2.9.70:!!!, Re), Schongau (5.9.70:!!!),
Durach (10.9.70:!!!, Su).
48. Chenopodium hybridum L. (Bastard-Gänsefuß)
Müllplatz Mindelheim (4.7.70:!!!, Glö).
49. Chenopodium murale L. (Mauer-Gänsefuß)
Müllplatz Durach (10.9.70:Su, !!!).
50. Chenopodium strictum ROTH. (Steifer Gänsefuß)
Landsberg (2.9.70:!!!, Re), Müllplatz zwischen Wengen und Nellen-
bruck (14.9.70:!!!).
51. Chenopodium viride L. (Grüner Gänsefuß)
Müllplatz zwischen Wengen und Nellenbruck (14.10.70:!!!).
52. Chenopodium probstii AELL. (Probst's Gänsefuß)
Landsberg (2.9.70:!!!, Re), zwischen Wengen und Nellenbruck
(14.10.70:!!!).
53. Chenopodium vulvaria L. (Stinkender Gänsefuß)
Bahnhof Mindelheim (20.7.70:Ha, best.!!!).
54. Atriplex hortensis L. (Garten-Melde)
Müllplätze von Opferbach/Kr. Lindau (29.7.70:!!!, Bri);
Obergünzburg (16.9.70:!!!).
55. Atriplex hastata L. (Spieß-Melde)
Müllplatz Landsberg (2.9.70:!!!), Müllplatz Schongau (5.9.70:!!!).
56. Amaranthus retroflexus L. (Zurückgekrümmter Fuchsschwanz) oder
A. retroflexus X a. chlorostachys
Müllplatz am Bf. Ungerhausen (30.8.70:!!!), Müllplatz Landsberg
(2.9.70:!!!, Re), Tettwang (13.9.70:!!!), Kempten-Förderreutherweg
(22.9.70:!!!).
57. Amaranthus lividus L. (Grünlicher Fuchsschwanz)
Müllplätze von Opferbach (29.7.70:!!!) und Durach (10.9.70:!!!, Su).
58. Amaranthus albus L. (Weißer Fuchsschwanz)
Bf. Mindelheim (24.8.70:!!!), Müllplatz Kandsberg (2.9.70:!!!, Re),
Bf. Ungerhausen u. Müllplätze nächst dem Bf. Ungerhausen (12.9.70:
!!!, Ha), Herzmanns b. Kempten (8.70:!!!), Müllplatz zwischen Wengen u.
Nellenbruck (14.10.70:!!!), Steufzgen b. Kempten (30.9.70:Su).
59. Amaranthus quitensis HUMB. (Quito-Fuchsschwanz)
Müllplatz zw. Wengen u. Nellenbruck (14.10.70.:!!!).
60. Vaccaria pyramidata MED. (Kuhkraut)
Als "Vogelfutterpflanze" im Kempten (22.6.70:!!!), Kleeacker bei
Stockheim (4.7.70:!!!, Glö, Ha), Müllplatz zw. Wengen u. Nellenbruck
(14.10.70:!!!).

61. Dianthus armeria L. (Rauhe Nelke)
Straßenböschung zw. Erkheim u. Sontheim (10.10.70:Glö, best.!!).
62. Dianthus deltoides L. (Heide-Nelke)
Ottobeuren, Rand des Bannwaldes (16.7.70:Glö, best.!!).
63. Stellaria holostea L. (Große Sternmiere)
Waldstraßenrand ö. Ungerhausen (12.9.70:!!).
64. Spergularia rubra FRESL. (Rote Sternmiere)
Bf. Leutkirch (19.7.70:!!).
65. Herniaria glabra L. (Kahles Bruchkraut)
Bf. Leutkirch (19.7.70:!!).
66. Anemone ranunculoides L. (Gelbes Windröschen)
Hörmannshofen b. Kaufbeuren (9.5.70:Su), Moorbad Oberstdorf
(18.5.70:Su).
67. Pulsatilla vulgaris MILL. (Gemeine Küchenschelle)
Ruderatshofen b. Kaufbeuren (6.5.70:L. Frey,!!).
68. Hepatica nobilis MILL. (Leberblümchen)
Alte Parkanlage in Lindau (2.4.70:!!), neu für Hbu!
69. Consolida regalis S. F. GR. (=Delphinium consolida L.) (Rittersporn)
Bf. Mindelheim (24.8.70:!!).
70. Ranunculus lingua L. (Großer Hahnenfuß)
Ingenrieder Weiher (13.6.70:!!; Glö).
71. Ranunculus pseudocassubicus CHRIST. (Pseudeokassubischer Hahnen-
fuß)
Massenhaft in einem lichten Wald zw. Frechenriden u. Ottobeuren
(10.5.70:!!).
72. Ranunculus alicornus L. (ssp.???) (Gold-Hahnenfuß)
Zwischen Kleinem und Großem Ursee (25.5.70:!!), Bernbacher See b.
Kaufbeuren (14.6.70:!!), Korbsee b. Marktoberdorf (9.6.70:!!).
73. Thalictrum flavum L. (Gelbe Wiesenraute)
Oberreitnau b. Lindau (7.7.70:!!), an der Bahn n. Buchloe
(14.7.70:!!).
74. Papaver argemone L. (Sandmohn)
Gärtnerei Süßermann in Lindau (3.6.70:!!; Su).
75. Corydalis bulbosa DJ. (=C. cava SCHW. et K.) (Hohler Lerchensporn)
Mindelberg n. Mindelheim (5.70:Waltenberger, Ha).
76. Bunias orientalis L. (Zackenschötchen)
n. Türkheim (19.7.70:Ha, Heiser).
77. Barbarea intermedia BOR. (Mittleres Barbarakraut)
Verbindungsweg Walchs-Apfeltrach und Wege im "Roßkopf" bei
Dirlewang mehrfach (17.6.70:!!); Frechenrieden/Kr. Memmingen
(17.5.70:!!), Rohr b. Würzach (17.5.70:!!). Diese Art ist in
ständiger Ausbreitung!

78. Cardamine trifolia L. (Klee-Schaumkraut)
Außerlengenwang/Kr.Marktoberdorf (7.6.70:!!)
79. Dentaria enneaphyllos L. (Neunblättrige Zahnwurz)
Eglofstal b.Wangen (7.5.70:!!). Die Ursprünglichkeit dieses Vorkommens wäre zu untersuchen! Alle bisherigen Angaben für das Allgäu sind fragwürdig.
80. Arabis corymbifolia VEST. (Doldenblütige Gänsekresse)
Waltenhofener Moor (27.5.70:!!), Elitzsee b.Wangen (29.5.70:!!), hier erstmals für Hool
81. Cochlearia alpina HOOK. (Löffelkraut)
In kühlen Quellgräben zwischen Reichartsried und Schönlings mehrfach (3.70:Ha, Heiser).
82. Cameolina sativa CR. (Leindotter)
Hergatz, Straßenböschung (9.70:!!).
83. Neslia paniculata DESV. (Ackernüßchen)
Acker nordwestl.v.Stockheim (4.7.70:!!)
84. Thlaspi rotundifolium GAUD. (Rundblättriges Täschelkraut)
Trettachkieb b.Oberstdorf (18.5.70:!!).
85. Thlaspi sylvestre JORD. (Voralpentäschel)
Unkraut in der Gärtnerei Sündermann in Lindau (12.5.70:!! , Su).
86. Lepidium virginicum L. (Virginia-Kresse)
Bf.Ermengerst (12.9.70:Su.).
87. Diplotaxis tenuifolia DC. (Schmalblättriger Doppelsame)
Ruderal zwischen Stetten und Erisried (13.9.70:Ha).
88. Diplotaxis muralis DC. (Mauer-Doppelsame)
Bf.Leutkirch (4.9.70:!! , Bri).
89. Eruca vesicaria GAV. (=E.sativa MILL.) (Öl-Rauke)
Kleeacker Nw.Stockheim bei Türkheim (4.7.70:!! , Glö).
90. Sisymbrium altissimum L. (Ungarische Rauke)
Güterbf.Wangen (13.9.70:!!).
91. Drosera anglica HUDS. (Langblättriger Sonnentau)
Höllennachtal OstJ.Nassenbeuren (13.7.70:Ha, Waltenberger).
92. Sedum dasyphyllum L. (Dickblättrige Fetthenne)
Rottachberg (Eschelmüller, best.!! am 3.11.70.); neu für unsere Ho!
93. Sedum vallosum L. (Sumpf-Fetthenne)
Nördl.Hopfen am See (11.7.70:!!); der zweite nachweisbare Fundort dieser seltenen Art im Allgäu!
94. Saxifraga tridactylites L. (Dreifinger-Steinbrech)
Unkraut in der Gärtnerei Sündermann in Lindau (3.6.70:!! , Su).

95. Saxifraga rotundifolia L. (Rundblättriger Steinbrech)
Enschenstein bei Weiler (29.5.70:!!).
96. Ribes rubrum L. (Rote Johannisbeere)
Westlich Dorschhausen (19.5.70:!!;Ha).
97. Ribes nigrum L. (Schwarze Johannisbeere)
Sumpfwald beim Bf. Röthenbach (29.5.70:!!).
98. Potentilla sterilis GARCKE (Erdbeer-Fingerkraut)
Grünten bei 1500 m !' (5.70:!!).
99. Potentilla argentea L. (Silber-Fingerkraut)
Bf. Leutkirch (6.9.70:!!;Bri).
100. Potentilla norvegica L. (Norwegisches Fingerkraut)
Müllplatz nö. Kaufbeuren (9.70:!!).
101. Potentilla recta L. (Hohes Fingerkraut)
Kempten, ruderal (20.7.70:Su).
102. Potentilla pusilla HOST. (Zackenhaar-Fingerkraut)
Wertachdamm nördl. Stockheim (19.5.70:!!;Ha), Rottachberg (Fal-
kenstein) (3.11.70:!!).
103. Cotoneaster tomentosa LINDL. (Filzige Zwergmispel)
Österr. Lechtal bei Bach (1.7.70:!!).
104. Fragaria moschata DUCH. (Zimt-Erdbeere)
Rand des Bannwaldes bei Ottobeuren (13.6.70:Glö,!!).
105. Rosa rubrifolia VILL. (Rotblättrige Rose)
Österr. Lechtal bei Bach (1.7.70:!!).
106. Sarothamnus scoparius WIMM. (Besenginster)
Hahnenmoos b. Eschach (12.9.70:Su).
107. Trifolium aureum POLL. (Gold-Klee)
Waldstraßenrand sö. Ungerhausen (12.9.70:!!).
Zwischen Wengen u. Wengener Alp, ± 900 m (12.11.70:!!).
108. Trifolium arvense L. (Acker-Klee)
Güterbf. Wangen (13.9.70:!!).
109. Trifolium incarnatum L. (Inkarnat-Klee)
An der Verbindungsstraße Heimenegg-Mindelheim (17.6.70:Ha).
110. Lotus uliginosus SCHK. (Sumpf-Hornklee)
Oberreitnau b. Lindau (8.70:!!).
111. Vicia dumetorum L. (Hecken-Wicke)
Waldränder bei westl. Weicht (19.5.70:!!;Ha) und bei Baisweil
(9.5.70:!!), Ittelsburg (4.7.70:Su).

112. Vicia faba L. (Saubohne)
Vielfach adventiv aufgetreten: Eisenbolz b. Weitnau (23.8.70:Su),
Bf. Sonthofen (7.70:!!).
113. Linum viscosum L. (Klebriger Lein)
Bannwaldsee (5.7.70:Su).
114. Euphorbia lathyris L. (Kreuzblättrige Wolfsmilch)
Müllplatz Rothenstein b. Grönenbach (10.70.:!!).
115. Evonymus latifolius MILL. (Breitblättriger Spindelstrauch)
Reichartsried u. Schönlings (8.70:Ha).
116. Staphylea pinnata L. (Pimpernuß)
Hangnach b. Lindau (12.5.70:!!), Su).
117. Acer campestre L. (Feld-Ahorn)
Rechberg und Unggenried b. Mindelheim (Ha), Dorschhausen (!! , Ha),
Altensteig (Ha), Weicht (!! , Ha), Lechsberg am Lech (Ha, !!).
118. Tilia platyphyllos SCOP. (Sommer-Linde)
Wangen (7.70:!!), zwischen Walchs und Saulengrain (17.6.70:Ha),
zwischen Ronsberg und Oberweiler (25.4.70:Ha).
119. Malva alcea L. (Siegmarswurz)
Eriosenhofen (7.11.70:!!).
120. Hypericum humifusum L. (Niederliegendes Johanniskraut)
Zwischen Wengen und Wengener Alp, ± 850 m, (12.11.70:!!).
121. Viola collina BESS. (Hügel- Veilchen)
Ruine Kalden b. Altusried (25.4.70:!!), Ruine Marstetten (29.4.70:!!).
122. Peplis portula L. (Sumpf-Quendel)
Feuchter Waldweg am "Hochfürst" b. Erisried/Kr. Mindelheim (hier
am 5.7.70: von Ha entdeckt, best.!!). Seit über 100 Jahren der
erste sichere Wuchsort im bayerischen Allgäu!
123. Epilobium alpestre KROCKER (Quirlblättriges Weidenröschen)
Waldrand oberhalb dem Eschacher Weiher gegen den Schwarzen Grat
zu (18.8.70:!! , Klement, Patzke).
124. Circaea alpina L. (Alpen-Hexenkraut)
Kürnacher Wald. (10.10.70:Su).
125. Scandix pecten-veneris L. (Venuskamm)
Güterpf. Kempten (3.7.70:!!).
126. Coriandrum sativum L. (Koriander)
Müllplatz nÖ. Kaufbeuren (9.70:!!).
127. Pleurospermum austriacum HOFFM. (Österr. Rippensame)
Schwangau (5.7.70:Su).
128. Cicuta virosa L. (Wasser-Schierling)
Mittelsee (10.7.70:!!), und Langensee (13.9.70:!!) in Hbo.

129. Berula angustifolia M.et KOCH (Aufrechter Merk)
Rickenbach/Lindau (5.70:!!), Dorschhausen (19.5.70:!!), Ha),
östlich Nassenbeuren (13.7.70:Ha,!!).
130. Montropa hypopitys L. (Fichtenspargel)
Gennachhausener Moor b.Kaufbeuren (9.70:!!).
131. Primula vulgaris HUDS. (Stengellose Primel)
Eglofstal b.Wangen (7.5.70:!!), auch mit Bastard Primula
vulgaris X elatior!
132. Gentiana asclepiadea L. (Schwalbenwurz-Enzian)
Nach Norden vorgeschobene Standorte: Hillenbachtal nö.Nassen=
beuren (Ha), Moosbergmoos zwischen Wörishofen und Hartental (Ha),
Walchs-Wimpfler Moos (Ha)).
133. Peucedanum oreoselinum MOENCH (Berg-Haarstrang)
Waldrand am Amberger Hölzle bei Wiedergeltingen(5.7.70:Ha).
134. Gentiana utriculosa L. (Schlauch-Enzian)
Kemptener Wald (14.6.70:Su), Schwangau (20.6.70:Su).
135. Omphalodes verna MOENCH (Frühlings-Nabelnuß)
Ruine Marstetten (7.5.70:Glö, best.!!), Eglofstal b.Wangen(7.6.70:!!).
136. Pulmonaria mollis WOLFF. (Weiches Lungenkraut)
An der Wertach zwischen Biessenhofen und Ebenhofen (6.5.70:!!), Su);
der höchste bisher bekannte Wertach-Standort dieser Art!
137. Symphytum tuberosum L. (Knoten-Beinwell)
Alte Parkanlage in Lindau (7.5.70:!!). Die Ursprünglichkeit ist
nicht klar nachweisbar, doch läßt die Begleitflora - Lathyrus
vernus, Dentaria digitata, Anemone narciss.etc. - auf Ursprünglich=
keit schließen.
138. Ajuga pyramidalis L. (Pyramiden-Günsel)
Im Österr.Lechtal am Abstieg von der Jöchelspitze nach Bach
(1.7.70:!!).
139. Teucrium montanum L. (Berg-Gamander)
Rücken des Senkele bei Seeg (18.4.70:!!).
140. Stachys alpina L. (Alpen-Ziest)
Emerlanden im ausgehenden Kürnachtal (14.10.70:!!), Bri).
141. Physalis alkekengi L. (Judenkirsche)
Müllplatz Sonthofen (4.10.70:!!), Müllplatz Aitrang (23.8.70:!!).
142. Capsicum annum L. (Paprika)
Müllplatz Buxheim, voll entwickelt und mit Früchten (19.9.70:!!).
143. Datura stramonium L. (Stechapfel)
Heuer an mehreren Plätzen adventiv:Müllplatz Rothenstein bei
Grönenbach (17.8.70:!!), Müllplatz Buxheim (19.9.70:!!), Steufz=
ger Wald bei Kempten (30.8.70:Su, best.!!).

144. Verbascum thapsiforme SCHRAD. (Großblütige Königskerze)
Müllplätze zwischen Landsberg und Igling (2.9.70:Regele,!!);
nö.Kaufbeuren (16.9.70:!!).
145. Mimulus guttatus DC (Gauklerblume)
Ittelsburg b.Grönenbach (8.70:Su).
146. Veronica triphyllos L. (Dreiblättriger Ehrenpreis)
Zwischen Winterrieden und Babenhausen (21.4.70:!!), Keller=
berg b.Kellmünz (24.5.70:!!); bei Sontheim/Kr.Memmingen abermals
in Menge (!!).
147. Veronica montana JUST. (Berg-Ehrenpreis)
Buchenwälder östl.Heimenegg und Mindelau (7.70:Ha), "Roßkopf=
forst" bei Dirlwang mehrfach (17.6.70:Ha), Goldachtal bei
Kürnach (26.7.70:Su).
148. Veronica scutellata L. (Schild-Ehrenpreis)
Zwischen Oberegg und Warnisried (13.6.70:!!,Glö), Degermoos b.
Hergatz (29.7.70:Bri,!!), Oy (13.9.70:Su), Salmaser Höhe b.
Nesselwang (11.10.70:Su).
149. Digitalis purpurea L. (Purpur-Enzian)(Roter Fingerhut)
Zwischen Heimenegg, "Jägersruh" und Altenstaig (7.70:Ha), zw.
St.Anna und Kirchdorf (18.4.70:Ha,Waltenberger), Goldachtal b.
Kürnach (26.7.70:Su).
150. Melampyrum cristatum L. (Kamm-Wachtelweizen)
Erstmals seit Jahrzehnten im Allgäuer Bereich:Wertachdämme nö.
Stockheim (28.6.70:BBG-Exkursion, von Ha auch linksseitig ent=
deckt.
151. Rhinanthus serotinus SCH.et THELL. (großer Klappertopf)
"Heuried" bei Rickenbach-Lindau (7.7.70:!!).
152. Orobanche lucorum A.BR. (Hain-Sommerwurz)
Rottach gegen Rottachberg (3.11.70:!!).
153. Orobanche vulgaris POIR. (Labkraut-Sommerwurz)
Zwischen Stockheim und Bf.Türkheim mehrfach (28.6.70:BBG-Exkur=
sion), südlich Pforzen b.Kaufbeuren (29.6.70:!!), Oberbeuren b.
Kaufbeuren (29.6.70:!!).
154. Orobanche salviae F.W.SCHULTZ (Salbei-Sommerwurz)
Zwischen Spielmannsau und dem Steigbachtobel auf *Salvia glutinosa*
(29.8.70:!!, Gutermann).
155. Utricularia ochroleuca HARTM. (Blaßgelber Wasserschlauch)
Kreuweiher im württembg.Hbo, entdeckt von Dr.Goers, best.!!,
(13.9.70:!!).
156. Globularia cordifolia L. (Herzblättrige Kugelblume)
Rottachberg (3.11.70:!!).

157. Lonicera coerulea L. (Blaue Heckenkirsche)
Eldern b.Ottobeuren (30.5.70:Glö, best.!!), Bernbeuren (7.6.70:!!), Gennachhausener Moor b.Kaufbeuren (7.6.70:!!, Glö), Stillachauen b.Oberstdorf (17.6.70:!!), Illerauen b.Rubi (8.70:!!), Holzgau im Höhenbachtal (8.70:!!).
- 158! Campanula latifolia L. (Breitblättrige Glockenblume)
Spielmannsau (29.8.70:!!, Gutermann), nordwestl.Unter-Igling (2.9.70:Regele, best.!!), Untermeitingen (Regele).
159. Campanula persicifolia L. (Pfirsichblättrige Glockenblume)
Zwischen Saulengrain und Walchs ().70:Ha.).
160. Phyteuma nigrum F.W.SCHM. (Schwarze Teufelskralle)
Dorschhausen und Altenstaig b.Mindelheim mehrfach (19.5.70:!!, Ha), um Bad Wörishofen zahlreich (6.70:Ha, Haiser,) schon von Oberseider 1930 erwähnt. -östlich Köngetried im Mindeltal mehrfach (17.6.70:Ha).
161. Gnaphalium norvegicum GUNN. (Norwegisches Ruhrkraut)
Kalle-Alpe bei Thalkirchdorf (2.8.70:Su).
162. Inula salicina L. (Weiden-Alant)
Westerheim Kr.Memmingen (28.8.70:Ha, best.!!), in diesem Bereich selten!
163. Ambrosia elatior L. (Hohe Ambrösia)
Immer häufiger als "Vogelfutterpflanze":Landsberg (2.9.70:!!, Regele), nö.Kaufbeuren (16.9.70:!!), Steufzger Wald b.Kempten (30.8.70:Su, best.!!), zw.Kempten und Rothkreuz (8.70:Theo Müller), Sulzberg (28.10.70:Eschelmüller,!!) etc.
164. Inula hirta L. (Rauher Alant)
"Bauernloch" nw.Stockheim (28.6.70:Lorenz Müller, BBG-Exkursion).
165. Xanthium strumarium L. (Gewöhnliche Spitzklette)
Müllplatz Obergünzburg (16.9.70:!!).
166. Guizotia abyssinica Cass. (Ramtillkraut)
Landsberg mehrfach (2.9.70:!!, Regele), zwischen Wengen und Nellenbruck (14.10.70:!!) etc. Heuer nirgends blühend!
167. Galinsoga parviflora CAV. (Kleinblütiges Knopfkraut)
Bf.Leutkirch (6.9.70:!!).
168. Anacyclus clavatus PERS. (Bertram)
Kleeacker nw.Stockheim (4.7.70:!!, Glö, best.Ha).
169. Achillea macrophylla L. (Großblättrige Schafgarbe)
Gunzesrieder Tal, Sipplinger Kopf (19.7.70:Su).
170. Chrysanthemum segetum L. (Saat-Wucherblume)
Bf.Mindelheim (4.7.70:Glö,!!).

171. Homogyne alpina CASS. (Alpenlattich)
Seeger Berg bei Seeg (4.10.70:!!), Schwarzer Grat(12.11.70:!!).
172. Senecio helenites SCH.et THELL. (Spatelförmiges Kreuzkraut)
Südl.u.nördl. Wörishofen (5.70:Ha,Heiser).
173. Carduus acanthoides L. (Weg- Distel)
Oberhalb Märzisried b.Kaufbeuren (10.70:!!).
174. Silybum marianum GAERTN. (Mariendistel)
Ruderale "Gartenpflanze" in Mindelheim (14.10.70:Ha).
175. Centaurea montana L. (Berg-Flockenblume)
Hörmannshofen b.Kaufbeuren (19.5.70:Su).
176. Centaurea alpestris HEG. (Alpen-Flockenblume)
Laufbichler Kirchle am Daumen (23.7.70:!!).
177. Aposeris foetida LESS. (Stinkender Hainsalat, Hainlattich)
Hörmannshofen b.Kaufbeuren (9.5.70:Su).
178. Picris echioides L. (Wurmlattich)
Müllplatz zwischen Wengen u.Nellenbruck Kr.Kempten (14.10.70:!!).
179. Cicerbita alpina WALLR. (Alpen-Milchlattich)
Goldachtal bei Kürnach (26.7.70:Su).

III. Bestätigung bemerkenswerter Vorkommen:

1. Spiranthes aestivalis RICH. (Sommer-Drehwurz)
Heuried bei Lindau-Rickenbach (18.7.70:!!); damit sind alle
Vorkommen in bayer.Hbu bestätigt!
2. Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz)
Hangnach bei Lindau (12.5.70:Su,!!).
3. Lathyrus vernus BERNH. (Frühlings-Platterbse)
Wasserburger Bühel bei Enzisweiler (7.5.70:!!).
4. Euphorbia amygdaloides L. (Mandelblättrige Wolfsmilch)
Ruine Marstetten (29.4.70:!!).
5. Chondrilla chondrilloides FR. (Alpen-Knorpelsalat)
Spärlich im Ostrachkie bei Hinterstein; erstes bestätigtes
Iller-Vorkommen (26.8.70:!!).
6. Scorzonera humilis L. (Niedrige Schwarzwurzel)
"Heuried" Rickenbach-Lindau (3.6.70:!!).
7. Saussurea discolor DC. (Zweifarbige Alpenscharte)
Kirchendach am Schrecksee (12.7.70:!!).

IV. Nachträge und Berichtigungen:

Nach Fertigstellung der Pflanzenliste haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Seite 24, Ziffer 5:

nicht Amaranthus graecizans, sondern Amaranthus thunbergii MOQ.
var. macrosepalus (det.:Aellen).

Seite 24, Ziffer 8:

nicht Chenopodium opulifolium, sondern
Chenopodium bilcomayense; stammt aus Südamerika, (det.:Aellen).

Nachträge:

Seite 24:

- 5a. Amaranthus bouchonii THELL. (Bouchons Fuchsschwanz)
Adventiv am Hildegardis-Gymnasium in Kempten (7.9.70:!!,
det.:Aellen)
- 8a. Chenopodium hircinum SCHRAD. (Bocks-Gänsefuß)
Müllplatz Oberstdorf (7.10.70:!!), det.:Aellen).

Anschrift des Verfassers: Dr. Erhard Dörr
Studiendirektor
8960 Kempten/Allgäu
Bodmanstr. 30/2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [14_2](#)

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: [Ergebnisse der Allgäu-Floristik für das Jahr 1970. 23-38](#)