© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Erhard Dörr:

Ergebnisse der Allgäu-Floristik Arbeitsbericht für 1971

Für besondere Hilfe bei der Erforschung der Allgäu-Phanerogamen im Jahre 1971 habe ich zu danken: dem Direktor der Botanischen Staatssammlungen München, Herrn Universitätsprofessor Dr.H.MERXMÜLLER, und seinen Mitarbeitern, Herrn Dr.LIPPERT, Herrn Professor Dr.A.BRESINSKY und Herrn Dr.GRAU, Herrn Professor P.AELLEN (Basel) für die Bestimmung der Amaranthen und Chenopodien, Herrn Dr.PATZKE (Aachen) für Hinweise zur Familie der Gramineae. - Zahlreiche Fundortangaben verdanke ich Herrn Rektor G.W.BRIELMAIER (Bri), Wangen, Herrn E.GLÖGGLER (Glö), Ottobeuren, Herrn H.HACKEL (Ha), Mindelheim, Herrn R.REGELE (Re), Landsberg/Lech, und Frau E.SUTTER (Su), Kempten.
Wertvolle Hinweise gaben mir ferner Herr Dr.W.BRAUN, München, Herr O.BRETTAR, Kaiserslautern, Herr H.HORNIK, Altstädten, Herr Oberlehrer A.ESCHELMÜLLER (E), Sulzberg, Frau KOHLHAUPT, Sonthofen, Frl.B.KÜHN, Kempten, Herr Dr.O.KLEMENT, Kreuzthal, Herr K.LÜBENAU, Sankt Mang, Herr Professor L.MÜLLER, Kempten, Herr Th.MÜLLER, Kempten, Herren Apotheker sen.u.jun.SCHRÖPPEL, Pfronten-Ried; Herr W.PÖTZL, (Geschäftsführer des Bergwachtabschnittes Allgäu) führte mich auf schwierigen Bergtouren und gab mir ebenfalls floristische Hinweise.

I. Neue Arten im Allgäu

1. Lagurus ovatus L. (Sammetgras)
   Als "Vogelfutterpflanze" im Garten von Th.Müller an der Rottach in Kempten. Stammt aus dem Mittelmeergebiet.(28.7.71:!!).
2. Amaranthus graecizans L. (Schmalblättriger Fuchsschwanz)
   Müllplatz nordwestlich Landsberg/Lech (25.8.71:!!,Re)det:Aellen.
3. Kochia scoparia (L.)SCHRAD. (Ruten-Radmelde)
   Müllplatz Aitrang, zahlreich (17.9.71:!!).
4. Helleborus foetidus L. (Stinkende Nieswurz)
   Parkanlage am Rande von Kaufbeuren; nicht gepflanzt, sondern vermutlich vor Jahrzehnten mit Baumsetzlingen eingeschleppt. (21.3.71:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

5. Vitis vinifera L. (Weinrebe)

Auf den Müllplätzen von Sonthofen (4.8.71:!!) und Rothenstein bei Grönenbach (8.71:!!). Adventiv.

6. Primula pubescens JACQU. (=Pr.hirsuta X auricula)(Flaumige Primel)

Am Grünten bei Immenstadt, an schwer zugänglicher Stelle. Hier von HORNIK (Altstädten) entdeckt und von !! am 1.5.1971 bestätigt. Der Bastard bildet an dieser Stelle eine kleine Kolonie. Völlig ungeklärt bleibt die Frage, wo der Elternteil -Primula hirsuta- geblieben ist. Hingegen findet sich Primula auricula in nächster Umgebung in Menge. Die weit zerstreuten, jeweils völlig isolier= ten Vorkommen von Primula pubescens in den deutschen Kalkalpen wären einer besonderen Untersuchung wert.

7. Galium wirtgenii F.SCHULTZ (=G.praecox K.H.L.)(Frühes Labkraut)

Adventiv im Güterbahnhof Leutkirch (30.5.71:!!), ursprünglich und sehr zahlreich auf Sumpfwiesen nahe den Sameister Weihern bei Roßhaupten (15.6.71:!!). Fällt durch die frühe Blütezeit auf und unterscheidet sich nicht zuletzt durch diese von dem eng verwandten und habituell sehr ähnlichen Galium verum.

8. Utricularia ochroleuca HARTM. (Blaßgelber Wasserschlauch)

Gräben bei Volklings nahe dem Stockenweiler Weiher (Krs.Lindau). Hier am 15.8.1969 von Bri entdeckt und von !! 1969 und 1971 bestätigt. Damit reicht die Verbreitung dieser unauffälligen, meist nichtblühenden Art vom württembg.Allgäu bis ins bayerische Allgäu herüber. Dr.CASPAR (Jena), Spezialist für die Utricularia-Gruppe, hat die Determination bestätigt!

II. Bemerkenswerte neue Wuchsorte:

1. Ophioglossum vulgatum L. (Natternzunge)

Sumpfwiesen am Anspachweiher bei Oberreitnau (24.8.71:!!).

2. Taxus baccata L. (Eibe)

Tobelwald bei Niedersonthofen (25.4.71:!!), Oberstein bei Scheid= egg (5.10.71:!!), am Hauchenberg bei Waltrams (30.4.71:!!), Vorderburg am Rottachberg (25.9.71:!!)? Felswände zwischen Christlesee und Spielmannsau (9.10.71:!!).

3. Picea abies (L.)H.K. (Fichte)

Am Nebengipfel des Schneck (im Volksmund auch "Himmelhorn"), in Zwergform bei 2250 m(!) (23.7.71:!!).

4. Sparganium angustifolium MICH. (Schmalblättriger Igelkolben)

Am Grünen Kopf (auf deutscher Seite) oberhalb Lechleiten (29.8.71:!!). Zweiter Fundort im Allgäu!

5. Sparganium emersum REHM. (Einfacher Igelkolben)

Stockenweiler Weiher (Krs.Lindau) (24.8.71:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

6. Potamogeton alpinus BALB. (Alpen-Laichkraut)

Moortümpel nördl.Wipfel bei Saulengrain (16.6.71:!!,Glö,Ha), "Herrgottsried bei Wurzach (1.7.71:!!).

7. Potamogeton angustifolius PRESL. (Schmalblättriges Laichkraut)

Mariental bei Ravensburg (10.7.71:!!).

8. Potamogeton berchtoldii FIEBER (Berchtolds Laichkraut)

Rohrsee bei Wurzach (3.8.71:!!,Klement), determ.Merxmüller/ Lippert.

9. Bromus commutatus SCHRAD. (Verwechselte Trespe)

Nahe dem Bf.Stetten (16.9.71:!!;determ. Lippert.

10. Festuca amethysteina L. (Amethyst-Schwingel)

Trockenhang am Krankenhaus Schongau (4.7.71:!!).

11. Hordeum jubatum L. (Mähnengerste)

Zahlreich an einer Straßenböschung nahe dem Bf.Stetten (16.9.71:!!,Ha).

12. Calamagrostis canescens ROTH. (Sumpf-Reitgras)

Sogenanntes "Jauchenmoos" bei Oberstdorf (7.7.71:!!); determ.:Merxmüller. Neu für die Allgäuer Alpen!

13. Alopecurus aequalis SOB. (Roter Fuchsschwanz)

Brüchlins bei Ottobeuren (15.6.71:!!,Glö), am Grünenkopf oberhalb Lechleiten zw. 1750 und 1830 m sehr zahlreich auf deutschem und Tiroler Boden (29.8.71:!!).

14. Anthoxanthum puellii LEC. (Grannen-Ruchgras)

Güterbf.Memmingen (2.6.71:!!), adventiv.

15. Echinochloa colonum LINK.

Schuttplatz Rothenstein bei Grönenbach (13.8.71:!!), Schuttplatz Sonthofen (24.8.71:!!).

16. Sorghum vulgare PERS. (Mohrenhirse)

Als "Vogelfutterpflanze" im Garten von Th.Müller in Kempten (Rottach)(28.7.71:!!).

17. Poa remota FORS. (Entferntähriges Rispengras)

In feuchten, eschenreichen Senken des Roßkopfforstes bei Dirlewang (17.6.71:Ha).

18. Cyperus fuscus L. (Braunes Zypergras)

Teichböden bei Sontheim-Laubers/Krs.Memmingen (16.9.71:!!).

19. Eriophorum gracile KOCH. (Schlankes Wollgras)

Unterthalhofen bei Fischen (7.7.71:!!), Altstädten b.Sonthofen (10.71:Su); der Fundort "Jauchenmoos" nw.Oberstdorf konnte bestätigt werden, ist aber durch Müllablage schwer bedroht (3.7.71:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

20. Schoenoplectus tabernaemontani PALLA (Graue Seebinse)

Kiesgrube nahe dem Bf.Lamerdingen (7.8.71:!!,Ha); 2.Vorkommen in unserem Untersuchungsgebiet!

21. Carex bohemica SCHREB. (Zypergras-Segge)

Trockengelegter Weiher nahe Hattenburg b.Ochsenhausen (4.8.71: Glö,!!).

22. Carex heleonastes EHRH. (Mohrsumpf-Segge)

Sehr zahlreich auf einer von Drainage bedrohten Sumpfwiese nahe dem Schönleitenmoos b.Hellengerst (5.7.71:!!,Su).

23. Carex disticha HUDS. (Kamm-Segge)

"Koppenhof" bei Bronnen nahe Landsberg (29.5.71:!!,Re).

24. Carex elongata L. (Langährige Segge)

Ebenda! (29.5.71:!!,Re).

25. Carex tomentosa L. (Filz-Segge)

Laimnau an der Argen (Trockenwiesen)(30.6.71:!!).
Neu für das Westallgäu!

26. Carex pseudocyperus L. (Scheinzyper-Segge)

Marienthal bei Ravensburg (10.7.71:!!).

27. Cladium mariscus (L.)POHL (Binsen-Schneide)

Attlesee b.Nesselwang (2.8.71:!!)

28. Spirodela polyrrhiza SCHLEID. (Teichlinse)

Südöstlich Landsberg in einem Tümpel (25.8.71:!!,Re).

29. Juncus squarrosus L. (Sparrige Binse)

Moorrand bei Rechtis (10.6.71:!!,Su), zwischen Diepolz und dem Hauchenberggrat massenhaft (21.7.71:!!).

30. Juncus bulbosus L. (Rasen-Binse)

Hattenburg b.Ochsenhausen (4.8.71:!!,Glö).

31. Muscari botryoides (L.)MILL. (Kleine Traubenhyazinthe)

Bf.Roßhaupten, Litzauer Schleife beiderseits des Lechs (8.5.71:!!,Su).

32. Streptopus amplexifolius DC (Knotenfuß)

Eckschrofen b.Hinterstein (12.8.71:Glö,!!).

33. Galanthus nivalis L. (Schneeglöckchen)

Tobel bei Ruhlands nahe Opfenbach (21.3.71:!!,Bri), Herbis= hofen bei Memmingen (21.3.71:!!).

34. Narcissus pseudonarcissus L. (Gelbe Narzisse)

Dietlried nahe Sachsenried bei Schongau (9.5.71:!!).

© Volkshochschule Kempten/Download unter www.biologiezentrum.at

35. Iris sibirica L. (Sibirische Schwertlilie)

"Koppenhof" und Marienhof bei Landsberg (4.7.71:Re,!!); Litzauer Schleife am Lech (4.7.71:!!,Su), Egelsee bei Bernbeuren (4.7.71:Su,!!).

36. Crocus albiflorus KIT. Weißer Safran)

Zwischen Syrgenstein (Eglofstal) und Wolfertshofen (4.4.71:!!), Hirschbergweg bei Scheidegg (15.4.71:Su,!!), zwischen Schwarzerd und Wengen am Eingang ins Wengener Tal (18.4.71:!!).

37, Cypripedium calceolus L. (Frauenschuh)

Hochfirstwald bei Eutenhausen nahe Markt Rettenbach (Mai 1971: Steininger, Stadler, Ha).

38. Cephalanthera rubra RICH. (Rotes Waldvögelein)

Mehrfach um Obergünzburg (Juli 71:Ludwig Frey/Obergünzburg).

39. Listera cordata R.BR. (Herz-Zweiblatt)

Am Schüsser nahe der Kanzelwand bei etwa 1850-1900 m (6.8.71:!!).

40. Listera ovata R.BR. (Zweiblatt)

Am Schüsser bei 1900 m (6.8.71:!!).

41. Spiranthes spiralis CHEV. (Herbstliche Drehwurz)

Rottachberg bei Rettenberg (1.10.71:!!, Senkele bei Seeg ca 1000m (26.9.71:!!, "Brandstadt"bei Seeg (26.9.71:!!).

42. Coeloglossum viride HARTM. (Hohlzunge)

Hauchenberg bei Diepolz (21.7.71:!!).

43. Ophrys apifera HUDS. (Bienen-Ragwurz)

Am Lech nahe Burggen (4.7.71:!!,Su). Mit diesem Fund ist es gelungen, diese Art, wenn auch nur in einem Exemplar, für unser Gebiet erstmals seit Jahren wieder zu bestätigen!

44. Orchis pallens L. (Bleiches Knabenkraut)

Rohrach bei Emsgritt, bayer.Westallgäu(26.5.71:Nusser,Enderle, Bri,!!).

45. Hammarbya paludosa O.KUNTZE (Weichstendel)

Elbsee bei Aitrang (6.9.71:Ha,Volk;bestätigt:!!,10.9.71).

46. Corallorhiza trifida CHAT. (Korallenwurz)

"Teufelsküche" im Kemptener Wald (19.6.71:!!,Ha,etc.).

47. Salix pentandra L. (Lorbeer-Weide)

Linkes Lechufer südl.Landsberg und "Marienhof" b.Landsberg (29.5.71:Re,!!).

48. Alnus viridis DC (Grün-Erle)

Am Hauchenberg bei Waltrams und Bärwies bei Schrattenbach (Mai 71:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

49. Viscum album ssp.album (L.) (Laubholz-Mistel)

Syrgenstein auf Populus nigra (4.4.71:!!), Herfatz b.Wangen (7.4.71:Bri,!!)
ssp.abietis ABR. (Tannen-Mistel):
Schleifertobel an der Adelegg b.Rohrdorf (18.4.71:!!).

50. Rumex scutatus L. (Schild-Ampfer)

Alte Weinbergsmauern zwischen Bregens und Lindau(10.6.71:!!).

51. Chenopodium hybridum L. (Unechter Gänsefuß)

Zwischen Benningen und Hawangen (30.8.71:!!), Bf.Wangen (18.7.71:!!).

52. Amaranthus lividus L. (Aufsteigender Fuchsschwanz)

Sch uttplatz nw.Landsberg (25.8.71:!!,Re),determ.:Aellen/Basel.

53. Amaranthus quitensis H.B.K. (Quito-Fuchsschwanz)

Schuttplatz nw.Landsberg (25.8.71:!!,Re).

54. Amaranthus standleyanus

Schuttplatz Landsberg (25.8.71:!!,Re),determ.:Aellen/Basel.

55. Viscaria vulgaris BERNH. (Pechnelke)

Aletshausen bei Krumbach (3.6.71:!!).

56. Cerastium semidicandrum L. (Sand-Hornkraut)

Güterbf.Leutkirch (30.5.71:!!).

57. Anemone vernalis L. (Frühlings-Küchenschelle)

Hoher Ifen (23.5.71:entdeckt von Hörnik, bestätigt:!!), Gottesacker (13.6.71:Su, bestätigt:!!). Die ersten Hinweise auf diese Wuchsorte verdanken wir Frau Kohlhaupt (Sonthofen). Damit ist die Frühlingsküchenschelle im Allgäu an fünf Orten nachweisbar!

58. Anemone pulsatilla L. (Gewöhnliche Küchenschelle)

Litzauer Schleife bei Burggen und massenhaft bei Schongau (8.5.71:Su,!!).

59. Ranunculus scleratus L. (Gift-Hahnenfuß)

Litzishofen bei Waltershofen /Westallgäu (25.7.71:!!).

60. Ranunculus auricomus L. (Gold-Hahnenfuß) (Kleinart?)

Erkheim gg.St.Johann (7.5.71:!!), zwischen Unterkammlach und Breitenbrunn (14.7.71:Ha).

61. Eschscholtzia californica CHAM. (Escholtzie)

Ruderal an Wegrändern in Dirlewang (Juli 71:Ha,Waltenberger).

62. Sinapis alba L. (Weißer Senf)

Schuttplatz nw.Landsberg (7.8.71:!!,Ha), "Vogelfutterpflanze" in Mindelheim (August 71:Ha.).

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

63. Rapistrum rugosum ALL. (Runzeliger Repsdotter)

Bei Spedition "Dachser" Kempten (24.6.71:Su,!!).

64. Bunias orientalis L. (Orientalisches Zackenschötchen)

Kaufbeuren und an der Bahn zwischen Buchloe und Beckstetten (Juni 71:!!); Ruderal in Mindelheim (August 71:Ha).

65. Berteroa incana DC (Grau-Kresse)

Östlich Mindelheim (Juni 71:Ha) und zw.Bf. und Ort Türkheim (26.9.71:Ha), ferner Landsberg (Sept.71:Re).

66. Kernera saxatilis RCHB. (Kugelschötchen)

Rottachberg bei Rottach (25.4.71:!!).

67. Cardamine bulbifera CRANTZ. (Zwiebel-Zahnwurz)

Spielmannsau, über 1000 m (12.5.71:Su, bestätigt:!!).

68. Barbarea intermedia BOR. (Mittleres Barbarakraut)

Spielmannsau bis 1050 m (18.5.71:Su,!!).

69. Erysimum cheiranthoides L. (Acker-Schöterich)

Schuttplatz nw.Landsberg (7.8.71:!!,Ha).

70. Eruca sativa MILL. (Raukenkohl)

Kleeacker zw.Mindelheim und Nassenbeuren (30.6.71:Ha), Straßenrand bei Görisried am Kemptener Wald (5.9.71:!!).

71. Saxifraga tridactylites L. (Dreifinger-Steinbrech)

Güterbf.Leutkirch (30.5.71:!!).

72. Saxifraga mutata L. (Kies-Steinbrech)

Tobel bei Niedersonthofen (25.4.71:Th.Müller, bestätigt:!!); der Fundort "Schleifertobel" an der Adelegg bei Rohrdorf wurde bestätigt (30.4.71:!!).

73. Cotoneaster tomentosa LINDL. (Filzige Zwergmispel)

Klammhütte am Salober beim Giebelhaus (Sept.71:!!).

74. Potentilla argentea L. (Silber-Fingerkraut)

Magerrasen bei Zaisertshofen spärlich (7.8.71:!!,Ha).

75. Potentilla pusilla ROST. (Flaum-Fingerkraut)

Mehrfach bei Vorderburg am Rottachberg (25.9.71:!!), Hoher Falken am Rottachberg (12.4.71:!!).

76. Rosa omissa LES. (Sammet-Rose)

Diepolz am Hauchenberg (15.9.71:!!), an der Adelegg bei Rohrdorf-Haslach (21.9.71:!!);Determ. bestätigt:Merxmüller.

77. Genista germanica L. (Deutscher Ginster)

Heggelbach bei Leutkirch (30.5.71:!!), Gospoldshofen (Juni 71: !!), Hochfirst bei Kirchstetten nahe Mindelheim (3.7.71:Ha.).

© Volkshochschule Kempten/Download unter www.biologiezentrum.at

78. Trifolium aureum POLL. (Goldklee)
Zaisertshofen bei Mindelheim (7.8.71:!!,Ha).

79. Trifolium arvense L. (Acker-Klee)
Ebenda (7.8.71:!!,Ha).

80. Trifolium rubens L. (Purpurklee)
Trockenhang bei Ruderatshofen (31.8.71:!!).

81. Trifolium alexandrinum L. (Ägyptischer Klee)
Straßenböschung bei Bf.Stetten nächst Mindelheim (16.9.71:!!,Ha).

82. Trifolium incarnatum L. (Inkarnat-Klee)
Ebenda (16.9.71:!!,Ha).

83. Vicia dumetorum L. (Heckenwicke)
Schleifertobel an der Adelegg (18.4.71:!!)

84. Vicia villosa ROTH. (Zottelwicke)
Straßenböschung am Bf.Stetten (16.9.71:!!,Ha).

85. Cicer arietinum L. (Kichererbse)
Schuttplatz Sonthofen (3.7.71:!!).

86. Geranium sanguineum L. (Blut-Storchschnabel)
Trockenhänge bei Schongau (4.7.71:!!).

87. Euphorbia dulcis L. (Süße Wolfsmilch)
Hinterhornbach noch zw. 1300 und 1400 m (26.6.71:!!), Spielmannsau (Juni 71:!!).

88. Ilex aquifolium L. (Stechpalme)
Kegelkopf (9.10.71:!!, Erstfinder:Thaddäus Steiner/Lindau), Schattenberg bei Oberstdorf (17.10.71:!!,Pötzl; Erstfinder: Thaddäus Steiner); die lange unbestätigten Vorkommen Gerbertobel (11.8.71:!!) und Oberstein bei Scheidegg (5.10.71:!!) konnten neu gefunden werden. Rohrach (10.71:!!, Erstfinder Brielmaier); im Westallgäu östl.Kreßbronn auf württemb.und bayerischem Boden (entdeckt:Bri, bestätigt:!! 24.10.71)

89. Acer campestre L. (Feld-Ahorn)
Am Rottachberg bei Vorderburg bei 900 m (25.9.71:!!).

90. Tilia cordata MILL. (Winter-Linde)
Im "Eichet-Hölzle" bei Mindelau (14.6.71:Ha).

91. Elatine hexandra DC (Sechsmänniger Tännel)
In vielen submersen Exemplaren im Rother Weiher bei Roth a.d. Roth (30.7.71:!!); der alte Wuchsort bei Ochsenhausen konnte ebenfalls bestätigt werden (!!).

92. Viola riviniana ECHB. (Hain-Veilchen)
Nw. Stockheim (3.5.71:!!).

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

93. Viola rupestris F.W.SCHMIDT (Sand-Veilchen)
Lechauen bei Kaufering (16.4.71:Re, bestätigt:!!).

94. Viola collina BESS. (Hügel-Veilchen)
Östlich Ellighofen am Lech (16.4.71:!!,Re), Kardorf/Iller (13.4.71:!!).

95. Epilobium collinum C.GM. (Hügel-Weidenröschen)
Eckschrofen bei Hinterstein (12.8.71:!!,Glö).

96. Chaerophyllum temulum L. (Hecken-Kälberkropf)
Güterbf.Wangen (30.5.71:!!).

97. Ammi visnaga LAM. (Zahnstocher-Knorpelmöhre)
Schuttplatz nw.Landsberg (7.8.71:!!,Ha,Re).
Schuttplatz Aitrang (17.9.71:!!).

98. Sium erectum HUDS. (Aufrechter Merk)
Häufig in Wassergräben zwischen Mindelheim-Nassenbeuren-Hausen-Pfaffenhausen-Breitenbrunn (April-Juni 71:Ha).

99. Peucedanum cervaria LAP. (Hirsch-Haarstrang)
Litzauer Schleife, Schongau, Bernbeuren (Juni 71:!!).

100. Pyrola media SW. (Mittleres Birnkraut)
Melköde am Ifen (27.7.71:!!).

101. Rhododendron ferrugineum L. (Rostblättrige Alpenrose)
Moor bei Rechtis und an einem weiteren Ort bei Hellengerst (14.5.71:entdeckt von Su, bestätigt:!!). Damit erhöht sich die Zahl der Vorkommen in diesem Gebiet auf insgesamt vier.

102. Arctostaphylos uva-ursi SPRENG. (Echte Bärentraube)
Am Weg von Holzgau gegen die Kemptener Hütte (6.6.71:!!).

103. Primula auricula L. (Aurikel)
Hauchenberg (30.4.71: entdeckt von Th.Müller, bestätigt:!!).

104. Gentiana clusii PERR. (Stengelloser Enzian)
Westlich Mattsies bei Mindelheim (Juli 71:Ha).

105. Gentiana utriculosa L. (Schlauch-Enzian)
Litzauer Lechschleife (4.7.71:!!,Su).

106. Gentiana aspera HEGET. (Rauher Enzian)
Säuling (8.9.71:Su,!!); Determ.bestätigt:Merxmüller, Eschelmüller; Rauhhorngrat (6.9.71:E).

107. Polemonium coeruleum L. (Himmelsleiter)
Brüchlins bei Ottobeuren (15.6.71:Glö,!!).

108. Ajuga pyramidalis L. (Pyramiden-Günsel)
Gottesacker nahe dem Ifen (13.6.71:!!).

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

109. Salvia nemorosa L. (Steppensalbei)
Adventiv auf dem Schuttplatz nw.Landsberg (7.8.71:!!,Ha,Re).

110. Hyoscyamus niger L. (Bilsenkraut)
Holzgau im Lechtal (6.6.71:!!).

111. Datura stramonium L. (Stechapfel)
Schuttplatz Rothenstein bei Grönenbach (13.8.71:!!,Schroeder).

112. Capsicum annuum L. (Paprika)
Schuttplatz Sonthofen (24.8.71:!!).

113. Linaria pilosa DC. (Haariges Zimbelkraut)
Friedhof Mittelberg bei Oy (2.9.71:entdeckt von Schröppel, bestätigt:!!).

114. Veronica scutellata L. (Schild-Ehrenpreis)
Hattenburg bei Ochsenhausen (4.8.71:!!,Glö), Köppenalm bei Hopfen (17.7.71:!!), Häcklersweiher bei Blitzenreute/Westallgäu (1.8.71:!!).

115. Rhinanthus serotinus SCH.et TH. (Großer Klappertopf)
Sumpfwiesen ("Stockwiesen") bei Hege nahe Wasserburg/Bodensee (Juli 71:!!).

116. Orobanche lucorum A.BR. (Hain-Sommerwurz)
Am Eckbach bei Hinterstein (12.8.71:!!),
Rottachberg bei Rottach (11.8.71:!!).

117. Orobanche minor SUTT. (Kleine Sommerwurz)
Bf.Leutkirch (18.7.71:!!).

118. Galium hercynicum WEIG. (Harzer Labkraut)
Auf alten Viehweiden am Hauchenberg bei Diepolz (12.9.71:!!); mit diesem neuen Fundort dürfte der Beweis erbracht sein, daß das Harzer Labkraut bei uns nicht einfach "forstlich einge= bracht"wurde. Schon die Vorkommen bei Hopfen am See ließen auf die Möglichkeit einer gewissen Ursprünglichkeit schließen. Galium hercynicum tritt bei uns in Biotopen auf, die stark an Verhältnisse des Erzgebirges erinnern.

119. Lonicera coerulea L. (Blaue Heckenkirsche)
"Melköde" am Ifen bei 1300 m (23.5.71:!!)

120. Phyteuma nigrum F.W.SCH. (Schwarze Teufelskralle)
Zwischen Erpfting und Bronnen bei Landsberg (29.5.71:Re,!!), östlicher "Vorposten" der Art im Allgäu!

121. Jasione montana L. (Berg-Sandrapunzel)
Zaisertshofen bei Mindelheim (7.8.71:!!,Ha).

122. Adenostyles glabra DC. (Kahler Alpendost)
Hauchenberg-Grat (12.9.71:!!).

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

123. Adenostyles alliariae KERN. (Grauer Alpendost)
Hauchenberg-Grat (12.9.71:!!).

124. Aseter amellus L. (Kalk-Aseter)
Schongau (4.7.71:!!), Friesenried (9.71:!!).

125. Inula helenium L. (Echter Alant)
Aletshausen sü.Krumbach, adventiv (22.8.71:!!).

126. Inula hirta L. (Rauher Alant)
Seestall am Lech (29.5.71:Re,!!), Schongau (4.7.71:!!,Su), Burggen (3.10.71:!!).

127. Xanthium strumarium L. (Gewöhnliche Spitzklette)
Schuttplatz Rothenstein/Iller (26.8.71:!!).

128. Helianthus rigidus DESF. (Rauhe Sonnenblume)
Schuttplatz nw.Landsberg/Lech (25.8.71:!!).

129. Bidens radiatus THUILL. (Strahliger Zweizahn)
Nun auch im Westallgäu:Häcklerweiher bei Blitzenreute (1.8.71:!!), Rohrsee bei Bad Wurzach (3.8.71:!!),Hattenburg bei Ochsenhausen (4.8.71:!!,Glö).

130. Bidens frondosus L. (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)
Güterbf.Leutkirch (14.8.71:!!).

131. Bidens connatus MUEHL. (Verwachsenblättriger Zweizahn)
Neu im engeren Allgäu! Güterbf.Kempten (26.8.71:Frl.Kühn/Kempten).

132. Anthemis tinctoria L. (Färber-Kamille)
Bolsterlang bei Fischen (10.71:Su), Burggen/Lech (3.10.71:!!).

133. Achillea ptarmica L. (Sumpf-Schafgarbe)
Bachufer bei Roth a.d.Roth (30.7.71:!!).

134. Achillea collina J.BECK (Hügel-Schafgarbe)
Güterbf.Leutkirch (18.7.71:!!); breitet sich an Verkehrslinien aus!

135. Chrysanthemum corymbosum L. (Straußblütige Wucherblume)
Trockenhang bei Schongau (4.7.71:!!).

136. Artemisia mutellina VILL. (Edelraute)
Glasfelderkopf (4.9.71:!!,Pötzl); unser östlichstes Vorkommen!

137. Senecio vernalis W.et KIT. (Frühlings-Kreuzkraut)
Straßenrand zwischen Großholzleute und Isny (26.5.71:!!).

138. Carlina stricta FRITSCH (Langblättrige Eberwurz)
Gerbertobel bei Weiler (11.8.71:!!),Pointalpe b.Giebelhaus 19.9.71:!!), Eckalpe bei Hinterstein (1.9.71:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

139. Saussurea discolor DC. (Zweifarbige Alpenscharte)
Säuling nahe der Gemswiese (8.9.71:entdeckt von Su, bestätigt:!!. Der Fund ist deshalb so bemerkenswert, weil die sehr seltene Art bisher nur vom Schreckseegebiet bekannt war.

140. Centaurea nemoralis JORD. (Schwarze Flockenblume)
Aletshausen südl.Krumbach (15.8.71:!!).

141. Centaurea alpestris HEG. (Alpen-Flockenblume)
Eckalpe bei Hinterstein (29.9.71:!!).

142. Carthamus tinctorius L. (Saflor)
Schuttplatz Aitrang (17.9.71:!!),Schuttpl.Sonthofen(9.71:!!).

143. Cirsium tuberosum ALL. (Knollige Kratzdistel)
Litzauer Schleife bei Burggen (4.7.71:!!,Su).

144. Cicerbita alpina WALLR. (Alpen-Milchlattich)
Hellengerst (5.7.71:!!,Su), Hauchenberg (21.7.71:!!).

145. Crepis tectorum L. (Mauer-Pippau)
Bahnhöfe von Leutkirch und Ratzenried (20.6.71:!!).

Nachtrag:
146. Calamagrostis lasiogrostis
Himmelsschrofen oberh.dem Christlesee (29.10.71:!!).

III. Bestätigung alter Vorkommen:

1. Juncus jaquinii L. (Gemsen-Binse)
Himmeleck - nicht, wie oft angegeben - "Schneck" (23.7.71:!!).

2. Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz)
Füssen (17.5.71:Su,!!).

3. Saxifraga aizoides L. (Fetthennen-Steinbrech)
Gerbertobel bei Weiler (11.8.71:!!).

4. Lotus siliquosus L. (Spargelschote)
Vorderhindelang (12.8.71:Glö,!!).

5. Elatine triandra SCHK. (Dreimänniger Tännel)
"Fischweiher" bei Bad Wurzach, submers (1.8.71:!!).

6. Viola alba BESS. (Weißes Veilchen)
Backenreute am Pfänder und Gebhardsberg (6.4.71:!!,Bri).
Hier in der Variatät mit bläulichem Sporn, aber kein Bastard!

7. Rhododendron hirsutum L. (Rauhe Alpenrose)
Felsen am Hauchenberg (30.4.71:!!).

Anschrift des Verfassers: Dr.Erhard Dörr
Oberstudiendirektor
8960 Kempten/Allgäu
Bodmanstr. 30/2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: 15_2

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: Ergebnisse der Allgäu-Floristik - Arbeitsbericht für 1971. 1-12