© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Naturwiss.Mitt.Kempten
Jahrg.17, Folge 3 (1973)

Erhard Dörr

Floristische Notizen zur Allgäu-Flora 1973

Die folgende Zusammenstellung ist ein Auszug aus den floristischen Ergebnis sen des Jahres 1973 im Allgäuer Raum. Dazu haben beige= tragen: Der Direktor des Institutes für Systematische Botanik in München, Herr Universitätsprofessor Dr.H.MERXMÜLLER, dem ich viele Anregungen, die Bes timmung von kritischen Arten und nicht zuletzt den Zugang zu den botanischen Staatssammlungen verdanke; Herr Dr. W.LIPPERT, der Mitarbeiter von Professor Merxmüller, definierte mir immer wieder schwierige Arten. Die Determination der Gattungen Amaranthus und Chenopodium verdanke ich Herrn Paul AELLEN (Basel), der uns im August für immer verlassen hat.
Herr H.HACKEL (Mindelheim) stellte mir seine Aufzeichnungen über die Flora um Mindelheim aus dem Jahre 1973 zur Verfügung. Auch die übrigen Mitarbeiter an der Allgäu-Flora, Herr O.BRETTAR (Kaisers= lautern), Herr Rektor G.W.BRIELMAIER (Wangen), Herr Oberlehrer A. ESCHELMÜLLER (Sulzberg), Herr E.GLÖGGLER (Ottobeuren), Herr Dr.O. KLEMENT (Kreuzthal), Herr und Frau Dr.R.u.K.LÜBENAU (Kempten-Sankt Mang), Herr Prof.L.MÜLLER (Kempten), Herr R.REGELE (Landsberg), Familie Apotheker SCHROEPPEL (Pfronten-Ried) und Frau E.SUTTER (Kempten) haben mich im Jahre 1973, wie schon so oft vorher, tat= kräftig unterstützt.
Floristische Hinweise verdanke ich ferner Herrn Gymnasialprofessor Dr.W.ENDERLE (Wangen), Herrn L.FREY (Obergünzburg), Herrn Dr.Gg. PHILIPPI (Karlsruhe), Herrn W.PÖTZL (Kempten) und Herrn Dr.SEYBOLD (Ludwigsburg). Sonstige Finder sind an entsprechender Stelle im Text genannt, Erstfinder übrigens grundsätzlich an erster Stelle,

Gebrauchte Abkürzungen:

Bri = Brielmaier
!! = Dörr
E = Eschelmüller
Glö = Glöggler
Ha = Hackel
R = Regele
Su = Sutter

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

1. Diphasium complanatum (L.)ROTHM. (Gemeiner Flachbärlapp)

Diese Art - früher als Lycopodium anceps WALLR. angeführt - galt während der letzten Jahre als im Allgäu erloschen. Nun entdeckte sie Dr. PHILIPPI (Karlsruhe) neu in Aa bei Altstädten. Bestätigt von !! am 9.9.73.

2. Equisetum variegatum SCHLEICH (Bunter Schachtelhalm)

Aa: Geröll an der Seealpe am Nebelhorn bei ca 1300 m (Glöggler)

3. Botrychium lunaria (L.)SW. (Echte Mondraute)

"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73)(!!,Ha,SU), südöstlich Salgen bei Mindelheim (14.6.73)(Ha,!!,Su).-

4. Phyllitis scolopendrium (L.)NEWM. (Hirschzunge)

In Aa viel verbreiteter als bisher angenommen: Giggelstein a. Grünten (22.6.73)(E.bestätigt !!); Geisberg bei Tiefenbach, Ochsenkopf bei Tiefenbach, Schatthalde bei Tiefenbach (14.10.73: !!), Toniskopf bei Rohrmoos (7.10.73:!!), Schafkopf am Beseler zwischen 1530-1550 m (9.10.73:!!), Fuß der Gauchenwände und der Scheuenwände bei Balderschwang (16. 10.73:!!). Die Vorkommen an den Kackenköpfen bei Rohrmoos und am Gottesacker (Kürenwald) konnten bestätigt werden (!!).

5. Asplenium septentrionale (L.)HOFFM. (Nordischer Streifenfarn)

Spärlich am Grünten (Burgberger Hörnle); entdeckt von E, bestätigt !! am 16.6.73; Frau Dr.Lübenau konnte das Vorkommen von der Pointalpe am Salober wiederentdecken. Bestätigt !! 19.6.73.

6. Asplenium trichomanes L. (Braunstieliger Streifenfarn)

Bei ca 1750 m nahe dem Engeratsgunder See am Daumen (6.9.73:!!)

7. Gymnocarpium robertianum (HOFFM.)NEWM. (Ruprechts Farn)

In Hbo im Gerbertobel bei Weiler (12.6.73:!!), in Ho am Schwalbenstein bei Schongau (6.7.73:!!).

8. Polystichum braunii (SPENN.)FEE (Weicher Schildfarn)

Giebel-Fuß, entdeckt von E, bestätigt !! am 30.7.73. Das zweite Allgäuer Vorkommen!

9. Polypodium vulgare L. (Tüpfelfarn)

Höher als bisher bekannt in den Allgäuer Alpen: Ochsenalpe bei 1600 m (30.7.73:!!), an der Südwestflanke des Elferkopfes sogar bei 2100 m (16.8.73:Kriemhild Dörr,!!).-

10. Pinus cembra L. (Zirbelkiefer)

Sehr zahlreich im Kürenwald-Tal auf dem Gottesackerplateae (18. 8.1973:!!).-

11. Aconitum variegatum L. (Bunter Eisenhut)

Am Falken am Daumen noch bei 2000 m Höhe (6.9.73:!!); am Südhang desKegelkopfes bei 1850 m (29.7.73:!!).-

12. Pulsatilla vernalis (L.)MILL. (Frühlings-Küchenschelle)

Allgäuer Alpen / Tirol Rotnase (14.8.73:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

13. Pulsatilla vulgaris MILL. (Gemeine Küchenschelle)

Baisweil (21.4.73:!!,Gl,ursprünglich entdeckt von Ludwig Frey in Obergünzburg).

14. Ranunculus platanifolius L. (Platanenblättriger Hahnenfuß)

An den Kackenköpfen bei Rohrmoos/Oberstdorf (25.9.73:!!)

15. Ranunculus auricomus L. (Gold-Hahnenfuß)

Württemb.Allgäu: Im Rottumtal bei Ochsenhausen (5.5.73:!!,Su, Gl).

16. Ranunculus oreophilus BIEB. (Gebirgs-Hahnenfuß)

Ho:Trockenhänge bei Rieden und Pforzen nahe Kaufbeuren (17.6.73: !!,Ha,Su etc.).

17. Thalictrum simplex L.ssp.simplex (Einfache Wiesenraute)

"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73:!!,Gl,Su,Ha).

18. Thalictrum flavum L. (Gelbe Wiesenraute)

"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73:!!,Gl,Su.Ha).-

19. Corydalis intermedia (L.)MER. (Mittlerer Lerchensporn)

Am Gatterkopf am Unteren Gottesacker bei ca 1580 m (19.6.73:!!); diese Höhe liegt erheblich über dem bisher bekannten Vorkommen der bei Einödsbach (ca 1200m). Entdeckt wurde der Bestand am Gatterkopf von Adelheid Eschelmüller, bestätigt E, !!).-

20. Corydalis bulbosa (L.)DC. (Hohler Lerchensporn)

In Aa zwischen Spielmannsau und dem Sperrbachtobel (11.8.73:!!), am Fundtag noch blühend ! Ferner in Ho am Löhweg (Hauchenberg) (23.5.73:Su, bestätigt !!).

21. Eschscholzia californica CHAM. (Kalifornischer Kappenmohn)

Ho:Adv. Dirlewang b.Mindelheim (8.7.73:Ha).

22. Descurainia sophia (L.)PRANTL (Gemeine Besenrauke)

Bahnhof Pforzen (17.6.73:Su,!!); Bf.Kempten (24.6.73:!!).-

23. Barbarea intermedia BOR. (Mittleres Barbarakraut)

In immer weiterer Ausbreitung begriffen: In Aa auf der Pointalpe am Salober bei Hinterstein, ca 1300 m (19.6.73:!!), in Ho zwischen Roßhaupten und Lechbruck (20.5.73:!!), im württembg. Westallgäu bei Überruh am Schwarzen Grat (20.5.73:!!).-

24. Arabis turrita L. (Turm-Kresse)

Aa: Südhang des Geisberges bei Tiefenbach nahe Oberstdorf (14.10.73:!!).

25. Arabis hirsuta (L.)SCOP. (Rauhe Gänsekresse)

Aa: am Kegelkopf bei ca 1850 m(29.7.73:!!), nahe dem Kluppenkopf an der Höfats sogar bei ca 2000 m (7.8.73:!!).-

26. Arabis coerulea (ALL.)HAENKE (Blaue Gänsekresse)

Tiroler Aa: Rotnase bei Holzgau (14.8.73:!!).-

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

27. Lunaria rediviva L. (Mondviole)

Aa: Kackenköpfe bei Rohrmoos, ca.1450 m (2.5.73,!!), an den Scheuenwänden b.Balderschwang (16.10.73:!!), am Geisberg b. Tiefenbach (14.10.73:!!).

28. Draba fladnizensis WULF. (Fladnitzer Felsenblümchen)

Aa (Tirol): Rotnase bei Holzgau (14.8.73:!!)

29. Draba carinthiaca HOPPE (Kärntner Felsenblümchen)

Aa (BRD): Kratzer (1.7.73:!!); Aa (Tirol): Strahlkopf bei Holzgau (4.9.73:!!).

30. Draba dubia SUT (Kälte-Felsenblümchen)

Aa: Schneck (9.8.73:!!), Rotkopf nahe dem Schneck (15.9.73:!!, Pötzl).

31. Cochlearia officinalis L. ssp alpina (BAB) HOOK (Löffelkraut)

Ho: Gfä llmühle bei Ebersbach (Obergünzburg)(8.4.73:!!,Su); die bereits von WINTERHOFF aufgeführten württembg.Vorkommen von Rot a.d.Rot und Ampfelbronn konnten abermals bestätigt werden (5.5.73:!!,Su,Glö).

32. Hirschfeldia incana (JUSL.)LAGR. Bastard-Senf)

Auf dem Schuttplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (29.8.73:!!).

33. Bunias orientalis L. (Zackenschötchen)

Massenhaft a.d.Bahn zw. Türkheim u. Ettringen (14.6.73:Ha,!!,Su).

34. Alyssum alyssoides ssp.angustifolium HEUFF (Kelch-Steinkraut)

Adventiv am Schuttplatz Mindelau (20.5.73:Ha)

35. Rapistrum rugosum (L.)ALL. (Rapsdotter)

Schuttplatz Schongau (29.8.73:!!).

36. Eruca sativa (L.)CAV. (Senfrauke)

Breitet sich mit Trifolium resupinatum auf Äckern rasch aus. HACKEL fand die Art allein 1973 bei Westerheim, Günz a.d.Günz, Sontheim, Schlegelberg, Ober- u. Unterkammlach, Stetten, Mussen= hausen, Eutenhausen, Markt Rettenbach, Baisweil, Lauchdorf-Großried, Dirlewang-Mindelheim-Nassenbeuren, Türkheim-Ettringen und Gennach. Außerdem bei Benningen nahe Memmingen und Aitrang (25.7.73:!!).-

37. Sempervivum tectorum L.ssp.alpinum (GR. et SCH.)WETTST. (Alpenhauswurz)

Aa: Gatterkopf bei Rohrmoos (19.6.73:Kriemhild Dörr,E,!!.); Haldenwanger Eck unweit der Mindelheimer Hütte (8.73:Su); Kegelkopf (29.7.73:!!), Rotnase (Tirol)(14.8.73:!!),Älpelekopf am Schrecksee (2.9.73:!!).

38. Cotoneaster tomentosa (AIT)LDL (Filzige Zwergmispel)

Am linksseitigen Lechhang bei Roßhaupten (20.5.73:!!).

39. Potentilla intermedia L. (Mittleres Fingerkraut)

Neu für den Allgäuer Bereich! Eingeschleppt als Gartenunkraut in Lindau (18.6.73:!!,Su).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

40. Agremonia procera WALLR. (Wohlriechender Odermennig)
Mooshausen a.d.Iller (Dr.Seybold) und Rot a.d.Rot (!!)(10.7.73).

41. Rosa rubiginosa L. (Wein-Rose)
Links des Lechs am Schwalbenstein unterhalb Schongau(6.7.73:!!).

42. Rosa dumetorum THUILL. (Hecken-Rose)
Aa: oberhalb des Engeratgundhofes nahe dem Giebelhaus b.Hinter=stein in etwa 1300 m Höhe (6.9.73:!!).

43. Melilotus indicus (L.)ALL. (Kleinblütiger Steinklee)
Auf dem Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau(19.9.73: /!!).

44. Trifolium aureum POLL. (Gold-Klee)
Bayer.Westallgäu: Schnellers bei Weiler (10.8.73:Bri,!!).

45. Lens culinaris L. (Linse)
Müllplatz Schongau, westlich Schongau (19.9.73:!!).

46. Lathyrus heterophyllus L. (Verschiedenblä ttrige Platterbse)
Am Kegelkopf bei Oberstdorf noch bei 1850 m (29.7.73:Kriemhild Dörr, !!).

47. Cicer erietinum L. (Kicher-Erbse)
Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (29.8.73:!!).

48. Hippophae rhamnoides L. (Sanddorn)
Aa: Illerauen b.Immenstadt (19.6.73:!!,Su).

49. Peplis portula L. (Sumpfquendel)
Rötsee bei Kißlegg (15.8.73:!!). Zweites Vorkommen im württembg. Allgäu.

50. Geranium sylvaticum L. (Wald-Storchschnabel)
Klausenmühle bei Seltmanns, Rechtis bei Kempten (10.6.73:!!) und Schnellers bei Weiler (11.6.73:!!).

51. Acer campestre L. (Feld-Ahorn)
Am Grünten bei 1000 m (16.6.73:E,Beer,!!).

52. Polygala serpyllifolia RCHB. (Quendel-Kreuzblume)
Willersalpe nahe dem Gigglstein am Grünten (22.6.73:!!) und nahe Rechtis am Sonneck (August 1973:!!).

53. Euphorbia amygdaloides L. (Mandel-Wolfsmilch)
Mooshausen im Illertal (30.5.73:Dr.Seybold, bestätigt !!)

54. Stapylea pinnata L. (Pimpernuß)
Im Schluchtwald am östlichen Illerufer knapp südlich und nördlich von Au bei Grönenbach (9.6.73:Ha).

55. Scandix pecten-veneris L. (Venusnabel)
Adventiv im Bahngelände Sontheim bei Memmingen (7.7.73:Ha).

56. Libanotis montana CR (Berg-Hirschwurz)
"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73:!!,Ha,Su).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

57. Laserpitium latifolium L. (Breitblättriges Laserkraut)
Am Großen Seekopf nahe dem Nebelhorn noch bei 1900 m (9.8.73:!!).

58. Urtica urens L. (Kleine Brennessel)
Kiesgrube bei Wolfis nahe Sulzberg (31.10.73:E).

59. Urtica dioica L. (Große Brennessel)
Am Südhang der Krottenspitzen noch bei ca 2100 m (11.8.73:!!).

60. Thesium bavarum SCHR. (Bayerisches Leinblatt)
Westlich ellighofen südwestlich Landsberg (29.8.73:E,!!); erstmals außerhalb des eigentlichen Lechtales!

61. Thesium pyrenaicum POURR. (Wiesen-Leinblatt)
"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73:!!,Ha).

62. Rumex maritimus L. (Gold-Ampfer)
Rötsee bei Kißlegg (4.7.73:!!).

63. Rumex aquaticus L. (Wasser-Ampfer)
Aa: Immenstadt in den Illerauen (18.6.73:!!,Su).

64. Polygonum polystachium WALL. (Vielstengeliger Knöterich)
Im Bahngelände Kleinweiler-Hofen bei Jsny, auf bayer.Boden (29.9.73:!!).

65. Chenopodium hybridum L. (Bastard-Gänsefuß)
Als "Vogelfutterpflanze" in Memmingen (Ha).

66. Chenopodium hircinum SCHRAD. (Bocks-Gänsefuß)
Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau(19.9.73:!!).

67. Chenopodium pratericola RYDB. (Schmalblättriger Gänsefuß)
Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (19.9.73:!!).

68. Herniaria hirsuta L. (Behaartes Bruchkraut)
Sehr zahlreich als Gartenunkraut in Lindau (8.6.73:!!,Su).

69. Arenaria ciliata L. (Bewimpertes Sandkraut)
Tiroler Allgäuer Alpen:Rothornspitze bei Holzgau (4.9.73:!!).

70. Stellaria holostea L. (Große Sternmiere)
Auf dem Kalvarienberg bei Immenstadt (von Su entdeckt, bestätigt 30.6.73:!!)

71. Gypsophila paniculata L. var. hungarica (Rispiges Gipskraut)
Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau(19.9.73:!!).

72. Vacaria pyramidata MED. (Kuhkraut)
Auf einem Kleeacker nahe Mindelheim (Juni 1973:Ha).

73. Dianthus armeria L. (Büschel-Nelke)
Adventiv in Mindelheim (23.7.73:Ha, !!) und als Gartenunkraut in Lindau (18.6.73:!!,Su).

© Volkshochschule Kempten download unter www.biologiezentrum.at

74. Dianthus sylvestris WULF. (Stein-Nelke)

Tiroler Allgäuer Alpen: an der Rothornspitze bei Holzgau (4.9.73:!!,Leopold Immler).

75. Agrostemma githago L. (Kornrade)

Adventiv im Güterbahnhof Memmingen,(Sept.1973:Glö).

76. Amaranthus retroflexus L. (Rauhhaariger Fuchsschwanz)

Müllplatz der Stadt Schongau westl.Schongau (29.8.73:!!).

77. Amaranthus cruentus L. (=A.hybridus ssp.paniculatus/L./HEJNY)

Adventiv auf dem Müllplatz der Stadt Wangen bei Obermoweiler (11.9.73:!!). Neu für den Allgäuer Bereich!

78. Amaranthus albus L. (Weißer Fuchsschwanz)

Müllplatz der Stadt Schongau westl.Schongau (29.8.73:!!).

79. Amaranthus blitoides S.WATS. (Westamerik.Fuchsschwanz)

Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (29.8.73:!!).

80. Amaranthus quitensis H.B.K. (Quito-Fuchsschwanz)

Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau(29.8.73:!!).

81. Rhododendron ferrugineum L. (Rostrote Alpenrose)

In einem Moor unweit von Weiler im bayer.Westallgäu (3.6.73:!!, bestätigt:Bri). Seit Jahrzehnten erster gesicherter Wuchsort der Art im Westallgäu außerhalb der Alpen!

82. Empetrum hermaphroditum (LGE) HAG (Krähenbeere)

Tiroler Allgäu: Rotnase bei Holzgau und auf der Mutte am Bern= hardseck (14.8.73:!!); Vorarlberger Allgäu: Elferkopf bei ca 2100 m (16.8.73:!!).-Der Fundort am Gottesackerplateau kann be= stätigt werden (19.6.73:!!).

83. Androsace obtusifolia ALL. (Stumpfblättriger Mannsschild)

Tiroler Allgäu: Rotnase bei Holzgau (14.8.73:!!).

84. Swertia perennis L. (Blauer Tarant)

Zwischen Rohrmoos und den Kackenköpfen bei 1200 m (25.9.73:!!), auf der Neuen Piesenalpe am Piesenkopf nahe Rohrmoos sogar bei 1400 m Höhe (5.10.73:!!).

85. Gentiana cruciata L. (Kreuz-Enzian)

Rieden bei Kaufbeuren (17.6.73:Ha,!!,etc.)

86. Gentiana pneumonanthe L. (Lungen-Enzian)

Mariaberg b.Kempten (W.Pötzl) und Stadtweiher Kempten (Glö) (Sept.1973).

87. Gentiana clusii PERR.et SONG. (Stengelloser Enzian)

Ettringen (R.,Ha,!!).

88. Gentiana utriculosa L. (Schlauch-Enzian)

Gieselerwand an der Höfats (7.8.72:!!und zwischen Vilsalpe und Rauhhorn (1.9.73:Glö,!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

89. Lappula deflexa (WAHL.)GARCKE (Herabgebogener Igelsame)

Tiroler Allgäu: Links des Lech bei Steeg (1.7.73:!!) und auf der Mutte am Bernhardseck (4.9.73:!!,Leopold Immler).

90. Myosotis caespitosa K.F.SCHULTZ (Rasiges Vergißmeinnicht)

Württemb.Westallgäu:Rötsee bei Kißlegg (4.7.73:!!).

91. Anchusa myosoroides (Vergißmeinnichtähnliche Ochsenzunge)

In großer Menge auf Österr.Boden(Vorarlberg)nahe Scheidegg (5.6.73:!!).

92. Pulmonaria mollis WOLFF. (Berg-Lungenkraut)

Ziemlich häufig im Wertachauwald beiderseits des Flusses zwischen Stockheim und Türkheim, besonders im Raum zwischen Irsingen und Türkheim. Zwischen Türkheim und Ettringen rasch an Häufigkeit abnehmend (20.5.73:Ha.)

93. Stachys annua L. (Einjähriger Ziest)

Adventiv auf dem Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (11.9.73:!!).

94. Teucrium scorodonia L. (Salbei-Gamander)

Adventiv im Güterbahnhof Kempten (15.7.73:!!).

95. Nicandra physaloides (L.)GAERTN. (Giftbeere)

Abermals auf dem Müllplatz der Stadt Wangen bei Obermoweiler (11.9.73:!!).

96. Solanum rostratum DUN. (Stachel-Nachtschatten)

Adventiv auf dem Müllplatz der Stadt Schongau westlich Schongau (19.9.73:!!).

97. Datura stramonium L. (Stechapfel)

Auf dem Müllplatz Stetten bei Mindelheim (26.8.73:Ha).

98. Veronica fructiculosa L. (Halbstrauchiger Ehrenpreis)

Berggächtele am Giebel bei Hinterstein (30.7.73:E,!!).

99. Veronica anagallis-aquatica L.ssp.anagallidiformis (BOR)SOO.

Links des Lech bei Dornstetten südl.Landsberg (29.8.73: entdeckt von Schimitat/München, bestätigt:!!,R). Neu für den Allgäuer Raum!

100. Veronica montana JUSL! (Berg-Ehrenpreis)

Im unteren Hesselwang zwischen Mindelheim und St.Anna (Juni 73: Ha), im bayer.Westallgäu :Schnellers bei Weiler (3.6.73)!!)

101. Melampyrum arvense L. (Acker-Wachtelweizen)

An der Bahn zwischen Türkheim und Wiedergeltingen(24.7.73:Glö,!!).

102. Orobanche vulgaris POIR. (Labkraut-Sommerwurz)

Trockenrasen nahe Rieden b.Kaufbeuren (17.6.73:!!,Ha,etc.).

103. Galium wirtgenii F.SCHULTZ (Frühes Labkraut)

In Molinieten des Salger Moores südl.d.Simonsberges b.Mindelheim (14.6.73:!!,Ha,Su) und im Pfaffenhausener Moor b.Mindelheim (14.6.73:Ha,!!,Su).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

104. Galium hercynicum WEIG. (Harzer Labkraut)

Zahlreich am Harprechtser Moor zwischen Neutrauchburg und Eisenharz im württembg.Westallgäu (29.6.73:!!,Bri).

105. Adoxa moschatellina L. (Moschuskraut)

Ho: Lohweg am Hauchenberg b.Kempten (23.5.73), Hohenthanner Wald bei Kimratshofen (29.5.73), Theinselberg bei Memmingen (21.4.73), Hatzleberg bei Marktrettenbach (19.5.73);Aa: Mitterhof (2.9.73) und Säuwald bei Hinterstein (19.6.73)(die Angaben stammen von Kriemhild Dörr und !!).

106. Campanula persicifolia L. (Pfirsichblättrige Glockenblume)

Bei Altensteig und am Rechberg westlich Mindelheim(Juli 73:Ha).

107. Phyteuma nigra F.W.SCHM. (Schwarze Teufelskralle)

Knaus und Erleberg westl.Mindelheim (Juni 73:Ha),zwischen Dirlewang und Apfeltrach (Mai 73:Ha) und am Simonsberg bei Hausen (15.6.73:Ha,!!,Su).

108. Phyteuma hemisphaericum L. (Halbkugelige Teufelskralle)

Tiroler Allgäu:Rotnase bei Holzgau (12.8.73:!!).

109. Aster amellus L. (Berg-Aster)

Kolonie Hurlach b.Landsberg (29.8.73:R,!!).

110. Ambrosia elatior L. (Beifußblättrige Ambrosie)

Unggenried b.Mindelheim (Kirner,Ha); Müllplatz westlich von Schongau (19.9.73:!!).

111. Bidens radiata THUILL. (Strahlen-Zweizahn)

Massenhaft mit Bidens cernua und Bidens tripartita im Rötsee bei Kißlegg (15.8.73:!!).

112. Galinsoga parviflora CAV. (Kleinblütiges Knopfkraut)

Müllplatz westlich Schongau (19.9.73:!!)

113. Anthemis cotula L. (Stinkende Hundskamille)

Müllplatz westlich Schongau (19.9.73:!!).

114. Chrysanthemum carinatum SCHOUSB.

Schuttplatz der Stadt Wangen bei Obermoweiler (11.9.73:!!).

115. Anacyclus clavatus (DESF.)PERS. (Keulen-Bertram)

Dirlewang b.Mindelheim _.7.73:Ha), Kleeacker bei Aitrang (7.73:!!). Die Art tritt bei uns hauptsächlich auf Trifolium-resupinatum-Feldern auf und ist meist mit Eruca sativa vergesellschaftet.

116. Artemisia mutellina VILL. (Edelraute)

Bayerische Allgäuer Alpen:Schneck, Erstmeldung von Fricke (Nesselwang), bestätigt Pötzl und !! am 15.9.1973.

117. Homogyne alpina (L.)CASS. (Alpenlattich)

Schnellers bei Weiler (3.6.73:!!).

© Volkshochschule Kempten download unter www.biologiezentrum.at

118. Senecio incanus L.ssp.carniolicus (WILLD.)BR.-BL.-(Graues Kreuzkraut)
Zwei neue Vorkommen für die bayerischen Allgäuer Alpen: nahe dem Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn (Erstentdecker Müller-Ulm, bestätigt von !! und Brettar am 4.8.73); Gottesacker (entdeckt von Kriemhild Dörr, bestätigt:!! am 30.8.73).

119. Senecio helenitis (L.)SCH.et TH. (Spatelblättriges Kreuzkraut)
Nordwestran des Wurzacher Riedes (30.5.73:!!).

120. Cirsium arvense (L.)SCOP. (Ackerdistel)
Neue Piesenalpe am Piesenkopf b.Rohrmoos bei ca 1450 m (5.10.73:!!)zusammen mit Cirsium palustre L.Scop.

121. Cirsium acaule SCOP. (Stengellose Distel)
Am Besler bei 1600 m (10.10.73:!!).

122. Onopordum acanthium L. (Esels-Distel)
Als "Vogelfutterpflanze" in Ottobeuren (5.7.73:Glö,!!).

123. Willemetia stipitata (JAQU.)CASS. (Kronenlattich)
Bayer.Westallgäu:Kremlerbad bei Oberreute (5.6.73:!!); Schnellers bei Weiler (3.6.73:!!); Vorarlberger Allgäuer Alpen: Bärenkopf bei ca 1600 m (14.7.73:!!).

124. Hieracium bauhinii SCHULT. (Bauhins Habichtskraut)
Trockenreine bei Ungerhausen unweit Memmingen (2.6.73:!!,Glö).

125. Hieracium humile JAQU. (Niederiges Habichtskraut)
Zwischen Tiefenbach und Obermaiselstein (23.7.73:!!).

126. Hieracium intybaceum ALL. (Schwefelgelbes Habichtskraut)
Gottesacker (30.8.73:!!), Rothorn in Tirol (4.9.73:!!).

127. Potamogeton filiformis PERS. (Fäden-Laichkraut)
Tiroler Allgäu: Vilsalpsee (1.9.73:!!,Glö).

128. Potamogeton alpinus BALB. (Alpen-Laichkraut)
Vorarlberger Allgäu: Lecknersee am Hochkraut mit Potamogeton natans (30.9.73:!!,Su).

129. Veratrum album L. (Weißer Germer)
Zwischen Marktrettenbach und Altisried (Juli 1973:Ha).

130. Allium suaveolens JAQU. (Wohlriechender Lauch)
"Goldene Weide" bei Ettringen (14.6.73:!!,Su,Ha); Salger Moos östlich Salgen bei Mindelheim (14.6.73:Ha,!!,Su).

131: Allium ursinum L. (Bären-Lauch)
Gerbertobel bei Weiler massenhaft (3.6.73:!!); in Aa am Fuße des Sederer Stuben (Juli 73:!!).

132. Lloydia serotina (L.)RCHB. (Falten-Lilie)
Tiroler Allgäu: Rotnase (14.8.73:!!).

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

133. Ornithogalum nutans L. (Nickender Milchstern)
Kirchheim nahe dem Schlosse (19.5.73:Kriemhild Dörr,Su,!!,Ha)

134. Asparagus officinale L. (Spargel)
Bahnanlagen am Bf.Türkheim (27.5.73:Ha).

135. Narcissus poeticus L. (Weiße Narzisse)
Gerbertobel bei Weiler (11.6.73:Su,!!).

136. Iris sibirica L. (Sibirische Schwertlilie)
Immenstadt (18.6.73: entdeckt Su, bestätigt !!).

137. Crocus albiflorus KIT. (Krokus)
Im Raum Weiler-Oberreute:Oberreute, Längenen bei Oberreute, (1.5.73:!!); Akkams-Missen-Werdensteiner Moor (1.5.73:!!); Schweikats bei Kempten-Lenzfried (10.5.73:Su,!!);"Im Einfang" im Kemptener Wald (3.5.73:!!); Siebratsbold bei Lengenwang (22.4.73:!!).

138. Iris germanica L. (Deutsche Schwertlilie)
An einer feuchten Waldböschung mitten im Hohenthanner Wald be Kimratshofen, abseits jeder Siedlung (Juni 73:L.Müller,!!).

139. Juncus filiformis L. (Faden-Binse)
Westallgäu:Schnellers bei Weiler (Juni 73:!!); Aa:Semmelalpe bei Konstanzer (Oberstaufer)(15.6.73:!!).

140. Juncus trifidus L. (Dreiteilige Binse)
Gumpensattel und Rothorn in Tirol bei Holzgau (5.9.73:!!).

141. Juncus jaquinii L. (Gemsen-Binse)
Rothorn bei Holzgau (5.9.73:!!).

142. Juncus squarrosus L. (Sparrige Binse)
Bayerisches Westallgäu;Schnellers bei Weiler (10.8.73:!!,Bri) in Aa: auf der Semmelalpe bei Konstanzer (Oberstaufer)(15.6.7 !!).

143. Juncus bufonius L. (Kröten-Binse)
Höhenbachtal b.Holzgau bei ca 1300m(1.7.73:!!).

144. Luzula spicata (L.)LAM.et DC (Ährige Hainsimse)
Aa(Vorarlberg):Bärenkopf (14.7.73:!!).

145. Eriophorum gracile KOCH (Schlankes Wollgras)
Am Kleinen Ursee bei Beuren (Württembg.Allgäu)(10.6.73:!!).

146. Eleocharis acicularis (L.)R.et SCH. (Nadel-Binse)
Attlesee b.Nesselwang (11.9.73:Schröppel).

147. Eleocharis ovata (Roth) R.et SCH. (Eiförmige Binse)
Württembg.Westallgäu:Rötsee bei Kißlegg (15.8.73:!!).

148. Cladium mariscus (L.)POHL (Schneide)
Steril auf der "Goldenen Weide"b.Ettringen (14.6.73:!!,Ha,Su)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

149. Carex dioica L. (Zweihäusige Segge)

Bayer.Westallgäu: Schnellers b.Weiler (3.6.73:!!).

150. Carex heleonastes EHRH. (Torf-Segge)

Seit Jahren erstmals wieder mit Sicherheit im bayer.Westallgäu festgestellt: Schnellers bei Weiler (3.6.73:!!,Bri).

151. Carex brunescens (PERS.)POIR (Bräunliche Segge)

Aa:Giggelstein am Grünten bei 1300-1400 m (22.6.73:!!); zwischen Iseler und Bschießer (7.7.73:!!,Glö).

152. Carex ornithopoda WILLD. (Vogelfuß-Segge)

Zwischen Westernach und Doldenhaus (19.5.73:!!,Ha,Su); Leutental bei Dirlewang (Juni 73:Ha).

153. Carex ornithopodioides HAUSM. (Vogelfußähnliche Segge)

Wildenfeld am Wilden (9.8.73:Kriemhild Dörr,!!).

154. Puccinellia distans (L.)PARL. (Gemeiner Salzschwaden)

Nach Dr.Seybold an der Autobahn zwischen Kellmünz und Pleß (August 73). Soll sich (ebenfalls nach Seybold) entlang der Verkehrswege infolge der Salzstreuung ausbreiten.

155 .Poa remota FORS. (Lockerblütiges Rispengras)

Ho: In Waldsenken des Hesselwangs bei St.Anna nächst Mindelheim (24.6.73:Ha); Mooshausen an der Iller (30.5.73:Seybold,!!); Hohenthanner Wald b.Kimratshofen nahe Kempten (5.6.73:!!).

156. Sesleria varia (JAQU.)WETTST. (Blaugras)

Untere Ho:Hinterbuchenbrunn bei Markt Rettenbach (2.5.73:!!); Schlegelsberg b.Erkheim (22.5.73:Seybold,!!); Hbo:(Württembg. Teil):Ebenweiler (8.5.73:!!).

157. Lolium temulentum L. (Taumel-Lolch).

Auf einem Kleeacker zwischen Dirlewang und Helchenried (8.7.73: Ha); ferner, ebenfalls nach Ha auf folgenden Schuttplätzen im Mindelheimer Bereich:Mindelheim, Oberauerbach und Stetten. Auch auf dem Müllplatz von Schongau (!!).

158. Agropyron caninum (L.)P.B. (Hunds-Quecke)

Schnellers bei Weiler (bayer.Westallgäu)(10.8.73:!!).

159. Eragrostis poaeoides P.B. (Kleines Liebesgras)

Im Straßenpflaster in Leutkirch (29.9.73:!!).-
Im Allgäu außerhalb der Bahnkörper selten!

160. Trisetum distichophyllum (VILL.)P.B.(Zweizeiliger Grannenhafer)

Aa (Bundesrepublik):Schneck (9.8.73:!!); Aa(Tirol):Mutte am Bernhardseck und Strahlkopf bei Holzgau (4.9.73:!!).

161. Avena parlatorei WOODS. (Parlatores-Hafer)

Aa(Tirol):Zwischen Vilsalpe und Geishornsattel in großer Menge (1.9.73:!!,Glö);Aa (Deutschland):am Kugelhorn bei ca 2000 m (1.9.73:!!,Glö). Der zweite Wuchsort ist der erste wirklich gesicherte auf deutschem Allgäuer Boden, da die Vorkommen am

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Aggenstein schon auf Tiroler Boden liegen und der von HEPP verzeichnete Wuchsort "Kegelkopf" seit Jahren unbestätigt blieb.

162. Avena fatua L. (Flatter-Hafer)

Müllplatz der Stadt Wangen bei Obermoweiler(Sept.73:!!).

163. Agrostis schleicheri JORD.et VERL. (Pyrenäen-Straußgras)

Neu entdeckt für das Allgäuer Gebiet von Dr.Polatschek (Wien): Vordere Schochenalpe bei Holzgau, bestätigt am 12.8.73 von !!.

164. Calamagrostis villosa (CHAIX)GMEL. (Wolliges Reitgras)

Aa(Deutschl.):Schwarzenberg bei Oberstdorf-Obermaiselstein; Tirol: Vordere Schochenalpe (14.8.73:!!).

165. Calamagrostis arundinacea ROTH. (Wald-Reitgras)

Noch an einer weiteren Stelle des Hochfirst-Waldes bei Erisried nahe Mindelheim (26.8.73:Ha).

166. Alopecurus aequalis SOBOLEWSKI (Gelbroter Fuchsschwanz)

Württembg.Westallgäu: am Großen Ursee beu Beuren (12.7.73: Bri,!!) und am Rötsee bei Kißlegg (4.7.73:!!).

167. Achnatherum calamagrostis (L.)P.P. (Rauhgras)

An Südhängen des Geisberges nahe Tiefenbach bei Oberstdorf (14.10.73:!!).

168. Epipactis purpurata SM (Violette Sumpfwurz)

In feuchten Fichtenschonungen um Erleberg bei Erkheim (9.8.73: Ha).

169. Listera cordata (L.)R.BR. (Kleines Zweiblatt)

Dieser Art widmeten wir unsere besondere Aufmerksamkeit und konnten dabei feststellen, daß Listera cordata in erheblichen Bereichen unseres Untersuchungsgebietes bisher nur übersehen worden war. Für das württembg. Westallgäu entdeckten hauptsächlich G.W.Brielmaier und Dr.Enderle (Wangen) eine ganze Reihe von Wuchsorten. Württembg.Westallgäu:Isny (Sept.73:Bri), Zell bei Neutrauchburg (10.6.73:!!,Bri), mehrfach im Harprechtser Moor bei Eisenharz (26.6.73:!!,Bri,Enderle); Blöden nahe Rötsee bei Kißlegg (4.7.73:Bri,Enderle,!!), Urseen bei Beuron (12.7.73: Enderle, Bri,!!), Winnis bei Kißlegg (12.7.73 Bri,Enderle,!!), Wurzacher Ried (August 73:Bri,Enderle). Bayer.Westallgäu:Massenhaft bei Schnellers unweit Weiler (3.6.73:!!); die Wuchsorte Kremlen bei Oberreute und Scheidegg konnten bestätigt werden.- Dazu neue Wuchsorte für Aa (Deutschland:Gatterkopf und Kackenköpfe b.Rohrmoos, Schwarzenberg bei Obermaiselstein, Gschwenderhorn bei Bühl nahe Immenstadt und Aa(Vorarlberg):Untere Schönisboden-Alpe am Elferkopf im Kleinen Walsertal (alle !! zwischen Juni u.September 1973),

170. Epipogium aphyllum (F.W.SCH.)SW. (Widerbart)

Aa:Schwarzenberg b.Obermaiselstein,vonDr.Seybold entdeckt, bestätigt!! u.Brettar am 5.8.73; der Wuchsort im Kürenwald am Gottesacker konnte bestätigt werden, und zwar am 10.8.73 (!!) auf deutschem und österr.Boden.

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

171. Dactylorhiza traunsteineri (SAUT)SOO (Traunsteiners Knabenkraut)
Harprechtser Moor bei Eisenharz nahe Isny (26.6.73:!!).

172. Orchis morio L. (Gemeines Knabenkraut)
Auf Molinieten beim Weiler Knaus nahe Erkheim (Mai 73:Ha).

173. Orchis ustulata L. (Brand-Knabenkraut)
"Goldene Weide" b.Ettringen (14.6.73:!!,Ha,Su); Wertachdamm bei Irsingen (27.5.73:Ha).

174. Lemna trisulca L. (Dreifurchige Wasserlinse)
Württembg.Westallgäu:Rötsee bei Kißlegg (4.7.73:!!).

Nachtrag:

175. Carex brachystachys SCHRANK et MOLL (Kurzährige Segge)
Erstmals in Ho:Felsabstürze am Hauchenberg bei Waltrams (26.10.73:!!).

176. Ilex aquifolium L. (Stechpalme)
Die Angaben für die folgenden Fundorte verdanke ich Herrn Bartsch, Ofterschwang, Herrn Pächter, Hittisau, Frl.Kohler, Ofterschwang und Frau G.Stölzle, Kempten:
Im Hittisau an 3 Stellen: am Mühlbach nahe dem Rotenberg, Lecknersee und gegen den Hochhäderich.

177. Saxifraga aizoides L. (Quell-Steinbrech)
In einem Tobel b.Gestraz, entdeckt von Dr.Enderle,Wangen. Bestätigt: Bri,!!, 19.10.1973.

Anschrift des Verfassers: Dr.Erhard Dörr
Oberstudiendirektor
D-896 Kempten/Allgäu
Bodmanstr. 30

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: 17_3

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: Floristische Notizen zur Allgäu-Flora 1973. 2-15