

Richard WismathDie Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen *)a) Geographische Lage, Landschaftsformen, Umwelt:

Das Beobachtungsgebiet mit einer Gesamtfläche von 499,10 qkm - davon entfallen allein auf Wasserflächen 5,6 % (2786,25 ha) - erstreckt sich ausschließlich nur im Innern der Alt-Landkreisgrenze Füssen. Mit dem Reichtum der zahlreichen Seen - insgesamt 35 - ist es kein Wunder, daß die Familien der Sumpf- und Wasservögel nach den Singvögeln an zweiter Stelle neuzeitlicher Beobachtungen stehen. Nachstehende Aufstellung ergibt eine Gesamtübersicht einzelner Seen des Alt-Landkreises.

Bezeichnung des Sees	Fläche	Bezeichnung des Sees	Fläche
1 Alatsee	11,8680ha	19 Lacher See	1,0500ha
2 Alpsee	87,8000ha	20 Luinooser Weiher	7,5640ha
3 Attelsee	10,4130ha	21 Mittersee	1,1320ha
4 Attelsee/Weiher	2,2000ha	22 Neuweiher	4,1000ha
5 Bannwaldsee	229,5000ha	23 Obersee	7,2170ha
6 Bachweiher	7,0740ha	24 Oberer Lechsee	135,0000ha
7 Eschacher/Weiher	11,0470ha	25 Premer Lechsee	120,0000ha
8 Forggensee	1560,0000ha	26 Sameister/Weiher	34,3320ha
9 Faulensee	,7500ha	27 Seeger See	35,9812ha
10 Grundweiher	7,2320ha	28 Schapfensee	12,5000ha
11 Currenmarren/Weiher	3,1650ha	29 Schönewaldweiher	2,7900ha
12 Hergratsriedersee	11,5000ha	30 Schmutterweiher	27,8370ha
13 Huttlerweiher	4,9360ha	31 Schwaltenweiher	30,4149ha
14 Hofensee	219,0000ha	32 Schwansee	17,3980ha
15 Kalterweiher	0,4400ha	33 Schweineggerweiher	8,7000ha
16 Kögelweiher	9,2880ha	34 Trollweiher	13,9260ha
17 Kühmoos See	1,7400ha	35 Weissensee	135,0000ha
18 Langenwalder/Weiher	9,9360ha		

Die Höhenlage der aufgeführten Seen beträgt im Durchschnitt 780 m NN.

b) Namen weiterer Beobachter und Abkürzungen:

A. = Althof, Dellm. = F. Dellmuth, Erl. = G. Erlinger, H. = A. Heiss,
Ha. = F. Hanke, Schub. = Schubert, VSW. = Vogelschutzwarte Garmisch,
Willh. = Willhelm, AUW = Allgäuer Überlandwerk, Wis. = Wismath.


*) Die ehemaligen Landkreise Füssen und Marktoberdorf wurden im Zuge der Gebietsreform mit Wirkung vom 1.7.1972 vereinigt zum neuen Landkreis "Ostallgäu" (Anmerk. d. Redaktion).

Ba = Bachweiher, BWS = Bannwaldsee, EW = Eschacher Weiher,
 FS = Forggensee, He S = Hergarterieder See, HS = Hopfensee, HW =
 Huttlerweiher, KW = Kögelweiher, LS = Langenwalder See, LW = Lui-
 mooser Weiher, OS = Oberer Lechsee, SaW = Sameister Weiher, SeS =
 Seeger See, SchaS = Schapfensee, TW = Trollweiher, WS = Weissensee.

Weitere Abkürzungen:

Dz = Durchzügler, BV = Brutvogel, WG = Wintergast, Bp = Brutpaar.

Beobachtungsgebiet (Alt-Landkreis Füssen):



Artenliste:

1. Prachtaucher (Gavia arctica):

1959 im November wurden 2 Ex mit dem Fischernetz am Forggensee gefangen. Ein Präparat dieser beiden befindet sich in der Privatwohnung eines füssener Fischereimeisters. - Weitere Winterbeob. am 12.11.67 1EX (FS) durch VSW-Garmisch; 26.11.71 2Ex (FS) durch Wis.; 30.11.71 1Ex (FS) durch Schub.

2. Sterntaucher (Gavia stellata):

Erst eine Beobachtung durch die VSW am 18.12.1966 1Ex (FS), Ornithol.Anzeiger.

3. Haubenstaucher (Podiceps cristatus)

1971 konnte ich im Lkr. Füssen 28 sichere Brutnachweise liefern. Vollgelege (v. 27.5.-13.7.) - 28.6.71 sah ich am HS bereits 1/1 mit 3 juv. (Wis.) - Winterbeobachtungen liegen zwischen 180-500 Ex. max. (FS) - 30.11.71 380 Ex. (FS) Wis.

4. Rothalstaucher (Podiceps griseigena)

Vereinzelter Dz auf dem Herbstzug. Feststellungen am FS 18.9.66 1 Ex (VSW) - 15.10.1967 3 Ex (VSW) - 21.9.1969 2 (Wis; Delm.) 30.11.71 1 Ex (Schub.)

5. Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

Nebst den vorausgegangenen Brutnachweisen von Dr. BEZZEL und W. SCHUBERT (SchaS. u. TW), konnte ich diese Art bisher nur einmal (2.6.71) während der abendl. Balz und des Nestbauens am Trollweiher beobachten. Das Schwimmnest wurde ca 3 mtr. vom Schilfgürtel entfernt zum See errichtet. Am 6.6.71 wurde die bereits fertiggestellte Niststätte von aufkommenden Sturmböen weggefeegt. Nach intensiver Beobachtung fand dort 1971 keine Brut statt. Herbst-Winterbeobachtungen am FS 20.9.69 4 Ex (Wis.) - 25.10.69 32 Ex (Wis.) - 16.11.69 18 Ex (Wis.) 6.12.71 14 Ex (Wis.), 13.5.71 2 ad ♀ am Trollweiher (Wis.). Erste Frühjahrsbeobachtung, Ergänzung 15.6.72 3 Vollgelege (HW), 5.7.73 9 Vollgelege (TW), neuerstandene Brutpopulation!

6. Zwergtaucher (Podiceps ruficollis)

1971 26 sichere Bp. Am 12.6.71 wurde ich Zeuge beim Schlüpfen von 4 pull. (Wis.) am TW.

7. Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Regelmäßiger Dz am FS für mehrere Tage verweilend. - 16.10.66 1 Ex (VSW), 13.11.66 7 Ex (VSW), 18.12.66 1 Ex (VSW); aus Ornitholog. Anzeiger! 12.11.67 3 Ex (Wis.), 17.11.67 8 Ex (Wis.), 12.10.69 9 Ex (Wis.), 14.11.71 3 Ex (Schub.), 15.11.71 1 Ex (Wis.), 6.10.73 1 Ex FS (Wis.), 3.11.73 2 Ex FS (Wis.).

8. Fischreiher (Ardea cinerea)

Die Brutpopulation bei Enzenstetten weist 1965 18 Bp. auf. - Wegen Nachstellung durch Jäger verringerte sich der Brutbestand bis 1966 auf 13 Bp (Abschußprämien!) - Im Jahre 1971 hat die Kolonie das bisherige Max. von 21 Bp erreicht. Die Horste lagen dicht beieinander, sodaß ich im Umkreis von ca 400 qm allein 14 belegte Horste zählen konnte. Das Maximum der Jungreiher pro Horst betrug 5, das Minimum 2! Am 30.4.73 24 belegte Horste (erstgeschlüpfte Junge bereits 1^h Tage alt)!

9. Purpureiher (Ardea purpurea)

Am 21.5.72 beobachtete ich 1 Ex am Bannwaldsee N-Ufer (fischend!).

10. Seidenreiher (Egretta garzetta)

Erst eine Beobachtung am 17.6.65 2 Ex am E-Ufer des WS (Wis.).

11. Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

Am 14.6.65 1 fischend an der Weissenseer Ach. - 29.4.71 6 Ex fischend a.d. Wertach b. Nesselwang (Wis. Willh., Dellm.) - 1.5.71 3 Ex a.d. Wertach (Wis.).

12. Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

Am 16.7.68 1 Ex ♂ auf der Bananeninsel am FS (Wis.).

13. Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Regelmäßig rufendes ♂ 1961-65 am WS (Wis.), 18.12.69 1 Ex wurde erschöpft auf der Panzerstraße aufgefunden und zu mir in Pflege gebracht. Bereits nach einem vollen Monat - das Tier wurde nur mit frischen Forellen, Schleien und Hechten gefüttert - war die Rohrdommel wieder in ihrem Normalzustand gekommen und bei föhni-ger Witterung, an einem eisfreien Bachlauf ausgesetzt worden. 20.1.71 (Wis.); Maße: Schnabel 74 mm, Lauf 100 mm, Schwanz 131 mm Flügel 350 mm, Pfahlstellung: Höhe 920 mm, Spannweite 1300 mm. Letzte Beobachtung am 15.10.71 am SS 1 Ex fischend! (Wis.).

14. Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Im Frühjahr regelmäßiger Dz. - 1967 verweilte ein Paar längere Zeit am Seeger Kirchturn. Leider bezogen sie das eigens auf dem Dachfirst angebrachte Wagenrad nicht als Brutplatz. - Am 19.4.68 2 Ex bei Schwangau (Wis.). - 1.9.71 7 Ex bei St. Colomann in Schwangau auf Nahrungssuche (Wis.).

15. Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Vom 17.-20.10.66 verweilte am SaW ein Juv. Ex (Belegfoto) (Wis.). 12.10.73 1 Ex EW (Ad.).

16. Flamingo (*Phoenicopterus ruber*)

15.10.71 1 Ex FS-SE-Ufer auf Schlickfläche (Wis.).

17. Höckerschwan (*Cygnus olor*)

An 13 unserer Seen regelmäßiger Brutvogel. 1971 konnte ich 14 sichere Brutnachweise liefern. - In den Wintermonaten nimmt diese Art am Oberen Lech b. Füssen von Jahr zu Jahr zu. Jahresmaximalwert am 24.4.69 21 Ex, am 15.3.70 46 Ex und am 28.1.71 64 Ex (Wis.).

18. Graugans (*Anser anser*)

Am 5.10.71 (18 Uhr) überflogen 6 Ex den SeS in Richtung W-E, (Wis.).

19. Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Vom 21.9.69 - 18.11.69 1♂ am FS. Fluchtdistanz ca 200 m (Zoo=flüchtling?) Wis. - 14.11.71 1 Ex am FS (Schub.), 30.1.72 2 Ex FS (Wis.).

20. Pfeifente (*Anas penelope*)

14.9.69 1♀ am SaW. (Schub.); 16.10.73 1 ♀ am SaW (Wis.).

21. Schnatterente (*Anas strepera*)

26.5.69 4♀♀ am LW (Wis.); 21.9.69 3♀♀ am FS (Delm.); 16.10.73 2♀♀ am SaW (Wis.).

22. Krickente (*Anas crecca*)

1971 Brutverdacht am LS und HW (Wis.). - Ist WG am FS. Maxim. 127 Ex (10.1.64-Wis.).

23. Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Regelmäßiger und häufiger BV umliegender Weiher.

24. Spießente (*Anas acuta*)
16.1.66 8♀♀ am FS (Wis.) - 14.9.69 1♀ am SaW (Schub.)
25. Knärente (*Anas querquedula*)
26.5.69 1/1 am LW (Wis.) 29.3.72 3/3 am Schwaltenweiher.
1.4.72 4/4 am HW, 6.5.72 1/1 am BaW (es besteht Brutverdacht!)
26. Löffelente (*Anas clypeata*)
3.4.70 3/3 Ex am Oberen Lech (AÜW)-(Wis.), bereits verpaart!
16.10.73 1♀ SaW.
27. Kolbenente (*Netta rufina*)
14.9.66 1 Ex FS (VSW); 20.12.67 1 Ex FS (Wis.); 14.9.69 1♀ am SaW (SCHUB.); 8.4.72 4 Ex SeS (Wis.).
28. Tafelente (*Aythya ferina*)
31.5.69 4♂♂ am SaW - 26.6.70 2/2 Ex SaW - 22.8.71 4♂♂ am TW (Wis.). An beiden Gewässern ist diese Art BV!
29. Reiherente (*Aythya fuligula*)
Regelmäßiger BV in steigender Tendenz am SaW; HW; TW; und LS. -
31.5.69 14♂♂ am SaW (Wis.) - 4.5.70 3/3 Ex FS; 24.6.70 38/18 Ex am SaW (Wis.); 16.5.71 1/1 am TW (Wis.); 17.7.71 1 führendes ♀ mit 7 Pull. am LS (Wis.).
30. Bergente (*Aythya marila*)
16.1.67 1♂ am FS (Wis.) - Belegfoto! -
31. Eiderente (*Somateria mollissima*)
28.12.72 1♀ FS; 2.1.73 6♀♀ am Hüttenmühlsee (Grenzgebiet)(Wis.);
3.11.73 1♀ FS.
32. Schellente (*Bucephala clangula*)
Regelmäßiger, zahlreicher Dz und Wg von Ende Oktober (31.10.67) bis vereinzelt Anfang Mai (2.5.70 HeS). - 16.1.66 4Ex am FS -
31.10.67 6 Ex am FS - 29.1.69 33 Ex am FS - 4.2.69 65 Ex am FS -
24.4.70 3/3 Ex "balzend" am HeS - 1.5.70 2/2 Ex "balzend" am HeS -
2.5.70 1/1 Ex "balzend" am HeS (Wis.).
33. Zwergsäger (*Mergus albellus*)
16.12.67 1♂ am FS (Wis.); 10.3.72 3♀♀ HeS.
34. Mittelsäger (*Mergus serrator*)
13.11.66. 8Ex am FS (VSW) in Orn.
35. Gänsesäger (*Mergus merganser*)
1969 noch BV bei Roßhaupten! 48.6.69 1 führendes ♀ mit 5 Pull. (Wis.) - 4.5.70 am KW ' Roßhaupten 11 ♀♀; 4.5.70 1/1 Lech an der Landesgrenze; 26.7.71 1/1 Lech a.d.Landesgrenze. Seit 1967 Anfang Februar befinden sich fast täglich 8-12 Ex am KW.-Horn, welche in den frühesten Morgenstunden turbulente Gemeinschaftsjagden nach vorhandenen Forellen aufnehmen. Die Art erreicht bis Ende März (28.3.70 Wis.) 15 Ex ihr Maximum. Regelmäßiger WG am FS 28.9.69 86 Ex (Wis.).
36. Steinadler (*Aquila chrysaetos*)
Horst Straußberg-Süd seit 1957 verlassen (Störung am Horst durch Filmamateur!); Horst Aggenstein seit 1959 verlassen (Störung am

Horst durch unentwegte Kletterer!); erst Roßberg (Grenzhorst) seit 1967 verlassen (illegale Aushorstung 1 Juv.) - 20.7.69 Horst Straußberg-NE Bruterfolg! 1 Juv.wurde flügge!

37. Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Relativ häufiger BV im Lkr.Füssen (ca 30 Paare).

38. Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

AM 5.1.68 hielt sich 1 Ex bei Eschach auf (Wis.).

39. Sperber (*Accipiter nisus*)

24.5.67 1♂ tot aufgefunden bei Weissensee. 6.5.70 1Ex jagend nach einer Amsel am Kobelhang (Wis.). Ein Brutvorkommen ist sehr wahrscheinlich.

40. Habicht (*Accipiter gentilis*)

Spärlicher BV von nachweislichen 2-3 BP; 10.5.67. Horst I mit 3 Juv.der am 22.6.67 von einem Falkner geplündert wurde. - Darauf folgend war das Habichtspaar 2 Jahre nicht mehr im Horst=gebiet anwesend. Horst II (Füssen-C.) 19.5.68 2 Juv. (Wis.); Horst I war 1970 u.1971 wieder belegt. Erfolgreiche Brut mit 2 bzw 3 Juv. (Wis.).

41. Roter Milan (*Milvus milvus*)

Nur eine Beobachtung vom 3.1.66 1 Ex kreisend am Oberen Lech bei der Landesgrenze (Wis.).

42. Schwarzer Milan (*Milvus nigrans*)

Am 20.5.67 (9 Uhr) war ich Augenzeuge, wie zwei Kolkkraben den seit Jahren belegten Horst des Schw.Milans (WS) plünderten. Das Gelege bestand aus 3 Eiern. Bei der Verteidigung des Horstes verlor das ♀ durch ständig neue Angriffe der Kolkkraben insges. 9 Schwingfedern, die ich unterhalb des Horstes später fand. 1968 horstete das Paar etwa 500 m entfernt auf einer Buche. 20.4.68 beobachtete ich das Paar bei der Kopula (16 Uhr 48 auf einer Kiefer, Wis.). - 8.5.68 Vollgelege, bestückt mit 3 Eiern. 24.5.68 waren im Horst bereits 2 Juv. ca 1-2 Tage alt. Das 3.Ei war offensichtlich nicht befruchtet. 24.4.70 1Ex auf der Bundesstraße vor Roßhaupten; macht sich an einem überfahrenden Feldhasen zu schaffen.(Wis.).

43. Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

26.3.67 1Ex am FS ruhend auf einem vom Wasser vorstehenden Baumstumpf (Wis.) - Belegfoto -

44. Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Regelmäßiger BV in mind. 2-3 Paaren. - 20.5.67 1/1 am Salöber (Nestbau) auf einer Fichte (Wis.). - 17.7.71 1 Ex bei Pfronten (Wis.) - 28.7.71 2Ex kreisend nahe Falkenstein (Wis.).

45. Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

28.3.69 1Ex über FS (Dellm.); 11.5.71 2 Ex über KW(Wis.); 8.4.73 1Ex SeS (Wis.) Flugrichtung SW-NE.

46. Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Regelmäßiger Dz von Ende März bis Mitte Mai. Herbstbeobachtungen fehlen! - 1966 starker Brutverdacht unterhalb FS, 5.4.66 1Ex HS (Wis.); 28.4.66 2 Ex über FS (Wis.); 3.5.-10.5.66 täglich 2Ex

flußaufwärts vom KW-Roßhaupten - FS (Uhrzeit 6 - 6¹⁰). Ab dieser Zeit konnte ich nur noch 1 Ex sichten. 16.5.66 1Ex HS; 19.5.66 1Ex HeS; 26.5.66 1Ex FS; 7.6.66 1Ex BS; 15.6.66 1Ex mit Karpfen flußabwärts unterhalb KW-Roßhaupten; 17.6.66 1Ex mit Fisch in den Fängen flußabwärts unterhalb KW-Roßhaupten, N-E abgeflogen! 29.6.66 2Ex über FS, nach erfolgreicher Jagd flog einer in Richtung N-E ab. Das 2.Ex verweilte noch etwa 20 Min am FS und flog ohne Beute in Richtung S-E gegen Bannwaldsee ab. Trotz fast tägl. Beobachtungen konnte ich keine späteren Daten notieren. Einen Horst in näherer Umgebung konnte ich ebenfalls nicht ausmachen (Wis.).

47. Baumfalke (Falco subbuteo)

Regelmäßiger BV bei Eschach, Roßhaupten, Brunnen in 2-3 Paaren. Ankunft Ende April. Sicher zu beobachten aber erst ab 1.5. Die Eiablage findet in der Regel ab 1.6.-6.6. statt. Vollgelege fand ich erst ab 10.6. (Wis.).

48. Wanderfalke (Falco peregrinus)

Regelmäßiger BV im Lkr.Füssen, 1-2 Paare. 1967 Bruterfolg mit 3 Juv.; 1968 kein Bruterfolg, 30.5. Horst verlassen! - 1969 kein Bruterfolg! - 1970 1/1 hundert im Zeitwechsel von 75 Min.(9.5.). Am 23.5. war der Horst jedoch verlassen. 1971 kein Bruterfolg! Horstablösungen fanden jedoch noch regelmäßig bis 13.5. statt. Am 16.5.; 17.5.; 18.5. konnte ich keine Beobachtung mehr machen. 23.8.71 1Ex jagend nach einem Eichelhäher, Nähe Weissensee(Wis.).

49. Merlin (Falco columbarius)

6.1.68 1Ex bei Hohenschwangau (Wis.).

50. Rotfußfalke (Falco vespertinus)

Erst ein Nachw. . 24.4.69 2/1 Ex auf einer dünnen Fichte, vereint mit 2 Turmfalken (Wis.).

51. Turmfalke (Falco tinnunculus)

Regelmäßiger BV in mind. 20 Paaren im Lkr.Füssen (Wis.). 1972-1973 starke Abnahme auf ca 8-12 BF!

52. Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

Regelmäßiger BV im Hochgebirge zwischen 1650-2000 m ü.NN. 24.11.67 4Ex Hochplatte (1960m)(Wis.); 2.11.68 11 Ex Aggenstein (1650 m)(Wis.); 16.12.68 3 Ex Breitenberg (1600 m)(Wis.); 7.7.70 Vollgelege am Kenzenkopf (1680m)(Wis.); 24.7.70 1 führendes ♀ mit 7 Pull.(Säuling 1900m)(Wis.); 26.7.71 3 führende ♀♀ mit 6/7/8 Pull. (Aggenstein 1680 m)(Wis.).

53. Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Regelmäßiger BV in Höhen v.1500-1700m (Tegelberg, Ochsenkopf, Dürrenberg, Breitenberg, Roßberg) - Letzte Talbeobachtung 18.4.64 1♂ im Bannwaldseemoor (Wis.).

54. Auerhuhn (Tetrao urogallus)

Regelmäßiger BV in Höhen v.1200-1450 m (Schwangauer-Buchinger-Trauchgauer und Pfrontener Berge) ca. 15 Hähne! 16.6.70 Kofelalm (Dürrenberg 1420 m)(Wis.) 1 brütende Henne.

55. Haselhuhn (*Tetrastes bonasia*)

Regelmäßiger BV in Regionen bis 1200 m; bisher 5 Nachweise:
Buchenberg, Achat, Vilstal, Fischerwies, Jagdbergkopf.

29.3.67 1♂ bei der Fürstenstraße (Hohenschwangau); 4.10.70 1♀
am Jagdbergkopf 1100 m (Wis.).

56. Steinhuhn (*Alectoris graeca*)

Sehr spärlicher BV in Höhen v. 1800-2000 m. 1965 erster Brutnachweis durch Herrn O.J. HEI./Pfronten am Breitenberg (Gelegefund!)-
11.9.69 4Ex Roßberg (Wis.); 7.9.69 2Ex Hochplatt/Roggental (Rotä.);
4.10.71 1 Ex Roggental (Wis.) Fluchtdistanz ca 100 m.

57. Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Letzte Beobachtungen stammen aus den Jahren 1950-1955 bei Pfronten (H); eigene Beobachtungen fehlen!

58. Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Vereinzelter bis spärlicher BV und Sommervogel in umliegenden Feuchtwiesen. - 14.6.71 2 rufende ♂♂ bei Eschach; 18.6.71
1 rufendes ♂ bei Waltenhofen (Wis.); 22.6.72 1 rufendes ♂ HW -
Moorwiese, 10 Uhr (Wis.).

59. Fasan (*Phasianus colchicus*)

Am 21.7.67 konnte ich bei Brunnen 3/1 Ex auf einem Feld beobachten. Offensichtlich handelt es sich um ausgesetzte Exemplare.
Weitere Beobachtungen fehlen (Wis.).

60. Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

22.6.72 1 BP HW. Neststand: Zwischen Schilfbülten und Brennesselstauden.

61. Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

14.9.69 1 Ad mit Juv. (Schub.) am SaW. 3.9.72 1 Ad. FS (Horner Bucht) 18 Uhr (Wis.).

62. Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

9.8.69 1♀ am LW (Schub.)

63. Wachtelkönig (*Crex crex*)

24.6.68 1 rufendes ♂ bei Alterschrofen (Wis.); 20.6.70 1 rufendes ♂ bei Buchach/Seeg (Ha).

64. Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Regelmäßiger BV in 2-3 Paaren am BW und LW; 23.8.68 1/1 am BW;
20.5.69 EW; und TW je 1 BP (Wis.). 15.5.71 1/1 am TW (Wis.).

65. Bläßhuhn (*Fulica atra*)

Regelmäßiger, zahlreicher BV an allen umliegenden Weihern und einigen Seen. 1971 14 BP am TW (Wis.) und 8 BP am LS (Wis.).

66. Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Mitte Okt.(?) sah Schub. am SaW 1 Ex.

67. Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Regelmäßiger und in Tendenz steigender BV in umliegenden Feuchtwiesen (Bannwaldsee, Illasberg, Aitlesee, Buchach) insges. 12-14 BP.
Höchstwerte während des Herbstzuges: 21.11.68 41 Ex FS (Wis.);
5.3.72 32Ex BWS-Moor; 29.4.73 6 Ex FS-Moos.

68. Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

Mitte Okt. (?) sahen (Schub.-Mayer) am FS 4 Ex auf einer Schlickflache.

69. Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Bis 1950 regelm.BV am Lech bei Füssen (durch das Aufstauen des FS wurden die Brutbiotope überflutet). 2.6.71 1Ex auf einer künstlich angelegten Kiesbank am FS-Horn (Wis.).

70. Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

29.9.69 2Ex auf einer Schlickfläche vereint mit 48 Kampfläufern am SaW (Wis.-Dellm.).

71. Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*)

Mitte Sept.66 beobachtete NÖSS/Pfronten 1 Ex am Schönkaler (Belegfoto); 18.8.68 1 Ex am Einstein (Stumpf); 4.9.71 1Ex am Jagdbergkopf 1160 m (Wis.).

72. Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

14.11.71 1Ex FS (Schub.-Mayer); 8.5.73 1 Ex EW (Schmalzbauer).

73. Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Regelmäßiger BV in 8-10 Paaren (Bannwaldsee, Attlesee, Seeger See, Kirchtaler-Buchachermoor); 15.10.71 14 Ex am SeS (Wis.); 28.11.71 6 Ex am FS (Wis.); 11.4.73 5 balzfliegende ♂♂ am HS (Wis.).

74. Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

Regelmäßiger BV in höheren Regionen v. 900-1200 m; am 12.6.69 fand ich am Duchenberg (980m) ein Gelege mit 4 Eiern (Wis.); 28.4.70 4Ex bei Brunnen (Wis.).

75. Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Erstbeobachtung am 13.6.67 auf einer Brachwiese am HS (Wis.) 1Ex. Am 14.6.67 sah ich offensichtlich den gleichen Vogel um 4Uhr15Min. wieder auf dieser Wiese flötend einfallen. Weitere Beobachtungen fehlen! Die Meldung von Schub., daß diese Art im Wasenmoos/Pfronten brütet (höchstgelegener Brutplatz) dürfte sicher eine Fehlmeldung sein. Die Angaben von Herrn HEISS/Pfronten wurden sorgfältig überprüft, wobei die Aussagen nie auf einen Brutnachweis schließen lassen. Es wurden an der besagten Stelle nur ab und zu einzelne Ex angetroffen. 27.10.67 11 Ex bei Brunnen/FS (Wis.); 14.11.71 4 Ex am FS (Schub.-Mayer).

76. Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

30.4.71 3Ex am SeS (Wis.).

77. Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythrobis*)

Regelmäßiger Dz (nur Daten v. Herbstzug!); 28.3.69 1Ex (Wis.-Dellm.) am FS; 27.7.70 2 Ex EW (Wis.); 14.11.71 5Ex am FS (Schub.-Hackel).

78. Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Spärlicher Dz.; 16.10.67 3Ex am EW (Wis.); 25.5.70 1Ex am Lechsee/Lechbruck (Wis.); 18.7.70 1 Ex am HW (Wis.).

79. Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

20.9.69 1Ex am FS (Wis.-Dellm.); 21.9.69 3Ex am FS (Wis.-Dellm.); 3.4.70 1Ex am HeS (Wis.).

80. Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
28.8.69 1Ex am FS (Wis.-Dellm.); 20.9.69 1Ex am FS (Wis.-Dellm.).
81. Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
26.5.69 1Ex am EW (Wis.-Erl.); 28.8.69 1Ex am FS (Wis.-Dellm.);
24.5.70 1Ex am Lechsee/Lechbruch (Wis.).
82. Flußuferläufer (Tringa hypoleucos)
Regelmäßiger BV am Lech und Halblech, 2-3-Paare (Wis.).
Herbstzug v. Mitte Juli - Mitte Oktober. 17.7. FS - 20.10. FS.
83. Zwergstrandläufer (Calidris minuta)
22.9.69 5Ex am FS (Wis.-Dellm.).
84. Alpenstrandläufer (Calidris alpina)
21.11.68 1Ex am FS (Wis.); 21.9.69 5Ex am FS (Wis.-Dellm.);
14.11.71 18Ex am FS (Schub.-Hackel); 14.10.73 3Ex FS (Wis.).
85. Kampfläufer (Philomachus pugnax)
22.9.69 80-90 Ex am SaW (Wis.-Dellm.); 29.9.69 48Ex am SaW (Wis.-Dellm.).
86. Skua (Stercorarius skua)
Vom 4.10.66 - 12.10.66 hielten sich 3Ex am FS auf (Wis.) Beleg= foto! 3.11.73 1 Ex FS (Wis.).
87. Schmarotzerräubmöwe (Stercorarius parasiticus)
Am 20.9.69 beobachtete (Wis.-Dellm.) 1Ex am FS mit Luftangriffen auf eine ad. Lachmöwe.
88. Mantelmöwe (Larus marinus)
28.8.69 6Ex am FS (Wis.).
89. Heringsmöwe (Larus fuscus)
8.10.70 2Ex am FS (Wis.); 16.10.70 2Ex am FS (Wis.); 16.10.66 1Ex am FS (VSW).
90. Silbermöwe (Larus argentatus)
12.10.67 1Ex am Oberen Lech (Füssen) unter Lachmöwen (Wis.).
2.11.73 1Ex FS (Wis.).
91. Sturmmöwe (Larus canus)
12.12.71 3Ex am FS (Wis.).
92. Lachmöwe (Larus ridibundus)
Regelmäßiger, häufiger BV an umliegenden Seen u. Weihern. Die Brutstätten am Hopfensee, Bannwaldsee, Bacher-Weiher und Huttlerweiher zusammen weisen ca 150-180 BP auf. 12.10.67 mit 1 Silbermöwe am Oberen Lech b. Füssen (Wis.).
93. Zwergmöwe (Larus minutus)
Bis heute liegen von dieser Art erst zwei Beobachtungen vor.
18.12.66 1Ex (VSW); 28.8.69 1Ex (Wis.-Dellm.) jeweils am FS.
94. Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
Regelmäßiger, spärlicher Dz ab Anfang Mai (5.5.68 HW) sowie bis Ende September (FS). 30.5.67 12 Ex am FS; 16.9.67 8Ex am FS;

5.5.68 1Ex am HW; 26.5.68 2Ex am WS; 21.9.69 16 Ex am FS; 24.5.70 1Ex am LS (alle Wis.).

95. Raubseeschwalbe (Hydroprogne caspia)

20.9.69 5Ex am FS (Wis.-Dellm.).

96. Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

Regelmäßiger BV in 1-2 BP (Außerhalb des Lkrs. liegt der nächste Brutplatz a.d. Litzauer Schleife/Lech). Die dortige Brutpopulation schwankt zwischen 2-11 BP (seit 1965-1971) (Wis.). 1973 Bruterfolg auf künstlich erstellter Insel am FS (VSW).

97. Ringeltaube (Columba palumbus)

Regelmäßiger, zahlreicher BV in umliegenden Randgehölzen. Extremdaten: 9.9.69 76Ex bei Waltenhofen auf einer Lichtleitung (Wis.).

98. Turteltaube (Streptopelia turtur)

14.6.73 1Ex Pfronten-Fallmühle (Wis.).

99. Türkentaube (Streptopelia decaocto)

Erstbeobachtung 27.5.59 2Ex im Stadtgebiet Füssen (Wis.). Heute regelmäßiger BV im Siedlungsgebiet in 15-18 BP (1971) (Wis.).

100. Kuckuck (Cuculus canorus)

Stark verbreiteter Sommervogel im Bereich umliegender Seen (FS; HS; WS; BS; EW; HW; SaW; u.s.w.). Als Wirtsvogel bisher drei Feststellungen: Bachstelze (Motacilla alba); Rotschwanz (Phoenicurus ochruros); Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus). Extremdaten: 18.4.70 bei Hergadsried 1Ex (Wis.).

101. Schleiereule (Tyto alba)

Bisher erst ein Nachweis aus jüngerer Zeit. Anfang Mai 1962 Gelegefund durch R. bei Weissensec.

102. Uhu (Bubo bubo)

Regelmäßiger BV in drei sicheren BP (Alt-Lkr. Füssen).

Brutnachweis Horst I (1966) 1 Juv.

" Horst I (1967) 2 Juv. Horst II 2 Juv.

" Horst I (1968) 1 Juv. Horst II 2 Juv.

" Horst I (1969) 1 Juv. Horst II 1 Juv.

" Horst I (1970) unbek. Horst II 2 Juv.

" Horst III 3 Juv. (Wis.).

Die Kopula findet jeweils 11.3.-15.3. statt. Bevorzugt werden starke Kiefernäste od. direkt auf dem Feldband. Nach Angaben von Herrn RIEDEL (Falkner) sollte auch noch ein Horst bei Pfronten der VSW bekannt sein. - Demnach befinden sich allein im Lkr. Füssen 4 nachgewiesene BP (Wis.).

Die vorstehende Artenliste der Vogelwelt des Altlandkreises Füssen, deren Verfasser Herr Richard Wismath, D-8958 Füssen, Klosterstr. 6 ist, wird in der nächsten Folge dieser "Mitteilungen" fortgesetzt und abgeschlossen.

Die Redaktion

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [18_1](#)

Autor(en)/Author(s): Wismath Richard

Artikel/Article: [Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen. 42-52](#)