

Floristische Notizen aus dem Jahre 1974

=====

Auch diesmal können wir die Ergebnisse der Allgäu-Floristik nur auszugsweise wiedergeben, da eine vollständige Aufzählung aller neu registrierten Funde den zumutbaren Rahmen sprengen würde.

Der ungewöhnlich kurze Bergsommer - die letzte hochalpine Tour war uns am 22. September 1974 (!) möglich - ließ viele Pläne unverwirklicht. Immerhin haben wir uns bestimmten Teilen des Untersuchungsgebietes relativ gründlich widmen können. Dazu gehören besonders die Flyschberge der sog. "Üntschendecke" zwischen Widderstein und Hohem Ifen. Die Exkursionen in diesem Raum erbrachten viel neues Verbreitungsmaterial. Gewisse "Leerräume" im Rahmen unserer floristischen Untersuchungen sind noch immer die meisten Gipfel der Hornbachkette und die Berge der orographisch linksseitigen Lechumrahmung von Häselgehr an abwärts.

Unsere Bemühungen um die systematische floristische Erforschung des Allgäus und seiner Grenzbereiche haben entscheidend gefördert:

Herr Professor Dr.H. MERKMÜLLER, der als Direktor der botanischen Staatssammlungen in München jederzeit Zugang zu den Sammlungen und sonstige Hilfe gewährte; sein Mitarbeiter, Herr Dr.W. LIPPERT, dem ich viele Hinweise, vornehmlich aber die Bestimmung schwieriger Arten verdanke; weitere Mitarbeiter des Botanischen Instituts, Herr Professor Dr.D.PODLECH und Herr Dr.K.P. BUTLER, gaben wichtige Anregungen. Herr H. HACKEL (Mindelheim) stellte mir eine ausführliche Fundliste aus dem Kreis Unterallgäu zur Verfügung. Zahlreiche Einzelangaben machten Herr Rektor G.W. BRIELMAIER (Wangen), Herr Lehrer A.ESCHELMÜLLER (Sulzberg), Herr E.GLÖGGLER (Ottobeuren), Herr R. REGELE (Landsberg) und Frau E. SUTTER (Kempten).

Beiträge verschiedener Art haben geliefert: Herr Oberreg.-Rat Dr.W. BRAUN (München), Herr Professor Dr.A. BRESINSKY (Regensburg), Herr O.BRETTAR (Kaiserslautern), Herr Dr.W. ENDERLE (Wangen), Familie KIRCHNER (Teichgut Unggenried b.Mindelheim), Herr Direktor Dr.O.KLEMENT (Lindenberg), Herr K.LÜBENAU (Kempten), Herr Gymnasialprofessor L.MÜLLER (Kempten), Herr W.PÖTZL (Bergwacht-Kempten), Herr Stud.-Rat R. RAMPP (Pfaffenhausen), Herr Gymnasialprofessor U.SCHOLZ (Kempten), die Herren Apotheker SCHRÖPPEL sen.u.Jun. und Herr Dr.E. SEITZ (Nonnenhorn). Ganz besonders danke ich meiner Frau, die mich auf nahezu allen Exkursionen begleitete und eine Reihe wichtiger Fundorte entdeckte.

Abkürzungen: Bri = G.W.Brielmaier, !! = E.Dörr, E = A.Eschelmüller,
Glö = E. Glögger, Ha = H.Hackel, R = R.Regele,
Su = E.Sutter.

1. Diphasium alpinum (L.) ROTHM. (Alpen-Flachbärlapp)
Aa (Vorarlberg): Liechelkopf (Westhang) (2.9.74-!!); Grünhorn (15.9.74-!!); Aa (Bayern): Südhänge des Bolgen, ca 1400 m (21.9.74-!!).-
2. Selaginella helvetica (L.) LK. (Schweizer Moosfarn)
Hbu (Württemberg): Argenau östl. Langenargen (24.5.74-!!).-
3. Equisetum arvense L. (Zinnkraut)
Aa (Vorarlberg): Burgl-Alpe am Feuerstätter Kopf bei Balderschwang bei ca 1400 m (10.9.74-!!).-
4. Equisetum fluviatile L. (Teich-Schachtelhalm)
Aa (Bayern): In einem Tümpel der Toniskopf-Alpe nahe Rohrmoos b. Oberstdorf, ca 1250 m (14.6.74-!!).-
5. Equisetum hiemale L. (Winter-Schachtelhalm)
Ho-Grenzgebiet: Neufnachtal östl. Markt Wald (22.5.74-Ha).-
6. Equisetum variegatum SCHLEICH (Bunter Schachtelhalm)
Hbo (Bayern): Kalkhangmoor b. Bauschwenden nahe Gestratz (28.4.74-!!); Sohle des Fesselbachtobels b. Scheffau (25.5.74-!!).-
7. Blechnum spicant (L.) ROTH. (Rippenfarn)
Grenzgebiet zwischen Hbo und Hbu (Württemberg): Tettlinger Wald südwestl. der Gießenbrücke (8.11.74-!!); Grenzgebiet zwischen Hbu und Hbo (Bayern): Lindau-Motzach (22.12.74-!!); Hbo (Bayern): Südwestl. Hangnach b. Lindau (23.12.74-!!), Ober-Rengersweiler (23.12.74-!!), mehrfach bei Unterreitnau (25.12.74-!!).-
8. Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM. (Hirschzunge)
Hbo (Bayern): Spärlich nordwestl. Almansried bei Lindenberg, (21.4.74-!!).-
9. Asplenium trichomanes L. (Drauner Streifenfarn)
Aa (Vorarlberg): am Grünhorn noch bei 2000 m (15.9.74-!!).-
10. Asplenium viride L. (Grüner Streifenfarn)
Ho: auf Nagelfluh beim Bf Woringen (17.11.74-Glö,!!), Katzbrunnmühle und Schlottermühle bei Köngetried (14.7.74-!!), Unterwarlins bei Böhen (5.12.74-!!), Stöcken bei Waldmühle südwestl. Günzegg (11.12.74-!!).-
11. Asplenium adiantum-nigrum L.s.str. (Schwarzer Streifenfarn)
Südl. Opferbach (29.12.74-!!), damit ist erstmals wieder eine Bestätigung des Vorkommens dieser Art im Allgäu gelungen.
12. Woodsia pulchella BERTOL. (Zierlicher Wimperfarn)
Aa (Vorarlberg): Westhänge des Liechelkopfes im Kleinen Walsertal auf Hornstein zwischen 1850 - 1950 m, zahlreich! (2.8.74-!!).
Der dritte uns bekannte Wuchsort in den Allgäuer Alpen!
Artdeterminierung durch Dr. LIPPERT (München).-

13. Dryopteris villarsii (BELL.)WOYN. (Starrer Wurmfarne)
 Aa: Haglertal nahe der Noppenspitze (Tirol) zw.1500 u. 1650 m, (14.8.74-!!), Wannenkopf am Heiterberg b.Schröcken (Vorarlberg). (5.9.74-!!), Sulzspitze nahe der Landsberger Hütte (Tirol), (7.9.74-Kriemhild Dörr, !!).-
14. Polystichum lonchitis (L.)ROTH. (Lanzen-Schildfarne)
 Hbo: Geröllfeld am Pfändergipfel (Vorarlberg), (20.4.74-Kriemhild Dörr,!!).- Ho: sehr spärlich östl.von Woringen, mit kleinen, aber fruchtenden Wedeln, (17.11.74-entdeckt von Glö, bestätigt !!), an der Kirnach im Kemptener Wald bei Görisried (27.9.74-!!).-
15. Polypodium vulgare L. (Gemeiner Tüpfelfarne)
 Aa (Vorarlberg): Ochsenhofener Köpfe bei ca 1750 m (15.9.74-!!), Hbu: südlichster Tettlinger Wald bei Langenargen (3.11.74-Kriemhild Dörr, !!).-
16. Taxus baccata L. (Eibe)
 Aa (Bayern): Tatzentriebsköpfe bei Pfronten (13.6.74-!!).-
17. Ceratophyllum demersum L. (Gemeines Hornblatt)
 Hbo (Württemberg): Schleinsee (11.10.74-!!), E.Bri).-
18. Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz)
 Ho: Wenglingen b.Kaufbeuren (19.4.74-!!), Neubestätigung!
19. Aquilegia vulgaris L. (Gemeine Akelei)
 Ho: im sog."Leutental" südl.Helchenried (Dirlewang)(14.7.74-Ha,!!).-
20. Pulsatilla vernalis (L.)MILL. (Frühlings-Küchenschelle)
 Aa:Schochenspitze nahe der Landsberger Hütte (Tirol)(13.7.74-!!), Westhang des Liechelkopfes bei ca 2000 m (Vorarlberg)(2.8.74-!!).-
21. Pulsatilla vulgaris MILL. (Gewöhnliche Küchenschelle)
 Ho: südöstl.Friesenried b.Kaufbeuren (19.4.74-!!).-
22. Hepatica nobilis MILL. (Leberblümchen)
 Ho: "Leutental" bei Dirlewang (4.8.74-Ha,!!), am Rande des Kemptener Waldes bei Stein unweit Betzigau (27.9.74-!!), westl. Eicht bei Bertoldshofen (12.5.74-!!).-
23. Ranunculus pseudocassubicus H.CHRIST (Pseudokassubischer Hahnenfuß)
 Ho: östl.Eldern b.Ottobeuren (1.6.74-entdeckt von Glö, bestätigt !!); südwestl.Erpfting im feuchten Eschenwald massenhaft (7.6.74-entdeckt von R. bestätigt !!).-
24. Ranunculus auricomus L. (Gold-Hahnenfuß)(ohne Spezifizierung der Kleinart)
 Hbu erstmals: Feuchte Wiesen im "Birkenried" zw. Wasserburg und Enzisweiler (10.6.74-!!); Ho: im Haselbachtal b.Arlisried/Unterallgäu (9.4.74-!!); auf feuchten Wiesen unterhalb der Mindelburg (1.5.74-Ha); auf Naßwiesen des Großen Unggenrieder Weihers b.Mindelheim (Mai 74-Ha).-
25. Ranunculus oreophilus BIEB. (Ran.montanus-Gruppe)
 Ho: südöstl.Friesenried b.Kaufbeuren (19.4.74-!!).-

26. Ranunculus arvensis L. (Acker-Hahnenfuß)
Ho: In Wintergerstenfeldern nördl. Helchenried b. Mindelheim, (7.7.74-Ha).-
27. Ranunculus serpens SCHRANK (Wurzelnder-, Niederliegender Hahnenfuß)
Aa (Bayern): Fuß des Wertacher Hörnles (Aug.74-Su).-
28. Ranunculus bulbosus L. (Knolliger Hahnenfuß)
Hbu (Württemberg): Argenmündungsgebiet bei Oberdorf (24.5.74-!!);-
Hbo: Isnerberg bei Gestratz (Bayern) (3.5.74-!!); Trifts b. Wangen (10.5.74-!!; Bri) (Württemberg); Ho: Staig b. Krugzell (1.5.74-!!).-
29. Ranunculus sceleratus L. (Gift-Hahnenfuß)
Ho: Im Baiweil-Mindelheimer-Kirchheimer Trockental an drei Stellen; Abwassergraben zw. Dirlewang und Helchenried (7.7.74-Ha, best.:!!); spärlich im Pfaffenhofener Moos (27.7.74-Ha, Rudi Rampp); Fischweiher südl. Hausen (1.9.74-Ha). Hackel ist der Ansicht, daß diese Vorkommen auf Vogelverschleppung (Vogelzustrafe!) beruhen.
30. Thalictrum minus L. ssp. majus (CR.) R. & F. (Kleine Wiesenraute)
Aa (Vorarlberg): Derraköpfele bei Baad (31.8.74-!!).-
31. Erysimum cheiranthoides L. (Acker-Schöterich)
Aa (Tirol): ruderal in Zöblen bei Tannheim (17.6.74-!!).-
32. Barbarea intermedia BOR. (Mittleres Barbarakraut)
Aa: Hahnenkamm bei Reutte (Tirol) bei ca. 1800 m (17.9.74-!!);
Hbu neu: Lindau-Zech am Zollhaus (10.4.74-!!); Hbo: Pfänder-Westhang (Vorarlberg) (20.4.74-!!); Arnegger bei Grünkraut (Württemberg) (4.5.74-!!; Bri); Ho: Dornau südl. Schongau/Lech (12.5.74-!!).
Die Art breitet sich also noch immer weiter aus!
33. Cardamine residifolia L. (Resedablättriges Schaumkraut)
Aa (Vorarlberg): Äußere Stierhofalpe an den Ochsenhofner Köpfen, ca. 1700 m, Grünhorn ca. 2000 m (22.9.74-!!). Neu für diesen Bereich!
34. Dentaria bulbifera L. (Zwiebel Zahnwurz)
Aa: Großer Wald am Wertacher Hörnle ("Untere Metzg" ca. 1100 m) (8.6.74-Gering, Pötzl, !!);
Hbo: Löffelmühle bei Bergatreute/Wolfegg (6.4.74:!!).-
35. Dentaria pentaphyllos L. (Finger-Zahnwurz)
Hbo (Württemberg): Löffelmühle b. Bergatreute (6.4.74-!!).-
36. Arabis alpina L. (Alpenkresse)
Hbo (Vorarlberg): am Pfändermassiv in einer Waldschlucht bei Bromatsreute (13.4.74-!!).-
37. Brunia orientalis L. (Morgenländisches Zackenschötchen)
Ho: Bahnhofsbereich Mindelheim (Juni 74-Ha).-
38. Lunaria rediviva L. (Mondviole)
Aa (Bayern): Westfuß des Burgberger Hörnles und Südfuß des Grünten (24.11.74-!!).-
39. Draba aizoides L. (Immergrünes Felsenblümchen)
Aa: Winterstaude (Vorarlberg) (30.7.74-Su, !!); Haglertal und Balschtesattel bei Häselgeh (Tirol) (14.8.74.-!!).-

40. Petrocallis pyrenaica (L.) R. BR. (Steinschmüchel)
Aa (Tirol): An der Gelben Scharte b. Tannheim (7.7.74-entdeckt von E, bestätigt !!). Zweites bekanntes Allgäuer Vorkommen! Sonst nur am Daumen gefunden.
41. Cochlearia officinalis L. ssp. alpina (BAB.) HOOK. (Löffelkraut)
Ho: Im Schwarzen Graben b. Kleinkemnat (19.4.74-entdeckt von Apotheker Hermann/Kaufbeuren, bestätigt:!!).-
42. Camelina sativa (L.) CR. (Saat-Leindotter)
Ho: Bahnhöfe Memmingen (12.6.74-!!, Glö), Ottobeuren (12.6.74-!!, Glö) und Buchloe (30.6.74-!!).-
43. Lepidium campestre (L.) R. BR. (Feld-Kresse)
Aa: Bahnhof Sonthofen (Juli 74-!!).-
44. Lepidium rudera L. (Stink-Kresse)
Hbo: Bahnhof Wangen (16.7.74-!!).-
45. Cardaria draba (L.) DESV. (Pfeilkresse)
Hbo: Ravensburg-West (Senbad) (4.5.74-!!, Bri).-
46. Diplotaxis tenuifolia (JUSL.) DC. (Schmalblättriger Doppelsame)
Hbo: Bahnhof Leutkirch (14.8.74-!!).-
Ho: Bahnhof Kaufbeuren (18.6.74-!!).-
47. Sisymbrium orientale TORN. (Orientalische Rauke)
Ho: Bahnhof Ottobeuren (12.6.74-Glö, !!).-
48. Sisymbrium altissimum L. (Ungarische Rauke)
Ho: Bahnhof Buchloe (30.6.74-!!).-
49. Sempervivum montanum L. (Berg-Hauswurz)
Aa (Vorarlberg): Sehr zahlreich auf dem Grünhorn bei Baad; ein anscheinend völlig isoliertes Vorkommen (15.9.74-entdeckt von Kriemhild Dörr, bestätigt:!!). Die Art wächst demnach nach unserer derzeitigen Kenntnis an vier verschiedenen Stellen der Allgäuer Alpen, Tirols und Vorarlbergs und nirgends auf bayerischem Boden. Förderreiters Meldung (vergl. "Die Allgäuer Alpen"), wonach Sempervivum montanum auch auf der Winterstaude bei Bezau wachsen soll, hat sich als falsch erwiesen. Die dort wachsende Pflanze ist eindeutig Sempervivum alpinum (GR. et SCH.) WETTST. (Alpen-Hauswurz) (30.7.74-!!).-
50. Sedum alpestre VILL. (Alpen-Fetthenne)
Aa (Vorarlberg): Grünhorn bei Baad (15.9.74-!!); Ochsenhofener Scharte (15.9.74-!!).-
51. Saxifraga mutata L. (Kies-Steinbrech)
Hbo: Im Kesselbachtobel bei Scheffau auf deutschem und auf österreichischem Boden zahlreich (25.5.74-entdeckt von Kriemhild Dörr, bestätigt:!!). Das Vorkommen ist ein Zwischenglied zwischen den Vorarlberger und den bisher schon bekannten Hbo-Vorkommen in Bayern und Württemberg (Adelegg, Eistobel).
52. Saxifraga bryoides L. (Moos-Steinbrech)
Westliche Hänge des Liechelkopfes (Vorarlberger Aa) auf Hornstein zw. 1850 u. 1950 m (2.8.74-!!). Unser bisher tiefstes Vorkommen! Die Pflanze gedeiht hier mit Woodsia pulchella u. Dianthus sylvester.

53. Saxifraga aizoides L. (Fetthennen-Steinbrech)
Hbo (Württemberg): weit nach Westen exponiert auf der Gemarkung Grünkraut in Kalkhangmoor-Assoziation. (4.5.74.-Winterhoff mit Paul Schmid, bestätigt:Bri, !!).-
54. Ribes nigrum L. (Schwarze Johannisbeere)
Ho: Südlicher Seerer See bei Seeg (18.5.74-!!,Su).-
55. Malus sylvestris (L.)MILL. (Holzapfel)
Hbo (Bayern): im Tobel des obersten Rickenbaches bei Scheidegg (20.10.74-!!); Ho: nahe der Ehwismühle b.Ittelsburg(17.11.74-!!).-
56. Pyrus pyraeaster (L.)WALLR. (Holzbirne)
Aa: Simatsgundalpe am Rindalphorn (21.7.74-!!);
Ho: Brüchlings b.Ottobeuren (17.9.74-!!).-
57. Cotoneaster tomentosa (AIT.)LDL. (Filzige Zwergmispel)
Aa (Bayern): Palmenberg b.Bad Oberdorf (Hindelang)(15.6.74-entdeckt von E, bestätigt:!!); Wildfräuleinstein b.Hinterstein (15.6.74-!!).-
58. Cotoneaster integerrima MED. (Gemeine Zwergmispel)
Aa (Vorarlberg): Grünhorn bei Baad (15.9.74-!!).-
59. Rubus saxatilis L. (Stein-Beere)
Hbo (Bayern): Kesselbachtobel bei Scheffau (25.5.74-!!);
Ho: "Leutental" bei Helchenried (Dirlewang)(16.6.74-Ha,!!);
Haselbachtal bei Arlésried (9.4.74-!!).-
60. Rosa pendulina L. (Alpen-Rose)
Ho: spärlich zwischen der Unggenrieder Weihermühle und der Tierkörperverwertungsanstalt (17.6.74-Ha).-
61. Genista germanica L. (Deutscher Ginster)
Hbo (Württemberg): Trockenhang bei Haslach nahe Rot a.d.Rot, (7.4.74-!!).-
62. Ononis arvensis L. (Bocks Hauhechel)
Hbo (Bayern): Adventiv auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.8.74-!!,Brettar).-
63. Melilotus altissimus THUILL. (Sumpf-Steinklee)
Aa (Tirol): Adventiv am Hahnenkamm bei Reutte bei ca 1800 m (17.9.74-!!).-
64. Trifolium incarnatum L. (Inkarnat-Klee)
Hbo (Bayern): Adventiv auf Müll zw.Oberstaufer und Genhofen, (10.8.74-!!,Brettar).-
65. Astragalus penduliflorus LAM. (Hängeblütiger Tragant)
Aa (Vorarlberg): Höferspitze am Widderstein, Ostgrat (16.8.74-!!);
Derraköpfe bei Baad, ca 1500 m (31.8.74-!!); Südosthang des Walmendinger Hornes nahe der Bühlalpe bei ca 1300-1400 m (22.9.74-!!). Alle diese Vorkommen liegen im Gebiet der sogenannten Üntschentfisch-Decke.
66. Lathyrus aphaca L. (Ranken-Platterbse)
Hbo: Reichlich blühend auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen, (10.8.74-!!,Brettar).-

67. Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP. (Schmalblättriges Weidenrös.)
Aa: Hahnenkamm b. Reutte (Tirol) ca 1800 m (17.9.74-!!);
Walmendinger Horn (Vorarlberg) bei ca 1900 m (15.9.74-!!).-
68. Epilobium collinum S.G. GEMEL. (Hügel-Weidenröschen)
Aa (Vorarlberg): an Felsen nahe der Inneren Stierhöf alpe an den
Ochsenhofener Köpfen bei Baad, ca 1750 m (12.9.74-!!).-
69. Circaea alpina L. (Alpen-Hexenkraut)
Ho: "Leutental" b. Helchenried (17.8.74-Ha); im Saulengrainer Wald
bei Stetten (17.8.74-Ha).-
70. Viola mirabilis L. (Wunder-Veilchen)
Hbu (Württemberg): In den Argenauen von Gießenbrücke bis zur Fluß=
mündung durchgehend (14.5.74-!!). Neubestätigung!
Hbo (Württemberg): Trifts bei Wangen (7.5.74-Bri,!!);
Ho (Württemberg): rechts der Iller bei Ferthofen (7.4.74-!!).-
71. Viola alba BESS. (Weißes Veilchen)
Hbo (Vorarlberg): An etlichen Stellen an den westlichen Pfänder=
hängen (20.4.74-!!).-
72. Viola calcarata L. (Spornveilchen)
Aa (Tirol): Im Noppenkar an der Noppenspitze (14.3.74-!!)
73. Malva alcea L. (Spitzmalve)
Auf einem Schuttplatz im Salger Moos b. Mindelheim (13.7.74-Ha).-
74. Tilia cordata MILL. (Winter-Linde)
Hbu (Württemberg): Argenmündungsgebiet bei Langenargen (24.5.74-!!)
Hbo (Vorarlberg): Hänge a.d. Bregenzer Ach b. Kennelbach (20.10.74-!!).
75. Tilia platyphyllos SCOP. (Sommer-Linde)
Hbu (Württemberg): Argenmündung b. Langenargen (24.5.74-!!);
Hbo (Württemberg): Heggelbach/Argen (24.5.74-!!).-
76. Geranium pyrenaicum BURM. (Berg-Storachschnabel)
Ho: Illerauen b. Buxheim (24.5.74-Ha, Glö);
Bahnhof Woringen (17.11.74-Glö,!!).-
77. Geranium molle L. (Weicher Storachschnabel)
Ho: Ruderal auf dem alten Exerzierplatz nordwestl. Landsberg
(7.6.74-R,!!).-
78. Acer campestre L. (Feld-Ahorn)
Aa (Vorarlberg): Bezau, Anstieg gegen die Winterstaude (30.7.74-!!)
Kennelbach b. Bregenz (20.10.74-!!);
Ho: "Leutental" b. Helchenried (14.7.74-Ha,!!).-
79. Polygala serpyllifolia HOSE. (Quendel-Kreuzblume)
Aa (Bayern): Gratvorsäßalpe am Hochgrat (26.5.74-!!); Gierenkopf
bei Balderschwang (23.7.74-!!);
Hbo (Bayern): Schirpfeltobel bei Scheffau (26.5.74-!!),
Lindenberger Moos (25.5.74-!!).-
80. Polygala chamaebuxus L. (Buchsblättrige Kreuzblume)
Hbo (Vorarlberg): unter den Kanzelfelsen am Pfändermassiv b. Backen=
reute (14.5.74-!!);
Ho: Hochterrassenschotterhang östl. Ketterschwang (12.5.74-Ha).-

31. Euphorbia dulcis L. (Süße Wolfsmilch)
Hbo (württembergisches Argengebiet): Trifts b.Wangen (10.5.74-Bri,!!); Heggelbach (24.5.74-!!); Argenauen b.Oberdorf und von da zerstreut bis zur Argenmündung (24.5.74-!!).-
32. Evonymus latifolia (L.)MILL. (Voralpen-Spindelstrauch)
Hbo: Pfänder-Westhänge (Vorarlberg)(20.4.74-!!); Syrgestein (bayerisch)(28.4.74-!!);
Ho: Unter-Warlins b.Böhen (5.12.74-!!); Ehwismühle b.Ittelburg (17.11.74-!!); Steilhänge südwestl. Ronsberg (6.11.74-!!); Katzbrui-Mühle bei Köngetried (14.7.74-Ha,!!).-
33. Ilex aquifolium L. (Stechpalme)
Hbo (Bayern): Hattnau b.Wasserburg/Bodensee (31.12.74-!!); Unterreitnau (25.12.74-!!;Su); südl.Oberreitnau,Rehlings b.Lindau (26.12.74-!!); Weissensberg b.Lindau (22.12.74-!!);
Ho: am Sonneck b.Weilerlei (29.3.74-!!);
Hbo (Vorarlberg): am Pfändermassiv an der Ruggburg und an den Kanzelfelsen bei Backenreute (12.4.74-!!;Su);
Hbu (Württemberg): Tunau (31.10.74-!!); Tettnager Wald bei Langenargen (3.11.74-!!); Seewald b.Eriskirch (3.11.74-!!;Su);
Aa (Bayern): Fuß des Rindalphornes (21.7.74-E, bestätigt:!!); ferner südöstl.Hohenweiler und beim Kloster Maria-Stern (29.12.74-Kriemhild Dörr, !!).-Hbo:Ober-Rengersweiler b.Oberreitnau (23.12.74-!!).-
34. Staphylea pinnata L. (Pimpernuß)
Ho: spärlich in den Illerauen südl.Buxheim (25.5.74-Ha,Glö,Köbele),
Hbo (Vorarlberg): Ruggburg am Pfänder bei Backenreute (12.4.74-!!).-
35. Cornus mas L. (Kornelkirsche)
Aa: Illerauen bei Immenstadt (15.5.74-!!).-
36. Hydrocotyle vulgaris L. (Wassernabel)
Hbo (Württemberg): Holzweiher b.Neukirch (18.9.74-!!;Dri);
Hbu (Bayern): "Birkenried" zwischen Enzisweiler und Wasserburg (10.6.74-!!).-
37. Anthriscus nitida (WAHL)HAZSL. (Glänzender Kerbel)
Aa (Bayern): Scheidwanger Alpe b.Gunzedried (23.7.74-!!).-
38. Bupleurum ranunculoides L. (Hahnenfuß-Hasenohr)
Aa (Vorarlberg): Hasenstrickweg an der Winterstaude (30.7.74-Su, bestätigt:!!).-
39. Athamanta cretensis L. (Alpen-Augenwurz)
Aa (Tirol): Schartschrofen b.Tannheim (Tirol) (17.6.74-!!); Schlicke (11.9.74-Su,!!); Luxenacher Sattel und Noppenspitze (14.8.74-!!).-
90. Pleurospermum austriacum (L.)HOFFM. (Österreichischer Rippensame)
Ho: In Auwaldresten südöstl.Amberg (16.6.74-Ha).-
91. Ammi majus L. (Große Knorpelmöhre)
Ho: Adventiv im Mindelheimer Bahnhof (15.6.74-!!). Hier vor Jahren von Glöggl gefunden!
92. Salix eleagnos SCOP. (Grau-Weide)
Hbu (Württemberg): Argemündung b.Langargen (31.10.74-!!).-

93. Salix glabra SCOP. (Kahle Weide)
Aa (Vorarlberg): Güntlesspitze (31.8.74-!!) und Grünhorn (15.9.74-!!) auf Flysch.
94. Salix appendiculata VILL. (Großblättrige Weide)
Hbo (Bayern): Litzis bei Opfenbach (24.4.74-!!), Kesselbachtobel bei Scheffau (25.5.74-!!).-
95. Carpinus betulus L. (Gemeine Hainbuche)
Hbo (Bayern): An der Laiblach unterhalb Niederstaufer (Okt.74-!!).-
96. Betula humilis SCHR. (Niedrige Birke)
Ho: Großer Kirchthaler Filz bei Lenggenwang (3.6.74-!!).-
97. Alnus viridis (CHAIX.)DC. (Grün erle)
Ho: Stoffelsberg und zwischen Börlas und Diepolz (29.3.74-!!).-
98. Castanea sativa MILL. (Edelkastanie)
Hbu (Württemberg): Argenauen b. Langenargen (10.6.74-!!); (Vorarlberg): Fuß des Gebhardsberges bei Kennelbach (20.10.74-!!); (Bayern): Schönbühel b. Lindau (22.12.74-!!).-
99. Thesium pyrenaicum POURR. (Wiesen-Lainblatt)
Ho: im Salger Moos b. Mindelheim (Juli 74-Ha) und nächst dem Leutenhof bei Helchenried (Juli 74-Ha).-
100. Rumex maritimus L. (Goldampfer)
Ho: Ruderal auf Müll beim Oberauerbach (17.8.74-Ha); vielleicht Vogelschleppung von Unggenried aus?
101. Rumex palustris SM. (Sumpf-Ampfer)
Hbo (Bayern): Halbadventiv am Rande eines Müllplatzes zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.8.74-!!, Brettar); (Determination bestätigt: Lippert, München). Es handelt sich um das erste wirklich belegbare Vorkommen der Art im südschwäbischen Raum. Nördlich der Donau tritt sie -z.B. an der Wörnitz im Ries!- häufiger auf. Frühere Angaben für das Allgäu beruhen wohl auf Verwechslungen mit Rumex maritimus.
102. Rumex pulcher L. (Schöner Ampfer)
Adventiv auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.8.74-!!, Brettar).-
103. Rumex sanguineus L. (Hain-Ampfer)
Aa (Vorarlberg): an der Bregenzer Ach unterhalb Schröcken (11.8.74-!!); am Anstieg von der Hinteren Simatsgundalpe zum Rindalphorn (Bayern) (21.9.74-!!);
Ho: Hochfürstwald bei Erisried (4.8.74-!!).-
104. Rumex aquaticus L. (Wasser-Ampfer)
Ho: Pfaffenhausener Moor und Salger Moor b. Mindelheim (Juli 74-Ha).-
105. Rumex scutatus L. (Schild-Ampfer)
Aa (Vorarlberg): Wanne am Heiterberg (5.9.74-!!); Derra-Köpfe bei Baad (31.8.74-!!; Walmendinger Horn, SO-Hang (22.9.74-!!)).-
106. Chenopodium glaucum L. (Graugrüner Gänsefuß)
Ho: Müllplatz Oberauerbach b. Mindelheim (17.8.74-Ha).-

107. Chenopodium strictum ROTH. (Gestreifter Gänsefuß)
Ho: Müllplatz Kaufering (28.9.74-!!, Glö, Regele).-
108. Chenopodium urbicum L. (Städte-Gänsefuß)
Ho: Müllplatz der Stadt Schongau (10.8.74-!!, Brettar).-
109. Arenaria ciliata L. (Bewimpertes Sandkraut)
Aa (Vorarlberg): Winterstaude-Hasenstrickweg (30.7.74-Su, !!),
Üntscheller (31.8.74-!!).-
110. Stellaria diffusa WILLD. (Rauhe Sternmiere)
Ho: Mehlblockmoos im Kemptener Wald b. Görisried (26.7.74-!!).-
Westlichstes Vorkommen dieses sehr seltenen Glazialreliktes!
111. Cerastium alpinum L. (Alpen-Hornkraut)
Aa (Vorarlberg): Winterstaude (30.7.74-!!).-
112. Vaccaria pyramidata MED. (Kuhkraut)
Hbo (Bayern): Adventiv auf Müll zwischen Oberstauen und Genhofen
(6.8.74-!!).-
113. Petroharga prolifera (L.) P.W.BALL (Sprossende Felsnelke)
Ho: Adventiv im Güterbahnhof Ottobeuren (Juli 74-Glö).-
114. Dianthus sylvestris WULF. in JAQU. (Stein-Nelke)
Aa (Vorarlberg): Winterstaude an mehreren Stellen (entdeckt von Su,
bestätigt: !!-30.7.74); Südwestgrat des Heiterberges am Widderstein
(5.9.74-!!); Westhang des Liechelkopfes im Kleinen Walsertal auf
Hornstein (2.8.74-!!). Zusammen mit dem Vorkommen an der Rothorn-
Spitze bei Holzgau sind uns nun aus den österr. Allgäuer Alpen vier
Vorkommen dieser Art bekannt. Mit Ausnahme des Vorkommens an der
Winterstaude handelt es sich jedesmal um sehr begrenzte Lokalitäten.
115. Silene rupestris L. (Felsen-Leimkraut)
Aa (Vorarlberg): Ochsenhofener Köpfe und Ochsenhofener Scharte im
Schwarzwassergebiet (22.9.74-!!).-
116. Pyrola chlorantha SW. (Grünblütiges Wintergrün)
Ho: Erpfting b. Landsberg (28.9.74) entdeckt von Regele, bestätigt:
!!, Glö); das zweite Vorkommen im Untersuchungsgebiet!
117. Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENG. (Echte Bärentraube)
Aa (Vorarlberg): Üntschensattel, Hintere Üntschenspitze und Grat
zwischen Hinterer Üntschenspitze und Wannenkopf bei Baad (29.8.74-
!!); Grünhorn, Grat zwischen Grünhorn und Steinmandl und Grat zw.
Grünhorn und dem Starzloch, auch Hochstarzel (15.9.74-!!). Nach
unseren heutigen Kenntnissen hat also die Echte Bärentraube ihren
eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt im Vorarlberger Allgäu!
118. Erica carnea L. (Schneeheide)
Hbo (Vorarlberg): Ruggburg bei Backenreutte am Pfändermassiv und
unterhalb der Kanzelfelsen b. Backenreutte (12.4.74-!!, Su);
Ho: Spärlich bei Kempten-Kottern (10.3.74-!!); es handelt sich hier
um die Neubestätigung eines lange verschollenen Wuchsortes.
119. Empetrum hermaphroditum (L.) HAG. (Zwittrige Krähenbeere)
Aa (Tirol): Gelbe Scharte an der Roten Flüh b. Tannheim (7.7.74-!!)
Schlicke (11.9.74-!!); Aa (Vorarlberg): Üntscheller (31.8.74-!!),
Ochsenhofener Scharte (22.9.74-!!), Grünhorn (22.9.74-!!).-

120. Androsace lactea L. (Milchweißer Mannsschild)
Aa (Tirol): Schlicke (11.9.74-!!).-
121. Centaureum pulchellum (SW.) DRUCE (Kleines Tausendgüldenkraut)
Ho: Pössinger Au b.Landsberg (28.9.74-Regele, bestätigt:!!,Glö).-
122. Gentiana purpurea L. (Purpurenzian)
Auf den Flyschbergen Vorarlbergs zwischen Widderstein und Hohem Ifen sehr verbreitet und geradezu häufig: Höferspitze und Seekopf am Widderstein (16.8.74-!!), Üntschenpass, Hintere Üntschen- spitze und Wannenkopf bei Baad (29.8.74-!!), Güntlesspitze und Üntscheller (31.8.74-!!), Walmendinger Horn, Ochsenhofener Köpfe, Grünhorn und Hochstarzel (15.9.74-!!) etc.-
123. Gentiana clusii PERR.& SONG. (Großblütiger Enzian)
Ho: In der Umgebung von Remnatsried am Weidensee (12.5.74-!!) und nw. des Weilers Mösten (12.5.74-!!), an den Seeger Seen (18.5.74- !!,Su), Freßlesreute (2.6.74-!!), Sameister (16.6.74-!!).-
124. Gentiana aspera HEG. (Rauher Enzian)
Aa (Tirol): Sulzspitze nahe der Landsberger Hütte (7.9.74-!!), Schlicke (11.9.74+Su,!!).-
125. Gentiana utriculosa L. (Schlauch-Enzian)
Ho: Spärlich am Rande des Hochmooses bei Buchach (Seeg)(2.6.74-!!)
Aa (Tirol): Sulzspitze (7.9.74-!!).-
126. Phacelia tanacetifolia BENTH. (Bienensaug)
Hbo (Württemberg): Straßenböschung bei Ratzenried in großer Zahl (10.7.74-!!), Ho: Müllplatz Friesenried (Juni 74-!!).-
127. Pulmonaria officinalis L. ssp. officinalis (Dunkles Lungenkraut)
Hbo (Württemberg): Bergatreute (6.4.74-!!), Laurental b. Weingarten (6.4.74-!!); Westrand von Ravensburg (4.5.74-!!; Bri). In der Ravensburger Gegend die eindeutig vorherrschende Unterart!
128. Ajuga pyramidalis L. ((Pyramiden-Günsel)
Aa: Gottesackerplateau (auf deutschem Boden) (27.7.74-!!).-
129. Galeopsis bifida BOENN. (Zweispaltiger Hohlzahn)
Ho: Auf Waldschlägen und an Ackerrändern im Hillenbachtal bei Mindelheim (31.8.74-Dr.Braun,Ha,Lübenau).-
130. Stachys annua L. (Einjähriger Ziest)
Ho: Auf Müll bei Kaufering-Ort (29.9.74-!!;Regele,Glö).-
131. Salvia retroflexa (Zurückgekrümmter Salbei)
Ho: Auf Müll nw.Landsberg (29.9.74-!!;Glö?Regele).-
132. Hyoscyamus niger L. (Bilsenkraut)
Ho: Auf dem früheren Exerzierplatz nw.Landsberg (29.9.74-Regele, bestätigt:!!,Glö).-
133. Datura stramonium L. (Stechapfel)
Ho: Auf Müll bei Kaufering-Ort (29.9.74-Regele,!!,Glö).-

134. Verbascum lychnites L. (Mehlige Königskerze)
Ho: Spärlich nahe dem Leutenhof bei Dirlewang (14.7.74-!!), Ha).-
135. Digitalis grandiflora MILL. Großblütiger Fingerhut)
Aa (Vorarlberg): Oberbezau (30.7.74-!!).-
136. Veronica longifolia L. (Langblättriger Ehrenpreis)
Ho: Auf Müll zwischen Hawangen und Benningen (6.9.74-!!), Glö); wohl nur verwildert.
137. Veronica polita FR. (Glänzender Ehrenpreis)
Hbo (Bayern): Taubenberg b.Lindau, Ackerrand (Nov.74-!!).-
138. Veronica montana JUSS. (Berg-Ehrenpreis)
Ho:"Leutental" bei Helchenried, Saulengrainer Wald b.Mindelheim (4.7.74-Ha,!!).-
139. Veronica latifolia L. (Breitblättriger Ehrenpreis)
Hbo (Bayern): Kesselbachschlucht b.Scheffau (25.5.74-!!);
Ho: Ehwiessmühle b.Ittelsburg (17.11.74-!!).-
140. Veronica scutellata L. (Schild-Ehrenpreis)
Ho: Im Kemptener Wald an der "Lenzfrieder Alpe" b.Görisried (30.8.74-!!).-
141. Veronica officinalis L. (Wald-Ehrenpreis)
Aa (Tirol): An der Schlicke noch bei 1880 m (11.9.74-!!).-
142. Pedicularis palustris L. (Sumpf-Läusekraut)
Aa (Vorarlberg): am Kalbelesee (Hochtannbergpaß) bei 1650 m (11.8.74-!!), Brettar).-
143. Pedicularis sylvatica L. (Wald-Läusekraut)
Hbo (Bayern): Litzis bei Ofenbach (21.4.74-!!), Lindenberger-Ratzenberger Moos (26.5.74-!!); Ho: Mehloblockmoos im Kemptener Wald (31.5.74-!!), Stellenmoos b.Sulzschneid und Kölblwald bei Sulzschneid (3.6.74-!!), Seeger Seen (18.5.74-!!), Freßlesreute bei Roßhaupten (2.6.74-!!).-
144. Bartsia alpina L. (Alpenhelm)
Ho: Weidensee b.Remmatsried (12.5.74-!!).-
145. Euphrasia drosocalyx FREYN. (Drüsiger Augentrost)
Aa (Tirol): Schlicke (11.9.74-!!); (Vorarlberg): Hintere Üntschenspitze (29.8.74-!!).-
146. Melampyrum arvense L. (Acker-Wachtelweizen)
Hbu (Württemberg): Argenauen östl.Langenargen (10.6.74-!!).-
147. Orobanche gracilis SM. (Blutrote Sommerwurz)
Aa (Tirol): Auf der Schlicke in Gipfelnähe noch bei 1900 m (11.9.74-!!).-
148. Orobanche vulgaris POIR. (Labkraut-Sommerwurz)
Hbu (Württemberg): Argenauen b.Langenargen (24.5.74-!!).-
149. Orobanche alba STEPH. (Weiße Sommerwurz)
Aa (Vorarlberg): nahe der Auenhütte im Kleinen Walsortal (27.7.74-!!).-

150. Orobanche teucrii HOL. (Gamander-Sommerwurz)
Aa (Vorarlberg): Zwischen Stongen- und Wildmoos-Alpe bei Oberbezaun (30.7.74-!!).-
151. Galium tricornutum DANDY (Dreihörniges Labkraut)
Hbo (Bayern): adventiv auf Müll zwischen Oberstaufen und Genhofen (10.8.74-!!, Brettar).-
152. Galium wirtgenii F.SCHULTZ. (Frühes Labkraut)
Ho: Im Lechgebiet am großen Sameister Weiher und nahe dem Nachsee b. Lechbruck (16.6.74-!!); im Mindelheimer Gebiet in Molinietenresten zwischen Amberg und dem Kreuzerhof gegen Lamerdingen (16.6.74-Ha).-
153. Lonicera coerulea L. (Blaue Heckenkirsche)
Aa (Vorarlberg): Ochsenhofener Köpfe bei ca 1750 m (15.9.74-!!) und Grünhorn bei ca 2000 m (15.9.74-!!); Ho: Wenglingen bei Kaufbeuren (19.4.74-!!!), Helchenried b. Dirlewang ("Leutental") (3.8.74-!!, Ha), Kapellenberg b. Rettenberg (12.6.74-!!), Weidensee bei Remnatsried (12.6.74-!!), Westermoos b. Sulzschneid (3.6.74-!!), Egelmoos bei Roßhaupten (16.6.74-!!), Nachsee bei Lechbruck (16.6.74-!!), Rossau bei Burggen/Lech (16.6.74-!!).-
154. Valeriana supina ARD. (Zwerg-Baldrian)
Aa (Tirol): Fuß der Noppenspitze und Noppenkar an der Hornbachkette (14.8.74-!!).-
155. Valeriana tripteris L. (Dreiteiliger Baldrian)
Hbo (Vorarlberg): Pfänder (Westhang) (20.4.74-!!);
Ho: Untermaiselstein am Fuße des Rottachberges (19.5.74-!!).-
156. Dipsacus sativus (L.) SCHOLL. (Weber-Karde)
Hbo (Bayern): Zwischen Oberstaufen und Genhofen auf Müll (10.8.74-!!, Brettar).-
157. Campanula persicifolia L. (Pfirsichblättrige Glockenblume)
Ho: Helchenried bei Dirlewang ("Leutental") (7.7.74-Ha, !!).-
158. Phyteuma nigrum F.W.SCHM. (Schwarze Teufelskralle)
Ho: westl. Mindelheim zwischen Unterkammlach und St. Johann und zwischen Wiederegg und Oberkammlach (1.6.74-!!); ferner im Pfaffenhausener Moor gegen Schöneberg (23.5.74-Ha, Rudi Rampp) und Helchenried bei Dirlewang ("Leutental") (7.7.74-Ha).-
159. Adenostyles alliariae (GOUAN) KERN. (Grauer Alpendost)
Ho: "Pfarrenwald" nordöstl. Echt bei Burk (Bertoldshofen) (12.5.74-!!).-
160. Erigeron atticus VILL. (Drüsiges Berufskraut)
Aa (Vorarlberg): Heiterberg b. Schröcken (5.9.74- entdeckt von Kriemhild Dörr, bestätigt:!!). Es handelt sich um das zweite nachweisbare Allgäuer Vorkommen dieser sehr seltenen Art!
161. Inula conyza DC. (Dürrwurz)
Ho: Ehwiesmühle bei Ittelsburg (3.12.74-!!), Helchenried bei Dirlewang ("Leutental") (7.7.74-Ha, !!), Roßkopf und Saulengrainer Wald b. Mindelheim (7.7.74-Ha).-

162. Ambrosia elatior L. (Beifußblättrige Ambrosie)
Ho: Adventiv im Oberauerbacher Moos (17.8.74-Ha), auf Müll bei Kaufering-Dorf (28.9.74-Regale, Glö, !!).-
163. Anthemis tinctoria L. (Färber-Kamille)
Hbo (Bayern): Auf Müll zwischen Oberstaufen und Genhofen (10.8.74-!!, Brettar).-
164. Matricaria inodora L. (Duftlose Kamille)
Aa (Vorarlberg): Am Südosthang des Walmendinger Horns bei 1650 m (22.9.74-!!).-
165. Matricaria matricaricoidis (LESS.) PORT. (Strahlenlose Kamille)
Aa (Vorarlberg): SO-Hang des Walmendinger Horns im Kleinen Walsertal bei ca 1650 m (22.9.74-!!).-
166. Artemisia verlotorum LAMOTTE (Kamtschatka-Beifuß)
Ho Auf Müll zwischen Benningen und Hawangen (5.9.74-!!, Glö).-
167. Homogyne alpina (L.) CASS. (Gemeiner Alpenlattich)
Hbo (Vorarlberg): am Pfändermassiv nahe dem Hof Stadlers oberhalb Backenreute (14.5.74 !!); Hbo (Bayern): nahe dem Waldsee bei Lindenberg (20.10.74-!!); Ho: im "Sulzschneider Forst" bei Roßhaupten (29.5.74-!!).-
168. Senecio helonitis (L.) SCH. et THELL. (Spätelblättriges Kreuzkraut)
Ho: "Schwarzer Graben" bei Kleinkemnat (Kaufbeuren) (19.4.74-!!), Weidensee bei Remstried (12.5.74-!!).-
169. Echinops sphaeroccephalus L. (K geldistel)
Ho: Bahndamm nahe dem Bahnhof Stetten b. Mindelheim (17.8.74-Ha).-
170. Carlina acaulis L. (Silberdistel)
Aa (Vorarlberg): Heisterberg bei Schröcken noch bei 2000 m (15.9.74-!!).-
171. Saussurea discolor (W. W. D.) DC. (Zweifarbige Alpenscharte)
Aa (Tirol): Schochenspitze nahe der Landsberger Hütte (13.7.74-!!) Grat von der Sulzmatze gegen das Vogelhorn an mehreren Stellen (13.7.74-!!). Mit diesen neuen Wuchsorten wird die Ostverbreitung dieser Art noch deutlicher gekennzeichnet. Sie reicht von der Linie Bschießer-Schrecksee bis zum Säuling. Interessant wäre eine Bestätigung der Fundmeldung "Glasfelder Kopf". Dieser ziemlich nach Westen vorgeschobene Fundort erscheint zunächst einmal wenig glaubwürdig.
172. Carlina stricta (ROUY) FRITSCH (Langblättrige Eberwurz)
Aa (Tirol): Lechtal bei Haselgehr (14.8.74-!!).
173. Cirsium eriophorum (L.) SCOP. (Wollige Kratzdistel)
Aa (Tirol): Im Lechtal bei und oberhalb Häselgehr (14.8.74-!!). Nach unserer bisherigen Kenntnis ist die Wolldistel zwischen Häselgehr und Steeg mehrfach anzutreffen. Weiter lechabwärts haben wir sie noch nicht gefunden, schon gar nicht im Bereich Füssen oder am Lech zwischen Füssen und Kaufering.

174. Cirsium acaule SCOP. (Stengellose Kratzdistel)
Aa (Tirol): Nahe der Hagler-Tal-Alphütte unweit Häselgehr bei 1350 m (14.8.74-!!).-
175. Silibium marianum (L.) GABRTN. (Mariendistel)
Ho mehrfach adventiv: Kempten, Immenstädter Straße (6.7.74-!!), Su), Bahnhof Ottobeuren (6.7.74-Glö,!!), Hausen b. Mindelheim (13.7.74-Ha).-
176. Onopordum acanthium L. (Eseldistel)
Ho: adventiv auf Müll nordwestl. Landsberg (28.9.74-!!), Regele, Glö).
177. Centaurea montana L. (Berg-Flockenblume)
Hbo (Bayern): Litzis bei Opfenbach (21.5.74-!!), Kesselbachtobel bei Scheffau (25.5.74-!!); Ho: Hermannsberg b. Durach (Kempten) (15.11.74-!!), Langenegg b. Martinszell (26.3.74-!!).-
178. Centaurea diluta AIT. (kein deutscher Name!)
Hbo (Bayern): Auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.8.74-!!), Drettar).-
179. Carthamus tinctorius L. (Safler)
Hbo (Bayern): Auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.8.74-!!), Brettar).-
180. Scorzonera humilis L. (Niedrige Schwarzwurzel)
Ho: Auf Streuwiesenresten südöstl. Amberg b. Buchloe (16.6.74-Ha).-
181. Cicerbita alpina (L.) WALLR. (Alpen-Milchlattich)
Ho: am Stoffelsberg b. Niedersonthofen (2.4.74-!!).-
182. Hieracium humile JAQU. (Niedriges Habichtskraut)
Aa (Bayern): Fuß des Tatsenrieder Köpfles b. Pfronten (13.6.74-!!); Aa (Tirol): Hagler Tal bei Häselgehr (Lech), ca 1500 m (14.8.74-!!).
183. Potamogeton densus L. (Dichtes Laichkraut)
Ho: Ehwiesmühle bei Ittelsburg (3.12.74-!!).-
184. Potamogeton filiformis PERS. (Faden-Laichkraut)
Ho: Weissensee b. Füssen (17.9.74-!!).-
185. Potamogeton natans L. (Gemeines Laichkraut)
Aa (Vorarlberg): im Körbersee bei Schröcken, höchster uns bekannter Wuchsort im Allgäu (11.8.74-!!).-
186. Potamogeton alpinus BALB. (Alpen-Laichkraut)
Ho: Im Wasachmoos am Südrand des "Sulzschneider Forstes" bei Roßhaupten (29.5.74-!!).-
187. Potamogeton perfoliatus L. (Durchwachsenes Laichkraut)
Ho: Weissensee b. Füssen (17.9.74-!!).-
188. Potamogeton gramineus L. (Grasartiges Laichkraut)
Hbo (Württemberg): "Holzweiher" bei Neukirch (6.8.74-!!);
Ho: Kleiner Weiher nahe dem ehemaligen Eisenbahn-Hp. Freßlesreute bei Roßhaupten (2.6.74-!!).-

189. Potamogeton acutifolius LK. (Spitzblättriges Laichkraut)
Hbo (Württemberg): "Holzmühlweiher" bei Neukirch (6.8.74-entdeckt von Dr.E.Seitz, bestätigt:!!).-
190. Potamogeton obtusifolius MERT.& KOCH (Stumpfblättriges Laichkraut)
Ho: Notzenweiher bei Hochgreut (Kempten) (5.8.74-!!);
Hbo (Württemberg): Neuravensburger Weiher (13.8.74- entdeckt von Dr.E.Seitz, bestätigt:!!), Metzisweiler Weiher bei Eintürnen (14.9.74-!!).-
191. Potamogeton trichoides CHAM.& SCHLDL. (Haarförmiges Laichkraut)
Hbo (Württemberg): Neuravensburger Weiher (13.8.74-!!, "Holzweiher" bei Neukirch (6.8.74-!!); Ho: Weiher bei Stich (Oy) (14.8.74-!!, Neubestätigung!).-
192. Triglochin palustris L. (Sumpf-Dreizack)
Aa (Vorarlberg): am Kalbelese (Hochtannbergpaß) bei ca 1650 m (11.8.74-!!; Brettar).-
193. Tofieldia calyculata (L.)WAHL. (Kelch-Simsenlilie)
Ho: in einem Quellaustritt im Ostteil des Salger Moores bei Mindelheim (13.7.74-Ha, Rudi Rampp).-
194. Allium vineale L. (Weinberg-Lauch)
Ho: Bahnhof Kaufbeuren (18.6.74-!!).-
195. Lilium martagon L. (Türkenbund)
Aa (Vorarlberg): Am Gipfel der Höferspitze bei Schröcken bei 2130 m (16.8.74-!!). Höchstes uns bekanntes Vorkommen im Allgäu!
196. Convallaria majalis L. (Maiglöckchen)
Ho: Stephanried bei Hawangen (1.6.74-Karl Dörr,!!).-
197. Leucojum vernalis L. (Frühlings-Knotenblume)
Hbo (Bayern): Schirpfentobel bei Scheffau (25.5.74-!!), Oberreitnau massenhaft (17.3.74-entdeckt von Bri, bestätigt:!!);
Hbo (Württemberg): Rohrdorfer Tobel an der Adelegg (7.5.74-!!);
Ho: Oberkürnach bei Kempten (23.3.74-!!), Kuhsteig bei Wiggensbach (22.3.74-!!), Wasachmoos am Südrand des Sulzschneider Forstes bei Roßhaupten (18.5.74-!!).-
198. Crocus albiflorus KIT. (Weißer Krokus)
Ho (Westteil): Zwischen Eschach und der Schwedenschanze (5.4.74-!!), nw. und nordöstl. des Weilers Hochberg südl. des Eschacher Waldes (10.4.74-!!), Stoffelberg und zwischen Stoffel- und Hauschenberg (2.4.74-!!); zwischen Missen und Börlas, nw. Berg b. Missen und zw. Sibratshofen und Wilhams (29.3.74-!!).-
199. Juncus trifidus L. ssp. monanthos (JAQU.) ASCH. & GR. (Dreispartige Binse)
Aa (Bayern): Gottesackerplateau (27.7.74-!!);
Neubestätigung!
Aa (Vorarlberg): Westhang des Liechelkopfes (2.8.74-!!).-
200. Juncus triglumis L. (Dreiblütige Binse)
Aa (Vorarlberg): Hochtannbergpaß (16.8.74-!!), Stierlochhalpe b. Baad (29.8.74-!!), Stieralpe an den Ochsenhofener Köpfen (22.9.74-!!); Aa (Bayern): Bolgen (Südhang) (21.9.74-!!).-

201. Luzula luzulina (VILL.)D.T. (Gelbliche Hain-Simse)
 Aa (Bayern): Toniskopf bei Oberstdorf-Rohrmoos (14.6.74-!!),
 Großer Wald "Untere Metzg" am Wertacher Horn (7.6.74-!!).-
 HbO: Ratzenberger Moos b.Lindenberg (26.5.74-!!);
 Ho: Liebenthanner Wald b.Ronsberg (14.5.74-!!).-
202. Luzula spicata (L.)LAM & DC. (Ähren-Hainsimse)
 Aa (Tirol): Vogelhorn und Blässe bei Tannheim (13.7.74-!!).-
203. Eriophorum angustifolium HONCK. (Schmalblättriges Wollgras)
 Aa (Vorarlberg): Hochalpine am Widderstein, ca 2000 m (16.8.74-!!)
204. Eriophorum gracile KOCH (Schlankes Wollgras)
 Ho: Nachsee bei Lechbruck (16.6.74-Kriemhild Dörr, !!).-
205. Scirpus maritimus L. (Meer-Binse)
 Hbo (Württemberg): Jägerweiher bei Neukirch (6.9.74-!!) Neube-
 stätigung! Schloßweiher bei Ratzenried (6.9.74-!!). Neubestäti-
 gung!
206. Scirpus caespitosus L. (Rasen-Binse)
 Ho: Im Kemptener Wald nahe dem "Dengelstein" (27.9.74-!!).-
207. Eleocharis quinquefolia (F.K.HARTMANN)O.SCHWARZ (Armblüt.Sumpfried)
 Aa (Vorarlberg): Am Kalbelesee nächst dem Hochtannbergpaß, ried)
 ca 1650 m (11.8.74-!!; Brettar).-
208. Eleocharis austriaca HAY (Österreichisches Sumpfried)
 Ho: Im "Leutental" bei Helchenried (b.Dirlewang)(14.7.74-Ha,!!).-
209. Schoenus ferrugineus L. (Rostrotes Kopfried)
 Hbo (Bayern): Moor bei Oberstaufer-Genhofen (3.6.74-!!);
 Ho: Pfaffenhausener Moos gegen Schöneberg(Mindelheim)(Mai,74-Ha).-
210. Cladium mariscus (L.)PCHL (Schneide)
 Ho: Südlicher Seeger See (18.5.74-!!).-
211. Blysmus compressus (L.)PANZ (Quellried)
 Aa (Bayern): Vilstal bei Pfronten (13.6.74-!!);
 Aa (Tirol): Hahnenkamm bei Reutte, ca 1900m (17.9.74-!!);
 Aa (Vorarlberg): Burgl-Alpe am Feuerstätter Kopf (10.9.74-!!),
 Stierlochhalpe bei Baad (29.8.74-!!), Stieralpen an den Ochsen-
 hofener Köpfen (15.9.74-!!), Kalbelesee am Hochtannberg-Faß,
 ca 1650 m (11.8.74-!!), Wildmoosalpe bei Oberbezau (30.7.74-!!);
 Ho: mehrfach im Kemptener Wald (z.B.Dürrenbühl)(25.9.74-!!),
 Weidensee bei Remnatsried (2.6.74-!!), Sulzschneider Forst und
 Egelmoos b.Roßhaupten (16.6.74-!!).-
212. Carex chordorrhiza EHRH. (Strickwürzel-Segge)
 Hbo (Bayern): Moor bei Oberstaufer-Genhofen (6.6.74-!!)Neubestäti-
 gung!-
213. Carex elongata L. (Verlängerte Segge)
 Ho:Weidensee bei Remnatsried (2.6.74-!!), Hochmoos b.Buchach
 nächst Seeg (2.6.74-!!), Wasachmoos b.Roßhaupten (31.5.74-!!),
 Erpfting bei Landsberg (3.6.74-!!;Regele).-
214. Carex heleonastes EHRH. (Torf-Segge)
 Ho:Blauensee-Moos nahe Oy (9.6.74-!!).-

215. Carex pilosa SCOP. (Wimper-Segge)
Hbu (Württemberg): Im Eichertwald bei Tunau (Kreßbronn) (3.11.74-!!); Hbo (Bayern): Ober-Rengernweiler b. Oberreitnau (23.12.74-!!), Dattnau b. Wasserburg (31.12.74-!!).-
216. Carex tomentosa L. (Filzige Segge)
Hbu (Württemberg): Argenauen zwischen Langenargen und Kreßbronn (24.5.74-!!).-
217. Carex ericetorum PILL. (Heide-Segge)
Ho: Friesenried b. Kaufbeuren (19.4.74-!!).-
218. Carex ornithopoda WILLD. (Vogelfuß-Segge)
Ho: An einem Hochterrassenschotterhang östl. Kettenschwang und im "Leutental" bei Helchenried (Dirlewang) (12.5.74-Ha).-
219. Carex ornithopodioides HAUSM. (Vogelfußähnliche Segge)
Aa (Bayern): Nordfuß des Diberkopfes (13.9.74-!!; Glö).-
220. Carex frigida ALL. (Kälteliebende Segge)
Aa (Vorarlberg): Höferspitze am Widderstein (16.8.74-!!), Stierlochhalpe bei Daad (29.8.74-!!), Starzlachalpe nahe dem Starzeljoch (15.9.74-!!), Stieralpen an den Ochsenhofener Köpfen (15.9.74-!!).-
221. Carex brachystachis SCHR. & MOLL. (Kurzährige Segge)
Aa (Vorarlberg): Schneider-Küren-Alpe am Gottesacker (27.7.74-!!).
222. Carex vesicaria L. (Blasen-Segge)
Ho: Am Eyweiher nächst der Eymühle zwischen Hawangen und Ottobeuren (30.6.74-Ha).-
223. Carex buxbaumii WAHLENB. (Duxbaums Segge)
Ho: Bannwaldsee b. Füssen (Sommer 74-Dr. K. Englert).-
224. Poa remota FORS. (Lockerblütiges Rispengras)
Ho: Im Tiergarten-Forst b. Mindelheim (11.5.74-Ha), Eldern bei Ottobeuren (1.6.74-Glö, !!), Erpfting b. Landsberg (7.6.74-!!; Regele).-
225. Sesleria varia (JAQU.) WETTST. (Kalk-Blaugras)
Hbo (Vorarlberg): Westhänge des Pfänder (20.4.74-!!).-
226. Lolium temulentum L. (Taumel-Lolch)
Hbo (Bayern): Auf Müll zwischen Oberstaufer und Genhofen (10.3.74-!!; Brettar).-
227. Agropyron intermedium (HOST.) P. B. (Graugrüne Quecke)
Hbu (Württemberg): Argenauen östl. Langenargen (10.6.74-!!).-
228. Hordeum murinum L. (Mäuse-Gerste)
Ho: Bahnhof Ottobeuren (12.6.74-!!; Glö).-
229. Glyceria plicata FR. (Falten-Schwaden)
Aa (Tirol): Hahnenkamm b. Reutte, 1800 m, das höchste uns bekannte Allgäuer Vorkommen (17.9.74-!!).-
230. Eragrostis poaeoides P. B. (Kleines Liebsgras)
Ho: Bahngelände Mindelheim (14.7.74-!!; Ha).-

231. Trisetum distichophyllum (WILL.)P.D. (Zweizeiliger Grannenhafer)
 Aa (Tirol): Balschresattel an der Hornbachkette (14.8.74-!!);
 Aa (Vorarlberg): Hintere Üntschenspitze (29.8.74-!!), Grünhorn
 (15.9.74-!!).-
232. Avena parlatoresii WOODS. (Parlatores Hafer)
 Aa (Tirol): Schlicke, ca 1900 M (11.9.74-Kriemhild Dörr,!!),
 Neubestätigung!
233. Koeleria pyramidata (LAM.)P.D. (Pyramiden-Schillergras)
 Hbu (Württemberg): Argenauen b.Langnargen (östl.) (24.5.74-!!);
 Neu für unser Hb-Gebiet!
234. Agrostis alpina SCOP. (Alpen-Straußgras)
 Aa (Vorarlberg): Westhang des Liechelkopfes, ca 1850 m (2.8.74-!!)
235. Calamagrostis villosa (CHAIX.)GMEL. (Wolliges Reitgras)
 Aa (Vorarlberg): Wannenberg bei Baad (29.8.74-!!), Feuerstätten=
 kopf bei Balderschwang (10.9.74-!!).-
236. Calamagrostis arundinacea (L.)ROTH. (Rohr-Reitgras)
 Ho: an einem Steilhang im sog."Leutental" b.Helchenried (Dirle=
 wang) (4.8.74-!!),Ha); zweites uns bekanntes Allgäuer Vorkommen!
237. Alopecurus geniculatus L. (Geknieter Fuchsschwanz)
 Ho: Güterbahnhof Ottobeuren (12.6.74-!!),Glö).-
238. Cypripedium calceolus L. (Frauenschuhe)
 Hbo (Bayern): Kesselbachtobel bei Scheffau (25.5.74-!!).-
239. Cephalanthera rubra (L.)RICH. (Rotes Waldvögelein)
 Ho: "Leutental" b.Helchenried (Dirlewang) (14.7.74-Ha,bestät.:!!).
240. Cephalanthera damasonium (MILL.)DRUCE (Weißes Waldvögelein)
 Ho: "Leutental" b.Helchenried b.Dirlewang (14.7.74-Ha).-
241. Epipactis atrorubens (HOFFM.)SCHULT. (Braune Sumpfwurze)
 Ho: Mehrfach im südlichen Mindelheimer Raum. "Leutental" b.Helchen=
 ried, Roßkopf b.Dirlewang, Nachtweide im Saulengrainer Wald bei
 Stetten, zwischen Stetten und Oberauerbach (Juli 74- alle Ha).-
242. Listera cordata (L.)R.BR. (Kleines Zweiblatt)
 Aa (Bayern): Gottesackerplateau, ca 2000 m (27.7.74-!!), höchstes
 uns bekanntes Allgäuer Vorkommen!
 Aa (Vorarlberg): Wannenberg bei Baad, ca 1500 m (29.8.74-!!);
 Hbo (Bayern): Scheffau (25.5.74-!!), bestätigt: Bri/W.Enderle);
 Ho :Mehlbloßmoos im Kemptener Wald (31.5.74-!!), Hochmoos bei
 Buchach unweit Seeg (2.6.74-!!), Sulzschneider Forst bei Roß=
 haupten (29.5.74-!!).-
243. Herminium monorchis (L.)R.BR. (Einknolle)
 Ho: am großen Sameister Weiher b.Roßhaupten (16.6.74-!!).-
244. Ophrys insectifera L. (Fliegen-Ragwurze)
 Aa (Bayern): Bärenweg bei Hinterstein (15.6.74-!!).-
245. Orchis pallens L. (Bleiches Knabenkraut)
 Hbo (Württemberg):im Argental b.Wangen (7.5.74-Bri, bestätigt:!!).

246. Hammarbya paludosa (L.) O. KUNTZE (Weichwurz)
Ho: Bannwaldsee b. Füssen (Sommer 74- Dr. K. Englert).-
247. Liparis loeselii (L.) RICH. (Glanzkraut)
Hbo (Württemberg): Wuhrmühlweiher (12.6.74-Glö,!!).-
248. Spirodela polyrhiza (L.) SCHLEID. (Teichlinse)
Hbo (Württemberg): Neuravensburger Weiher (13.8.74-!!).-
249. Calla palustris L. (Drachenzwurz)
Ho: Im Kemptener Wald nahe dem Mehlblockmoos b. Görisried, zahlreich, aber ohne Blüten (26.7.74-!!).
Es handelt sich um das westlichste Vorkommen der Art im Allgäu!
Ein weiteres neu entdecktes Vorkommen findet sich bei Buchach im Hochmoos (Seeg) (2.6.74-!!).-
250. Sparganium minimum WALLR. (Zwerg-Igelkolben)
Ho: Wasachmoos b. Roßhaupten (18.6.74-!!).-
251. Sparganium angustifolium MICHX. (Schmalblättriger Igelkolben)
Aa (Vorarlberg): Ostgrat der Höferspitze am Widderstein (16.8.74-!!); Aa (Tirol): Hintere Leihleiter-Alpe bei Lechleiten (13.9.74-!!; Glö).-

=====

Anschrift des Verfassers:

Dr. Erhard Dörr

Oberstudiendirektor

D-896 Kempten/Allgäu

Bodmanstr. 30

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [19_1](#)

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: [Floristische Notizen aus dem Jahre 1974. 37-56](#)