

Mitteil.Naturw.Arb.Kr.Kempton
Jahrg. 20/2 :21-45 (Dez.1976)

Allgäu-Floristik 1975/76
=====

von Erhard DÖRR

Die folgende Zusammenstellung von neuen und Neubestätigten Wuchsorten von Phanerogamen und Gefäßkryptogamen im Allgäu und seinem Vorland ist nur ein sehr knapper Auszug aus den tatsächlich vorliegenden Aufzeichnungen zweier Jahre. Die Auswahl mußte mit einer gewissen Willkür getroffen werden, da es keinen zuverlässigen Maßstab dafür gibt, welche Art bzw. welcher Wuchsort besonders erwähnenswert erscheint. In Abweichung vom früheren Gebrauch führen wir diesmal grundsätzlich neben dem Funddatum und dem Finder (meist in Abkürzung) auch das jeweilige Quadrantenviertel an, in dem der Fund registriert wurde. Die Allgäuer Alpen (= Aa) werden in einen bayerischen (Aa-Bayern), in einen Vorarlberger (= Aa-Vorarlberg) und in einen Tiroler Teil (= Aa-Tirol) untergliedert. Die Untersuchungsgebiete Hbu und Hbo teilen sich in einen württembergischen (= Hbo bzw. Hbu-Württemberg), in einen bayerischen (= Hbo bzw. Hbu-Bayern) und in einen Vorarlberger Teil (= Hbo bzw. Hbu-Vorarlberg). Dieses System deckt sich mit der Einteilung, die für die "Allgäu-Flora" (vgl. BERICHTE DER BAYERISCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT) bereits angewendet wird.

Für entscheidende Mitwirkung am Zustandekommen dieses Berichtes habe ich zu danken: Herrn Universitätsprofessor Dr. H.MERX-MÜLLER (München), dem Direktor der Bayerischen Botanischen Staatssammlungen, und seinen Mitarbeitern, Herrn Dr. W.LIPPERT, Dr. K.P.BUTTLER und Dr.GRAU.

Wertvolle Beiträge aus dem Allgäuer Raum lieferten: Herr A.ESCHELMÜLLER (Sulzberg), Herr Studiendirektor Dr. W.ENDERLE (Wangen), Herr E.GLÖGGLER (Ottobeuren), Herr H.HACKEL (Mindelheim), Herr R.REGELE (Landsberg), Frau E.SUTTER (Kempten) und Herr Studienrat J.BAUER (Hörmannshofen), den wir erfreulicherweise als neuen Mitarbeiter gewinnen konnten. Nur ein kleiner Teil seiner Kartierungsnotizen wurden in diese Folge eingearbeitet. Selbstverständlich haben wir auch die letzten Funde des verstorbenen Herrn Rektors G.W.BRIELMAIER (Wangen) in den Bericht einbezogen.

Darüberhinaus danke ich für verschiedenartige Hilfe: Herrn O.BRETTAR (Kaiserslautern), Herrn Dr. O.KLEMENT (Lindenberg), dem verstorbenen Herrn K.LÜBENAU und seiner Gattin, Frau Dr. R.LÜBENAU-NESTLE (Kempten), Herrn Studiendirektor L.MÜLLER (Kempten), Herrn W.PÖTZL (Kempten, Bergwacht) und den Herren Apothekern sen. und jun. SCHRÖPPEL (Pfronten). Sonstige Finder sind im Text erwähnt.

Gebrauchte Abkürzungen:

Bau = J.BAUER	Glö = E.GLÖGGLER.
Bri = G.W.BRIELMAIER	Ha = H.HACKEL
!! = E.DÖRR	R = R.REGELE
KD = Kriemhild DÖRR	Su = E.SUTTER
E = A.ESCHELMÜLLER	WE = W.ENDERLE

!? = die Art sollte noch gründlicher erforscht werden.

1. Diphasium complanatum (L.) Rothm. (Zusammengedrückter Bärlapp)
Ho: an der Wertach nahe Schwenden bei Wald (8229/3) (9.9.1976);
entdeckt von Bau, bestätigt !!/WE. Damit ist uns erstmals seit
Jahren wieder ein gesicherter Wuchsort im Allgäuer Alpenvorland
bekannt.
2. Selaginella helvetica (L.) Spring (Schweizer Moosfarn)
Ho: Schwarzenbach bei Enzenstetten (8329/4) (Bau, bestätigt
von !! am 3.10.1976); westlich Hochstraß bei Lengenwang (8329/2)
(entdeckt von Bau, bestätigt von !! am 3.10.1976); diese beiden
Wuchsorte liegen außerhalb der Flußtäler und ergänzen damit
entscheidend unsere bisherige Verbreitungskennntnis. Am Lech
konnten wir 1976 noch folgende Fundpunkte registrieren: links
des Lechs, Staustufe gegenüber Prem (8330/2) (!!), links des
Lechs, Staustufe gegenüber Urspring (8230/4) (!!), linksseitige
Lechauen bei Gut Dessau (8230/4) (!!).
3. Ophioglossum vulgatum L. (Natternzunge)
Württemb. Hbu: Massenbestände im Eriskircher Ried (8323/3)
(24.5.1975) (!!/Su).
4. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Nordischer Streifenfarn)
Aa-Bayern: zwischen Reichenbach und dem Zimmerberg (8527/4)
(entdeckt von E, bestätigt !! am 9.7.1976).
5. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (Hirschzunge)
Aa-Bayern: "Unter den Wänden" nahe der Wasserscheide bei Hirsch-
gund und an den Wänden südlich der Schrine (8626/2) (4.10.1976)
(!!/Glö); Aa-Vorarlberg: Sevischrofen (8626/1) (29.5.1975) (!!),
Schneckenlochwald am Hohen Ifen (8626/1) (7.9.1975) (!!);
österr.Hbo: zwischen Bromatsreute bei Scheidegg und Lippenghau
(8424/4) (!!); Ho: in einer Schlucht nahe der Kreuzleshöhe bei
Kreuzthal (8226/4) (11.5.1975) (entdeckt von KD, bestätigt !!);
dieser Wuchsort ist der erste uns bekannte im gesamten Bereich
des umfangreichen Kürnacher und Kreuzthaler Waldgebietes.
6. Polystichum lonchitis (L.) Roth (Lanzen-Schildfarn)
Hbo-Bayern: Maisachschlucht bei Buchenbühl, 1 Stock (8425/1)
(4.4.1976) (!!); Entschenstein bei Weiler, 1 Stock (8425/1)
(21.1.1975) (!!); nahe der Ruine Ellhofen, 1 Stock (8425/2)
(15.5.1976) (!!); Eistobel (8326/3) (26.1.1975) (!!);
Hbo-Württemberg: nahe der Ruine Neu-Summerau im Argental, 1 Stock
(8324/3) (WE, bestätigt !! am 11.4.1976); am Rande der Adelegg
bei Wehrlang, 1 Stock (8326/2) (18.4.1976) (von Bri auf unserer
letzten gemeinsamen Exkursion entdeckt); Hbo-Vorarlberg: Gebhards-
berg, 1 Stock (8524/2) (1.6.1976) (!!), Weißachabhang nahe der
Antonius-Kapelle bei Krumbach, 1 Stock (8525/1) (15.4.1976) (!!);
Bromatsreute (8424/4) (18.1.1975) (!!).
7. Polystichum aculeatum (L.) Roth (Gelappter Schildfarn)
Ho: im Rößgraben bei Landsberg (knapp rechts des Lechs) (8031/1)
(26.5.1975) (R, bestätigt !!); in der Landsberger Gegend sehr
selten!
8. Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar (Steifer Wurmfarne)
Aa-Bayern: nahe der Wank-Hütte im Retterschwanger Tal (8528/3)
(E, bestätigt !! am 7.9.1976); Aa-Vorarlberg: Auenmulde am
Hohen Ifen (8626/2) (29.8.1976) (!!).

9. Dryopteris cristata (L.) A.Gray (Kammfarn)
 Hbo-Württemberg: in alten Torfstichen nahe Matzenweiler (ob identisch mit der früheren Angabe "Wolfegg"?) (8125/3) (30.10.1976) (!!); Rötsee-Moos bei Kißlegg (8125/4) (2.11.1976) (!!); Neubestätigung im sog. "Pfeifenhart" bei Malmishaus (8023/3) (28.9.1976) (!!/WE/HÄNLE); Neubestätigung am Ebenweiler See (8023/3) (31.8.1976) (!!); im Wurzacher Ried nahe dem sog. Ziegelbacher Ried (8025/3) (21.10.1975); Neubestätigung im Wurzacher Ried bei Albers (8025/4) (9.10.1976) (!!); Ob. Moos bei Waldsee (8024/3) (9.11.1976) (!!); spärlich; Neubestätigung im Hbo-Grenzgebiet am Lindenweiher bei Unter-Essendorf (7924/4) (1.11.1975) (!!); Ummendorf (7924/2) (1.11.1975) (!!); Ho: Neubestätigung im Benninger Ried (8027/1) (1975) (!!).
10. Blechnum spicant (L.) Roth (Rippenfarn)
 Ho: vereinzelt bei Erpfting nahe Landsberg (7930/4) (R, bestätigt !! am 4.8.1976); in der Landsberger Gegend sehr selten!
11. Pinus cembra L. (Zirbelkiefer)
 Aa-Tirol: nahe der bayerischen Grenze zwischen Lechleiten und der Lechleiten-Alpe (8727/1) (27.6.1976) (!!).
12. Potamogetum nodosus Poir. (Flutendes Laichkraut)
 Württemb.Hbo: Kreuzweiher bei Neukirch, Neubestätigung (8324/3) (30.9.1976) (!!); (auch von WE bestätigt!).
13. Potamogetum alpinus Balb. (Alpen-Laichkraut) (1976)
 Württemb.Hbo: Weiher beim Weiler Kraumbach nächst Kißlegg (8225/1) (!!); Ho: Gräben im Schorenmoos bei Reicholzried (8127/4) (28.10.1975) (!!); nördlich des Korbsees in Gräben (8130/3) (!!).
14. Potamogetum gramineus L. (Grasartiges Laichkraut)
 Württemb.Hbo: Weiher beim Weiler Krumbach nahe Kißlegg (8225/1) (16.10.1976) (!!); Argensee (8225/2) (14.8.1976) (!!); Ho: Tümpel im Hofamhdgraben bei Erbenschwang (8130/4) (1976) (!!).
15. Potamogetum obtusifolius Mert. & Koch (Stumpfblättriges Laichkraut)
 Bayer.Hbo: Stockenweiler Weiher (8324/4) (23.7.1976) (!!); Württemb.Hbo: Roter Weiher bei Kißlegg (8225/2) (11.11.1976) (!!); Ebenweiler See (8023/3) (30.9.1976) (!!).
16. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (Großer Schwaden)
 Württemb.Hbo: Dornwaidmoos westl. Isny (8326/1) (23.3.1976) (!!); Ho: am südlichsten Fischteich bei Wald (8229/3) (entdeckt von Bau, bestätigt von !! am 3.10.1976); mehrfach am Hühnerbach bei Bidingen (8130/3) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 11.9.1976); am Hühnerbach bei Tremmelschwang (8130/2) (19.9.1976) (!!); am Hühnerbach in Ödwang (8130/2) (19.9.1976) (!!). Die auffallende Art ist anscheinend doch weiter verbreitet, als wir ursprünglich annahmen.
17. Poa chaixii Vill. (Wald-Rispengras)
 Württemb.Hbo-Grenzgebiet: im Fürstenwald bei Ochsenhausen, Neubestätigung (7925/2) (4.7.1975) (!!).
18. Poa remota Fors. (Lockerblütiges Rispengras)
 Neu für das Bayer.Hbo: im untersten Rothenbachtobel bei Weiler (8425/3) (23.5.1976) (!!); im Hausbachtobel bei Weiler (8425/2)

(2.5.1976) (!!); württomb. Hbo: nahe dem Waldweiher bei Wurzach (8025/4) (12.7.1975) (!!); Ho: Ehwismühle bei Ittelsburg (25.6.1975) (Glö;!!).

19. Avena parlatorei Woods (Parlatores Hafer)

Aa-Bayern: Südhang des Gernkopfes nahe der Willersalp (8528/2) (9.9.1976) (!!); Aa-Tirol: Häselgehrberg (8628/4) (8.6.1975) (!!); Rotwand bei Elbigenalp (8628/4) (15.6.1975) (!!).

20. Agrostis schleicheri Jord.& Verl. (Pyrenäen-Straußgras)

Neu für Aa-Bayern: Käseralpe im obersten Oytal (8628/1)(13.8.1976) (!!); Neben dem Vorkommen im Höhenbachtal bei Holzgau (POLATSCHKE!) zweites bekanntes Vorkommen in den Allgäuer Alpen.

21. Calamagrostis canescens (Web.) Roth (Lanzettliches Reitgras)

Hbo-Bayern: im Lindenberger Moos; (vielleicht identisch mit der alten Angabe "Ratzenberger Moos") (8325/3) (23.10.1976) (!!); württomb.Hbo: am Karsee, Neubestätigung (8224/4) (16.10.1976) (!!); am "Gerstenberg" im Gründlenried bei Kißlegg (8125/3) (12.10.1976) (!!); massenhaft am Süd- und Südwestufer des Holzweiher bei Immenried (8125/3) (24.10.1976) (!!); Neubestätigt am Rande des Bremberger Holzes bei Oberrot (8225/2) (16.10.1976) (!!); Ho: in den Moorresten südwestl. Winterrieden (7827/3) (3.11.1976) (!!); - Anscheinend ist die Art, auch in Hbo, nicht so selten, wie wir es ursprünglich annahmen. Sie bleibt allerdings (so 1976 z.B. am Holzweiher) zwischen Schilf in großen Flächen steril und wird in diesem Zustand leicht übersehen.

22. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G.,M.&Sch. (Moor-Reitgras)

Im Grenzgebiet des württomb. Hbo bestätigt für den Federsee (26.6.1976) (!!/WE).

23. Achnatherum calamagrostis (L.) P.B. (Rauhgras)

Aa-Vorarlberg: Hirschberg bei Bizau (8625/4) (6.9.1976) (!!).

24. Alopecurus geniculatus L. (Geknieter Fuchsschwanz)

Ho: Riedleemoos und südlich des Elbsees bei Aitrang (8229/1) (30.5.1976) (!!/Su).

25. Alopecurus aequalis Sobol. (Gelbroter Fuchsschwanz)

Ho: Lehmgrube bei Kronburg (8127/1) (9.10.1976) (!!).

26. Eragrostis tef (Zucc.) Tratt. (deutscher Name unbekannt)

Neu für das Allgäuer Gebiet! Aa-Bayern: Hinang bei Altstädten (8527/2) (6.10.1975) (E); Hbo-Bayern: Straßenrand bei Opfenbach (gegen Niederstaufer) (8325/3) (29.10.1976) (E/!!). Die Art ist Begleiterin des Straßenneubaus. Ob sie sich hält, bleibt abzuwarten. O.BRETTAR und K.LADEWIG haben sie 1975 auch im Rheingebiet festgestellt.

27. Sorghum halepense (L.) Pers. (Wilde Mohrenhirse)

Ho: auf dem Müllplatz nordwestl. Buxheim (7926/4) (10.10.1975) (!!).

28. Cyperus fuscus L. (Braunes Zypergras)

Ho: südlich Emmenhausen bei Waal (8030/2) (entdeckt von Bau, bestätigt von !! am 25.9.1976).

29. Eriophorum gracile Koch (Schlankes Wollgras)
Bayer.Hbo: Zaumberg bei Missen (8426/2) (1976) (Su).
30. Scirpus maritimus L. (Strand-Simse)
In großen Mengen im Bahngelände Buchloe (7930/3) (entdeckt von Glö, bestätigt !! am 16.8.1975).
31. Scirpus setaceus L. (Borstige Binse)
Hbo-Bayern: am sog. "Neuweier" bei Metzlers unweit Lindau (8424/1) (19.7.1975) (!!). In der Nähe des Bodensees selten!
32. Eleocharis austriaca Hay. (Österreichisches Sumpfried)
Aa-Bayern: zwischen Hirschgund und Bichtalpe (8526/4) (4.10.1975) (!!/Glö); Ho: mehrfach südlich Emmenhausen bei Waal (8030/2) (1976) (!!).
33. Schoenus ferrugineus L. (Rostrottes Kopfried)
Aa-Tirol: zwischen Hägerauer Wald und Nagelskopf, 1400 m, zwischen Dürrenau und der Vorderen Mutte, 1300 m (8727/2) (22.6.1975) (!!).
34. Carex chodorhiza Ehrh. (Strickwurzel-Segge)
Aa-Vorarlberg: Hennenmoosalpe am Großen Kojen (8525/2) (14.8.1975) (!!); Hbo-Württemberg: Holzmühlweiher bei Eintürnen (8125/3) (27.10.1976) (!!); Ho: Bannholz-Moos bei Freßlesreute (8330/1) (5.6.1976) (!!); nördlich des Korbsees (8130/3) (1.7.1975) (!!).
35. Carex otrubae Podp. (Falsche Fuchssegge)
Hbo-Bayern: am sog. "Neuweier" bei Metzlers nahe Lindau in einem Graben (8424/1) (19.7.1975) (!!).
36. Carex tomentosa L. (Filzige Segge)
Württemb.Hbu: Eriskircher Moor (8323/3) (24.5.1975) (!!/Su).
Ho: am Lech bei Gut Dessau (8230/2) (1976) (!!).
37. Carex ericetorum Poll. (Heide-Segge)
Aa-Tirol: Griesau (8728/2) (22.6.1976) (!!), Lechauen bei Stanzach (8529/3) (22.6.1976) (!!); Ho: östlich Seeg (8329/2) (1.5.1976) (!!); nördl. Hohenfurch bei Schongau (8131/1) (18.4.1976) (!!).
38. Carex riparia Curt. (Ufer-Segge)
Württemb.Hbu: Eriskircher Moor, nicht zahlreich (8323/3) (entdeckt von WINTERHOFF, bestätigt !!/Su am 24.5.1975). Bei diesem Wuchsort handelt es sich um das erste wirklich gesicherte Vorkommen dieser sehr seltenen Art im Allgäuer Untersuchungsraum. Frühere Angaben müssen mit einem Fragezeichen versehen werden, da, wie ältere Herbarbelege zeigen, Verwechslungen mit *Carex acutiformis* vorkamen.
39. Juncus trifidus L. (Dreisfaltige Binse)
Aa-Vorarlberg: Pellingers Köpfe (8626/1) (29.7.1976) (!!);
Aa-Tirol: nahe dem Albele-See an der Rotspitze (8528/4) (26.9.1976) (!!).
40. Juncus squarrosus L. (Sparrige Binse)
Hbo-Bayern: Bruckmoos und Wildrosenmoos bei Irsengund (8425/4)

{21.5.1975), Pfarralpe auf der Taler Höhe (8426/2) (19.5.1975) (!!).

41. Juncus jacquinii L. (Gemsens-Binse)
Aa-Vorarlberg: Pellingers Köpfe (8626/1) (2.9.1975) (!!).
Erstes uns bekanntes Vorkommen im Vorarlberger Allgäu.
42. Veratrum album L. (Germer)
Ho: im St. Anna-Tal bei Mindelheim (7929/1) (entdeckt von Ha, bestätigt !! am 10.9.1976).
43. Gagea fistulosa (Ram.) Ker-Gawl. (Alpen-Gelbstern)
Aa-Vorarlberg: Hochtannberg-Paß (8726/2) (6.6.1976) (E/Bär).
44. Lloydia serotina (L.) Rchb. (Faltenlilie)
Aa-Vorarlberg: Südhänge des Elferkopfes (8627/3) (3.8.1975) (!!); Aa-Tirol: nahe den Schochenalpen-Seen (8727/2) (15.8.1976) (!!).
45. Muscari botryoides (L.) Mill. (Kleine Traubenhyazinthe)
Ho: spärlich zwischen Tussenhausen und Türkheim ("Lußäcker") (7929/2) (entdeckt von Ha, bestätigt !! am 2.5.1975).
46. Polygonatum officinale All. (Echte Weißwurz)
Hbo-Vorarlberg: spärlich auf Felsen am Gebhardsberg (8524/2) (18.5.1976) (!!). Erster uns bekannter sicherer Wuchsort am Bodensee.
47. Tamus cummunis L. (Schmerwurz)
Hbu-Vorarlberg: rechts der Bregenzer Ach bei Kennelbach {8524/1} {23.5.1976} {!!}; nahe dem Kloster Mehrerau bei Bregenz {8424/3} {18.5.1976} {!!}.
48. Crocus albiflorus Kit. (Weißer Krokus)
Hbo-Württemberg: Rimpach bei Isny (8226/3)(12.4.1976) (!!); vielleicht einziges noch nachweisbares Vorkommen im württemberg. Allgäu! - Hbo-Bayern: Berg bei Oberstaufen (8425/4) {23.4.1975} {!!}; Isenbrezhofen, südwestl. Stiefenhofen (8425/2) {26.4.1975} {!!}; nordöstl. Kalzhofen, Hompessen-Alpe an der Kalzhofner Höhe, Sickenhaus bei Genhofen, westl. Genhofen (8426/1) (26.4.1975) (!!); Hbo-Vorarlberg: Geserberg am Pfändermassiv (8424/4) (20.4.1975) (!!); am Pfändermassiv auch Weienried bei Möggers und zwischen Bergbauer Stadler und Ramsach (8424/2) (19.4.1976) (!!); östlich und nördlich Sulzberg, zwischen Weißbach und Krebs, Unterlitten bei Riefensberg (8425/4) (13.4.1975) (!!); Ho: Burgstall nordöstl. Wildberg (8329/1) (6.4.1976) (!!), zwischen Görisried und dem Mehlblockmoos (8228/4) (6.4.1976) (!!), Hohenberg bei Görisried (8229/3) (6.4.1976) (!!).
49. Gladiolus palustris Gaud. (Sumpfgladiole)
Hbo-Bayern: Stockenweiler (8324/3) (entdeckt von Dr. SEITZ, bestätigt von !! am 23.7.1975).
50. Spiranthes spiralis (L.) Chev. (Herbstliche Drehwurz)
Ho: Jagdberg bei Enzenstetten (8329/4) (entdeckt von Bau, bestätigt von !! am 18.8.1976).

51. Goodyera repens (L.) R.Br. (Netzblatt)
Aa-Tirol: Steeg, am Aufstieg zum Hohen Licht (8727/2) (4.9.1976) (!!); Elbigenalp (8728/2) (13.7.1975) (!!); Köglen (8728/2) (8.8.1976) (!!).
52. Nigritella miniata (Cr.) Janchen (Rotes Kohlröschen)
Aa-Bayern: bayer. Teil des Gemstel-Koblachs (8727/1) (13.8.1975) (Glö/!!); erster uns bekannter Wuchsort im bayer. Alpenteil des Allgäus. Aa-Tirol: Kanzberg (8628/2) (29.7.1975) (!!), zwischen Hinterhornbach und dem Einstieg zum Bäumenheimer Weg (8628/2) (31.7.1975) (entdeckt von K.u.R. LÜBENAU, bestätigt !!). Aa-Vorarlberg: österr. Teil des Gemstel-Koblachs (8727/1) (10.8.1976) (!!). In der "Flora des Allgäus" konnten wir diese Art noch nicht anführen.
53. Listera cordata (L.) R.Br. (Kleines Zweiblatt)
Aa-Tirol: nahe den Schwarzwasserseen (8528/4) (19.6.1975) (!!); Aa-Vorarlberg: Hirschbergalp am Hirschberg bei Bizau (8625/2) (6.9.1975) (!!); Hennenmoosalpe am Großen Kojen (8525/2) (14.8.1975) (!!). Hbo-Bayern: Wildrosenmoos bei Irsengund (8425/4) (entdeckt von Bri/WE, bestätigt !! am 21.5.1975); Hbo-Vorarlberg: Sättels bei Möggers am Pfändermassiv (8425/4) (entdeckt von WE, bestätigt !! am 17.6.1976). Ho: Wasenmoos nördlich Wald (8229/3) (25.5.1975) (!!); Rohrmoos bei Leuterschach (8229/4) (25.5.1975) (!!); Riedle-Moos am Elbsee (8229/1) (30.5.1976) (!!/Su).
54. Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. (Grünliche Waldhyazinthe)
Hbo-Vorarlberg: Sättels bei Möggers (8424/2) (17.6.1976) (!!).
55. Orchis purpurea Huds. (Purpur-Orchidee)
Württomb.Hbo: an mehreren Stellen bei Blumegg/Argental (8324/3) (entdeckt von Bri/WE, bestätigt !! am 17.5.1976).
56. Salix retusa L. (Gestutzte Weide)
Hbo-Bayern: auf der Kalzhofener HÖHE; erster uns bekannter Wuchsort außerhalb der Alpen (8426/1) (5.8.1976) (!!).
57. Salix myrtilloides L. (Heidelbeer-Weide)
Ho: nahe dem Roßgumpen-Moos bei Roßhaupten in reiner Ausprägung (8330/1) (6.6.1976) (!!).
58. Betula humilis Schrank (Strauch-Birke)
Ho: Kühstallweiher bei Marktoberdorf (8229/2) (9.5.1976) (!!); südlich Gut Dessau (8230/4) (10.6.1976) (!!); südlich Wenglingen bei Kaufbeuren (8129/3) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 25.9.1976); westlich Schwabbruck (8130/4) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 11.9.1976).
59. Alnus viridis (Chaix) DC. (Grünerle)
Württomb.Hbo: nördl. Arnach bei Bad Wurzach (8125/1) (8.5.1975) (!!); Vorarlberger Hbo: Geserberg und Hirschberg am Pfändermassiv, am Hirschberg bestandbildend (8424/4) (15.3.1976) (!!); im Bereich des Pfändergipfels, Neubestätigung (8424/4) (28.5.1976) (!!).
60. Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Steineiche)
Vorarlberg.Hbo: auf Felsen am Gebhardsberg (8524/2) (18.5.1976) (!!); Ho: Rechberg bei Mindelheim (7928/4) (24.6.1975) (!!).

61. Urtica urens L. (Kleine Brennessel)
Aa-Tirol: Elbigenalp (8728/2) (13.7.1976) (!!); württemb.Hbo: nahe dem Schreckensee (8123/1) (8.11.1975) (!!).
62. Viscum album L.ssp.album (Laubholz-Mistel)
Hbo-Württemberg: Helchenfurt auf *Betula pendula* (8323/1) (1.3.1975) (!!); Baumgarten bei Tettnang auf *Populus nigra* (8323/2) (16.2.1975) (!!/Bri); Hbo-Bayern: südlich Oberreitnau auf *Populus nigra* (8424/1) (2.2.1975) (!!); Scheffau auf Apfelbaum (8425/3) (19.1.1975) (!!); Pechtensweiler bei Rotkreuz (8324/3) (11.2.1975) (!!). (In Hbo-Vorarlberg noch ziemlich verbreitet).
63. Chenopodium rubrum L. (Roter Gänsefuß)
Aa-Tirol: Welzau bei Steeg, ca. 1180 m (8727/4) (4.9.1976) (!!).
64. Chenopodium hybridum L. (Bastard-Gänsefuß)
Aa-Bayern: Altstädten bei Sonthofen (8527/2) (entdeckt von E, bestätigt !! am 5.9.1976); Waldsee (8024/4) (9.11.1976) (!!).
65. Amaranthus bouchonii Thell. (Bouchons Fuchsschwanz)
Ho: Müllplatz nordwestl. Buxheim (7926/4) (14.10.1975) (!!).
66. Lemna trisulca L. (Dreifurchige Linse)
Ho: nördlich des Korbsees bei Bidingen (8130/3) (1.7.1976) (!!).
67. Arenaria biflora L. (Zweiblütiges Sandkraut)
Aa-Tirol: Obere Schochenalpe nahe dem Hohen Licht (8727/2) (15.8.1976) (!!). Diese zentralalpine Art war bisher nur aus Aa-Vorarlberg bekannt, wo sie GUTERMANN am Elferkopf entdeckte. In Aa-Bayern bisher nicht festgestellt.
68. Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. (Felsen-Miere)
Aa-Bayern: Kratzer (8627/4) (7.8.1976) (!!).
69. Stellaria holostea L. (Große Sternmiere)
Hbo-Bayern: Kienberg bei Scheidegg (8425/1) (21.5.1975) (!!).
70. Stellaria longifolia Mühl. (Langblättrige Sternmiere)
Ho: Moor westlich Bernbach bei Bidingen (8130/3) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 18.9.1976).
71. Moehringia muscosa L. (Moosmiere)
Hbo-Bayern: Enschenstein bei Weiler (8425/1) (21.1.1975) (!!).
72. Cerastium latifolium L. (Breitblättriges Hornkraut)
Aa-Tirol: zwischen Kaufbeurer Hütte und Bretterspitze (8628/4) (3.9.1975) (!!); Jochspitze gegen Kanzberg (8628/1) (22.8.1976) (KD).
73. Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. (Stein-Nelke)
Aa-Vorarlberg: Hirschberg bei Bizau (8625/2) (6.9.1975) (!!/Glö); Wasenkopf nahe dem Hohen Ifen (8626/1) (11.7.1976) (!!); Auenmulde am Hohen Ifen (8626/2) (1976) (K.PARTSCH).
74. Dianthus armeria L. (Rauhe Nelke)
Ho: Straßenrand unweit Kaufbeuren-Neugablonz (8029/4) (entdeckt von Frau STÖLZLE, bestätigt !! am 23.9.1976).

75. Nuphar pumila (Timm) DC. (Kleine Teichrose)
In einem Moortümpel nördlich des Korbsees (8130/3) (1.7.1975) (!!).
76. Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz)
Hbu-Vorarlberg: Bregenz-Rieden, Neubestätigung (8524/1) (15.3.1975) (!!); Hbo-Bayern: Niederstaufer (8324/4) (24.4.1975) (!!); Vorderreute bei Weiler (8425/2) (8.5.1975) (!!/Su); nahe Schloß Illerfeld bei Volkrathshofen (8026/4) (10.4.1976) (!!).
77. Pulsatilla vernalis (L.) Miller (Frühlings-Küchenschelle)
Aa-Tirol: Nagelskopf bei Steeg (8727/2) (22.6.1975) (!!); Vordere Mutte (8727/2) (18.6.1975) (!!); Dorferberg an der Rotwand (8628/4) (15.6.1975) (!!); Südwestgrat der Rotwand (8628/4) (8.8.1976) (!!); Häselgehrberg (8628/4) (8.6.1975) (!!); außerdem knapp außerhalb des Allgäus am Pimig (8727/4) (5.8.1975) (!!). Aus diesen ergänzenden Angaben ergibt sich ein ziemlich lückenloses Verbreitungsgebiet dieser Art im Tiroler Allgäu. Es reicht vom Häselgehrberg über Rotwand, Mutte-Jöchelspitze-Bernhardseck, Rotnase, Vordere Mutte, Nagelskopf bis zum Hochrappenkopf.
78. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. sulphurea (DC.) Asch. & Gr.
(Schwefel-Anemone)
Aa-Tirol: Nagelskopf (8727/2) (22.6.1975) (!!); Vordere Mutte (8727/2) (18.6.1975) (!!); Rotwand (8628/4) (15.9.1975) (!!); Häselgehrberg (8628/4) (8.6.1975) (!!).
79. Ranunculus grenieranus Jordan (Grenier. Hahnenfuß)
Aa-Bayern: Bettlerrücken (8627/4) (11.7.1976) (!!).
80. Ranunculus bulbosus L. (Knolliger Hahnenfuß)
Aa-Vorarlberg: Holderegg-Alpe bei Bizau (8625/2) (12.6.1976) (!!).
81. Ranunculus sceleratus L. (Gift-Hahnenfuß)
Ho: Stadtweiher Kempten, inzwischen vernichtet (8227/4) (31.8.1975) (Glö/!!); südlich Emmenhausen bei Waal (8030/2) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 25.9.1976).
82. Ranunculus pseudocassubicus Christ. (Falscher Kassuben-Hahnenfuß)
Ho: Apfeltracher Gemeindewald bei Mindelheim (7928/4) (2.5.1975) (entdeckt von Ha, bestätigt !!).
83. Thalictrum minus L. (Kleine Wiesenraute)
Ho: linksseitige Lechhänge nördl. Gut Dessau (8230/2) (3.8.1976) (!!). Im Allgäuer Ho bisher nicht sicher registriert.
84. Hepatica nobilis L. (Leberblümchen)
Württemb. Hbo an der Adelegg: Michelstobel bei Wehrlang (8326/2) (18.4.1975) (!!/Bri/WE); Schuhwerkstobel (8226/4) (25.1.1975) (!!; bestätigt Bri); Bläsistobel bei Wehrlang (8226/4) (18.5.1975) (!!). Diese drei Wuchsorte sind ein Bindeglied zwischen den nahe Kempten gelegenen Wuchsorten (z.B. Kalbsangststobel) und den Vorkommen an der untersten Argen (Beznau etc.).

85. Mahonia aquifolium (Prush) Nutt. (Mahonie)
Hbu-Bayern: reichlich und anscheinend eingebürgert am Winterberg-Priel bei Hege unweit Wasserburg (8423/2) (21.3.1976) (!!).
86. Papaver argemone L. (Sandmohn)
Württemb.Hbo: Bahngelände Aitrach (8026/2) (4.6.1976) (!!).
87. Corydalis bulbosa (L.) DC. (Hohler Lerchensporn)
Aa-Bayern: Engeratsgund-Hof im Obertal (8528/3) (27.5.1976) (E/Bär,!!); Ostrachtal nahe der Erzberg-Alpe (8528/4) (27.5.1976) (E/Bär,!!); Aa-Vorarlberg: Schönenbach-Vorsäß-Alpe (8626/1) (29.5.1975) (!!); württemberg.Hbo: Steinenbach im Argental (8324/3) (11.4.1976) (!!); Siggen (8225/4) (8.4.1975) (!!); Ho: Raggerhorn bei Wengen (8326/2) (13.5.1975) (!!); Ehwismühle bei Ittelsburg (8127/2) (Glö,!!); Saulengrain (8028/2) (2.5.1975) (entdeckt von Ha, bestätigt !!).
88. Corydalis intermedia (L.) Mérat (Mittlerer Lerchensporn)
Aa-Bayern: im Obertal nahe dem Engeratsgunder-Hof (8528/3) (entdeckt von E/Bär, bestätigt !! am 27.5.1976); im obersten Ostrachtal nahe der Hinteren Erzbergalpe (8528/4) entdeckt von E/Bär, bestätigt !! am 27.5.1976). Aus diesen weiteren Wuchsorten in Aa ließe sich vermuten, daß diese Art vielleicht doch in den Allgäuer Alpen nicht so selten ist, wegen der sehr frühen Blütezeit aber leicht übersehen werden kann.
89. Descurainia sophia (L.) Webb (Besenrauke)
Aa-Bayern: Hindelang (8528/3) (13.6.1976) (Su); Ho: Sontheim (7928/3) (!! , Glö).
90. Erysimum cheiranthoides L. (Gewöhnlicher Schotendotter)
Aa-Vorarlberg: nahe der Ifenalp-Hütte bei ca. 1750 m (8626/2) (29.8.1976) (!!).
91. Barbarea intermedia Boreau (Mittleres Barbarakraut)
Aa-Bayern: Untere Wengenalpe im Obertal (8528/3) (27.5.1976) (!!); Aa-Tirol: am Füssener Jöchle bei 1820 m (!) (8429/4) (13.6.1976) (!!); Hbo-Vorarlberg: nahe dem Weiler Rotach an der Rotach (8425/3) (23.4.1976) (!!); Ho: am Kurzenhof bei Lechbruck (8330/2) (1.5.1976) (!!); an der Schmutter bei Heggen (8230/3) (9.5.1976) (!!). Diese neuen Funde beweisen abermals die starke Ausbreitungstendenz dieser eingeschleppten Art.
92. Barbarea stricta Andrz. (Steifes Barbarakraut)
Hbu-Württemberg: in großen Mengen auf Streuwiesen im Eriskircher Moor (8323/2) (24.5.1975) (Su/!!). Es handelt sich um den ersten wirklich nachgewiesenen und belegten Wuchsort der Art im gesamten Untersuchungsgebiet. Frühere Meldungen (für Aa-Bayern) dürften mit Sicherheit auf Fehlbestimmung beruhen.
93. Cardamine bulbifera (L.) Crantz (Zwiebeltragende Zahnwurz)
Aa-Bayern: Traufbachtal (8627/4) (11.7.1975) (!!); Hbo-Bayern: Streitelsfinger Tobel bei Lindau (8424/1) (1.4.1975) (KD,!!); unterster Rotenbachtobel bei Weiler (8425/3) (23.5.1976) (KD,!!); in großer Menge nordöstl. des Wildrosenmooses nahe der österr. Grenze bei Sulzberg (8425/4) (21.5.1975) (!!); "Auf dem Gseß" bei

- Irsengund (8426/1) (26.4.1975) (!!); Hbo-Vorarlberg: an etlichen Stellen des Gebhardsberges, so z.B. nahe der Klosterruine und am Fuße der Kanzelfelsen (8524/2) (15.3.1975) (!!); am "Berg Isel" am Stadtrand von Bregenz (8524/2) (26.3.1975) (!!); "am Hacken" am Pfänder, Neubestätigung wie auch der vorherige Wuchsort (8424/4) (26.3.1975) (!!); Ho: an der Kreuzleshöhe im Kürnacher Wald (8226/4) (1.5.1975) (!!); "Legauer Wald" im Kürnachtal (8226/2) (8.5.1975) (!!); Hirtwald bei Bayersried (8028/4) (16.5.1975) (!!); Roßkopf bei Dirlwang in großer Menge (8028/2) (entdeckt von Ha, bestätigt !! am 10.6.1975). Besonders die beiden letztgenannten Vorkommen sind für die Verbreitung der Art in unserem Gebiet sehr aufschlußreich.
94. Cardamine trifolia L. (Kleeblättriges Schaumkraut)
Ho: Spelt-Berg bei Steinbach (8230/3) (9.5.1976) (!!); Birngschwend bei Wald (8229/3) (25.5.1975) (!!); Bergers (8229/3) (4.4.1976) (!!); Bannholz-Moos bei Freßlesreute (8330/1) (5.6.1976) (!!).
95. Cardamine resedifolia L. (Resedablättriges Schaumkraut)
Aa-Vorarlberg: Falzer Kopf, zwischen Steinmandl und Grünhorn mehrfach (8626/3) (14.9.1975) (!!); Aa-Tirol: nahe den Schochenalpen-Seen am Hohen Licht (8727/2) (15.8.1976) (!!); an der Schwarzen Milz (8627/4) (7.8.1976) (!!).
96. Cardamine bellidifolia L. ssp. alpina (Wild.) B.M.G.Jones
(Alpen-Schaumkraut)
Aa-Bayern: Rotthenn-Alpe am Laufbacher Eck (8528/3) (2.8.1976) (!!/E); Aa-Tirol: Schochenalpen-Seen am Hohen Licht (8727/2) (15.8.1976) (!!); Hintere Kanzalpe am Rauheck (8628/3) (22.8.1976) (!!).
97. Arabis alpina L. (Alpen-Gänsekresse)
Hbo-Bayern: im Hausbachtobel bei Weiler (8425/2) (2.5.1976) (!!); Hbo-Vorarlberg: Geserberg (8424/4) (20.4.1975) (!!); Langen am Pfändermassiv (8424/4) (15.3.1975) (!!); an der Rotach bei Rotach (8425/3) (23.4.1976) (!!); Weißachtal bei Krumbach (8525/1) (15.4.1976) (!!); Ho: an felsigen Hängen an der Wertach bei Bergers (8229/3) (1.4.1976) (!!).
98. Lunaria redivia L. (Mondviole)
Aa-Bayern: Obertal nahe dem Giebelhaus (8528/3) (7.6.1976) (!!); Aa-Vorarlberg: zwischen Au und Schnepfau (8625/2) (30.5.1976) (!!); Sevischrofen (8628/1) (29.5.1975) (!!); Schneckenloch-Wald (8626/1) (7.9.1975) (!!); Aa-Tirol: Kanzberg (Südhang) (8628/4) (13.7.1975) (!!).
99. Draba carinthiaca Hoppe (Kärntner Felsenblümchen)
Aa-Bayern: nahe dem Waltenberger Haus (8727/2) (7.8.1976) (!!); Wildengundkopf bei Einödsbach (8627/4) (4.7.1976) (!!); Grenzgrat zwischen Kratzer und der Schwarzen Milz (8627/4) (7.8.1976) (!!); Südwestgrat des Älpelekopfes (8528/4) (8.6.1976) (!!); Aa-Vorarlberg: Elferkopf (Gipfel) (8627/3) (1975) (!!).
100. Draba dubia Suter (Kälteliebendes Felsenblümchen)
Aa-Bayern: Wildengundkopf bei Einödsbach (8627/4) (4.7.1976) (!!).

101. Cochlearia pyrenaica DC. (Löffelkraut)
Ho: südöstl. Ollarzried (8128/1) (entdeckt von Glö, bestätigt !! am 15.10.1975); spärlich nahe dem "Bannwald" bei Ottobeuren (8027/4). (Diesen Wuchsort, der vor vielen Jahrzehnten angegeben wurde, suchten wir lange vergebens. Glö entdeckte ihn neu; bestätigt !! am 20.4.1976).
102. Camelina sativa (L.) Crantz (Leindotter)
Hbu-Vorarlberg: Bahngelände Bregenz (8424/3) (18.5.1976) (!!).
103. Thlaspi alpestre L. (Voralpen-Täschel)
Aa-Bayern: Tiefenberger Moos bei Fischen, neu für das Gebiet der Allgäuer Alpen! (8527/2) (entdeckt von E, bestätigt !! am 6.6.1976). Ho: Vorderburg (8328/3) (1976) (E/Su).
104. Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E.Schulz (Stumpfbläättrige Rauke)
Aa-Vorarlberg: zwischen Andelsbuch und Bezau (8625/1) (21.5.1976) (!!); Aa-Tirol: an der Straße zwischen Forchach und Stanzach (8629/1) (1975) (!!); Hbo-Vorarlberg: am unteren Ausgang des Wirtha-Tobels bei Bregenz (8524/2) (21.5.1975) (!!); Sulzberg-Doren (8525/1) (17.4.1976) (!!). Während die Art an ihrem ursprünglichen Wuchsorten am Bodenseeufer rasch zurückgedrängt bzw. vernichtet wird, breitet sie sich neuerdings mit dem Straßenneubau deutlich aus. Die obigen Wuchsortbeispiele sind nur eine kleine Auswahl!
105. Arabis turrita L. (Turm-Kresse)
Aa-Bayern: Giebelhaus (8528/3) (1976) (E/A.BÄR)
106. Erophila verna (L.) Chevall. (Hungerblümchen)
Aa-Bayern: Eingang ins Retterschwanger Tal (8528/1) (1975) (E/F.u.M.REHM).
106. Sempervivum tectorum L. (Alpen-Hauswurz)
Aa-Vorarlberg: "Tschirgge" am Haldenwanger Eck (8726/2) (10.8.1975) (!!); Hirschberg bei Bizau (8625/2) (6.9.1975) (!!); Aa-Bayern: Gemstel-Koblach nahe der Koblach-Hütte (8727/1) (Su/!!); Aa-Tirol: Hintere Mutte bei Hägerau (8727/2) bei 2200 m ! (8.8.1975) (!!); in großen Mengen zwischen Kirchendach und Rotspitze (8528/4) (26.9.1976) (!!).
107. Sedum dasyphyllum L. (Buckel-Fetthenne)
Aa-Vorarlberg: Schneckenlochwald am Hohen Ifen (8626/1) (11.7.1976) (!!); Aa-Tirol: Ölberg bei Elbigenalp (8728/2) (15.6.1975) (!!).
108. Saxifraga bryoides L. (Moos-Steinbrech)
Aa-Vorarlberg: Pellingens Köpfe am Hohen Ifen (8626/2) (2.9.1975) (entdeckt von KD, bestätigt !!); Aa-Tirol: Kanzalpe am Helleck (8628/3) (22.8.1976) (!!).
109. Saxifraga aizoides L. (Quell-Steinbrech)
Hbo-Vorarlberg: Hänge an der Bolgenach unterhalb der "Bärenbrücke" (8525/2) (13.4.1975) (!!).

110. Saxifraga granulata L. (Knötchen-Steinbrech)
Ho: Rechtsseitige Lechkante bei Pitzling (7931/3) (26.5.1975)
R, bestätigt !!). Die Art ist anscheinend im eigentlichen Allgäuer Gebiet vernichtet.
111. Saxifraga oppositifolia L. (Gegenblättriger Steinbrech)
Aa-Bayern: Güntleskopf, Rindalphorn (8426/4) (29.9.1975) (!!);
kommt anscheinend auch in der Nagelfluh-Kette durchgehend vor.
112. Saxifraga mutata L. (Kies-Steinbrech)
Hbo-Vorarlberg: unterster Wirtha-Tobel (8524/2) (21.5.1975) (!!);
Hänge an der Bolgenach unterhalb der "Eärenbrücke" (8525/2) (13.4.
1976) (!!); Hänge an der Rothach bei Rothach (8425/3) (23.4.1976)
(!!); am Zusammenfluß zwischen Bolgenach und Weißbach (8425/4)
(13.4.1976) (!!).
113. Chrysosplenium oppositifolium L. (Gegenblättriges Milzkraut)
Hbo-Bayern: in großer Menge bei Mietzlings nahe Hergensweiler
(8324/4) (14.1.1976) (!!)) und am Krebsbach bei Niederholz-Spital-
wald (8324/4) (3.4.1976) (!!)). Beide Wuchsorte wurden von WE und
PÖTZL bestätigt. Bisher war aus dem gesamten Allgäuer Raum nur
das Vorkommen im Streitelsfinger Tobel bei Lindau bekannt.
114. Rosa rubiginosa L. (Wein-Rose)
Aa-Tirol: Häselgehrberg (8628/4) (26.7.1975) (!!); "Ölberg" bei
Elbigenalp (8628/2) (13.7.1975) (!!); Hbo-Bayern: Eybele-Mühle
bei Aach (8425/4) (23.7.1975) (!!); Hbo-Württemberg: Ebenweiler
(8023/3) (1976) (!!).
115. Geum reptans L. (Kriechende Nelkenwurz)
Aa-Bayern: zwischen Bacherloch und Waltenberger Haus (8727/2)
(7.8.1976) (!!); Rotthenn-Alpe am Fuße des Laufbacher Eckes
(8628/1) (2.8.1976) (!!/E).
116. Potentilla supina L. (Niedriges Fingerkraut)
Ho: Bahngelände Oberzollhaus bei Bad Oy (8328/2) (entdeckt von
Su, bestätigt !! am 13.6.1976). Neu für das Allgäu!
117. Potentilla recta L. (Aufrechtes Fingerkraut)
Ho: Nordrand von Schwabsoien (8130/4) (3.8.1976) (!!).
118. Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck (Crantz'sches Fingerkraut)
Hbo-Vorarlberg: an Mauern rechts der Bregenzer Ache bei Doren
(8525/1) (17.4.1976) (!!/Su). Das tiefstgelegene uns bekannte
Vorkommen!
119. Potentilla aurea L. (Gold-Fingerkraut)
Hbo-Bayern: Kalzhofener Höhe (8426/1) (1.5.1975) (!!); Taler
Höhe (8426/2) (19.5.1975) (!!).
120. Potentilla alba L. (Weißes Fingerkraut)
Ho: nördlich Hohenfurch (8131/1) (18.4.1976) (KD/!!).
121. Fragaria viridis Duchesne (Knack-Erdbeere)
Ho: "Lußäcker" bei Türkheim (7929/2) (2.5.1975) (Ha/!!).

122. Amelanchier ovalis Medicus (Felsenbirne)
Hbo-Vorarlberg: an den Kanzelfelsen des Gebhardsberges, also in unmittelbarer Bodenseenähe (8524/2) (19.5.1976) (!!).
123. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch (Filzige Mispel)
Hbo-Vorarlberg: an den Kanzelfelsen des Gebhardsberges (8524/2) (18.5.1976) (!!).
124. Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeffer) Rothm. (Regensb. Geißklee)
Ho: östlich Osterzell (8130/2) (19.9.1976) (entdeckt von Bau, bestätigt von !!).
125. Astragalus penduliflorus Lam. (Hängeblütiger Tragant)
Aa-Bayern: Doismenalpe und zwischen Oberer und Unterer Wengenalpe (1400-1600 m) (8528/3) (14.7.1976) (E, bestätigt !!). Aa-Vorarlberg: "Tschirgge" nahe dem Hochtannberg-Paß (8726/2) (10.8.1975) (!!); Derra-Köpfl und Hochstarzel bei Baad (8626/4) (24.7.1975) (!!); Aa-Tirol: Rotwand (Südwestgrat) (8728/1) (!!); neu für das Tiroler Allgäu!? ; etwas außerhalb des Allgäus auch am Pimig (8727/4) (5.8.1975) (!!).
126. Oxytropis campestris (L.) DC. (Alpen-Spitzkiel)
Aa-Tirol: Rotwand (8728/1) (8.8.1975) (!!); Lechauen zwischen Schönau und Oberstockach (8728/1) (28.6.1975) (!!); Elbigenalp (8728/2) (28.6.1975) (!!); Lechauen bei Grünau (8728/2) (28.6.1975) (!!); Häselgehrberg (8628/4) (8.6.1975) (!!); Lechauen unterhalb Stanzach (8529/4) (30.5.1975) (!!).
127. Lathyrus heterophyllus L. (Verschiedenblättrige Platterbse)
Aa-Tirol: mehrfach an den Südhängen des Häselgehrberges bei 1300 m, 1500-1600 m und 1700 m (8628/4) (27.7.1975) (Glö/!!). Zweites uns bekanntes Vorkommen im Allgäu!
128. Trifolium aureum Pollich (Gold-Klee)
Hbo-Württemberg: Wellmutsweiler im Argental (8323/4) (20.10.1976) (!!).
129. Onobrychis montana DC. (Berg-Fahnenwicke)
Aa-Tirol: Hornbachtal bei Hinterhornbach im Bachgeröll, drittes uns bekanntes Allgäuer Vorkommen (8628/2) (9.7.1975) (KD/!!). Von welchem Berg im Bereich des Hornbachtals die Art herabgeschwemmt wurde, konnten wir bisher nicht ermitteln.
130. Geranium sanguineum L. (Blut-Storchnabel)
Ho: Oberkopf-Wald bei Hartental (8029/1) (16.5.1976) (!!/Ha).
131. Geranium pratense L. (Wiesen-Storchnabel)
Aa-Bayern: an der Unteren Wengenalpe bei 1260 m (8528/3) (14.7.1976) (!!/E). Höchster uns bekannter Wuchsort!
132. Geranium sylvaticum L. (Wald-Storchnabel)
Hbu-Vorarlberg: Kennelbach rechts der Bregenzer Ache (8524/2) (18.5.1976) (!!); Ho: südöstl. Oberlauchdorf (8029/1) (11.6.1976) (entdeckt von Ha, bestätigt !!); Eichkapelle südöstl. Mindelheim (7929/3) (11.6.1976) (entdeckt von Ha, bestätigt !!).

133. Geranium phaeum L. ssp. lividum (L'Hér.) Hayek
 Aa-Vorarlberg: zwischen Völken und Sippersegg bei Balderschwang (8526/1) (15.6.1975) (entdeckt von E, bestätigt !!); Aa-Tirol: Hinterhornbach (8628/2) (15.6.1975) (!!); massenhaft auf Auwiesen zwischen Elmen und Häselgehr (8629/3) (15.6.1975) (!!); Vorderhornbach (8629/1) (30.5.1975) (!!); Hbu-Vorarlberg: Schloß Wellenstein bei Lochau, Neubestätigung (8424/4) (21.5.1975) (!!).
134. Geranium phaeum L.
 Hbu-Bayern: im Park der Villa Leuchtenberg bei Lindau (8424/3) (21.5.1975) (!!); halbverwildert?
135. Geranium molle L. (Weicher Storchschnabel)
 Ho: an der Schnellstraße Marktoberdorf-Kempten nahe dem "Vogelwirt" (8228/2) (5.6.1976) (!!).
136. Linum viscosum L. (Klebriger Lein)
 Ho: links des Lechs nördlich Lechbruck (8230/4) (18.6.1976) (!!); links des Lechs nördlich Gut Dessau (8230/2) (3.8.1976) (!!).
137. Polygala serpyllifolia J.A.C.Hose (Quendelblättrige Kreuzblume)
 Aa-Vorarlberg: nahe dem "Schnapshüttle" am Großen Kojen (8525/2) (30.9.1975) (!!); Hbo-Bayern: Bruckmoos bei Irsengund (8425/4) (21.6.1976) (!!).
138. Euphorbia dulcis L. (Süße Wolfsmilch)
 Hbo-Vorarlberg: an den Bolgenach-Hängen unterhalb der "Bärenbrücke" bei Krumbach (8525/2) (7.7.1976) (entdeckt von KD, bestätigt !!).
139. Euphorbia brittingeri Opiz (= E. verrucosa L.) (Warzen-Wolfsmilch)
 Ho: zwischen Lechbruck und Gut Dessau links des Lechs (8330/4) (1976) (!!); südlich Wurmansried bei Bayersried (8028/4) (16.5.1976) (!!).
140. Mercurialis annua L. (Einjähriges Bingelkraut)
 Ho: Müllplatz nordwestlich Buxheim (7926/4) (10.10.1975) (!!).
141. Ilex aquifolium L. (Stechpalme)
 Aa-Bayern: "Hagspiel" bei Aach unweit Oberstaufer (8425/4) (27.4.1975) (!!); Aa-Vorarlberg: Rücken des Großen Kojen (8525/2) (30.9.1975) (!!); Hbu-Württemberg: Talholz bei Kreßbronn (8423/2) (18.1.1976) (!!); nördlich Gerbertshaus bei Tettwang (8323/1) (21.1.1976) (!!); Hbu-Bayern: Schwandholz am Wasserburger Bühel (8423/2) (1.3.1975) (!!/ Bri); östlich Hege am Winterberg-Priel (8423/2) (21.3.1976) (!!); Hbu-Vorarlberg: Mehrerau (8424/3) (26.3.1975) (!!); Hbo-Württemberg: Eggis-Holz bei Kümmeratsweiler (8423/2) (21.2.1975) (!!); Großholz bei Betznau (8323/4) (18.1.1976) (!!); Waibelhub-Wald bei Unter-Wolfertsweiler (8323/4) (23.1.1975) (!!); Hbo-Bayern: bei Dürren nahe Eggatsweiler (8423/2) (2.2.1975) (!!); nördlich Bechtensweiler (8423/2) (2.2.1975) (!!); in 8423/2 östlich Betznau (2.3.1975) (!!); Röhrenbachholz bei Betznau (2.3.1975) (!!); nördlich Rickats-hofen (9.3.1975) (!!); in 8424/1 nahe dem Anspachweiher bei Oberreitnau (6.1.1975) (!!); nordöstlich Gitzenweiler (9.1.1975) (!!); Rengolfsberg bei Schönau (2.3.1975); in 8424/2 bei Sigmarszell (2.1.1975) (!!); Laiblachberg (23.2.1975) (!!); westlich

Oberrengersweiler (16.3.1975) (!!); östlich Thumen (25.4.1976) (!!); Wildrosenmoos bei Irsengund (8425/4) (23.4.1975) (!!); "Am Gseß" bei Irsengund (8425/2) (26.4.1975) (!!); Humbertsweiler (8324/3) (17.1.1975) (!!); Hbo-Vorarlberg: in 8424/4 links der Laiblach bei Leutenhofen nahe Hohenweiler (2.1.1976) (!!); und bei Geserberg (4.1.1975) (!!). Wenn auch an etlichen dieser Wuchsorte nur wenige Exemplare der Art zu finden sind (manchmal nur ein älterer Baum), so ergibt sich doch auf Grund dieser Neufunde eine nahezu lückenlose Verbreitung der Art auch im Raum zwischen den längst bekannten Wuchsorten im württembergischen Seewald und im südlichen Pfändergebiet. Nahezu alle Vorkommen liegen allerdings in den Meßtischblättern 8323, 8423, 8424 und 8425. Aus 8324 ist uns bisher nur ein Wuchsort bekannt. -
Ho: Weilerle am Sonneck, Neubestätigung (8327/1) (1976) (!!).

142. Malva alcea L. (Spitz-Malve)
Ho: Oberkopf-Wald bei Hartental (Oberlauchdorf) (8029/1) (8.6.1976) (Ha/!!).
143. Hibiscus trionum L. (Eibisch)
Ho-Württemberg: in großer Zahl am Straßenrand zwischen Tannheim und Egelsee (7926/4) (18.8.1976) (!!).
144. Viola rupestris F.W.Schmidt (Sand-Veilchen)
Aa-Bayern: an der unteren Wengenalpe im Obertal bei etwa 1250 m (8528/3) (27.5.1976) (!!); Ho: linksseitige Lechauen beim Gut Dessau (8230/2) (3.8.1976) (!!).
145. Hippophae rhamnoides L. (Sanddorn)
Hbu-Vorarlberg: rechts der Bregenzer Ache bei Kennelbach (3524/1) (23.5.1976) (!!).
146. Epilobium fleischeri Hochst. (Gletscher-Weidenröschen)
Aa-Vorarlberg: im Kleinen Walsertal bei Baad gegen die Ochsenhofener Köpfe (8626/4) (24.7.1975) (!!); Aa-Tirol: links des Lechs zwischen Schönau und Oberstockach, sehr bedroht (8728/1) (28.6.1975) (!!).
147. Epilobium collinum C.C.Gmelin (Hügel-Weidenröschen)
Aa-Bayern: Burgbichel Oberstdorf (8527/3) (28.3.1976) (!!); zwischen Giebelhaus und Engeratsgunder Hof (8528/3) (19.6.1976) (!!); "Sauwald" beim Giebelhaus (8528/4) (10.10.1976) (!!); Aa-Vorarlberg: Schneckenloch-Wald (8626/1) (27.9.1975) (!!).
148. Hippuris vulgaris L. (Tannenwedel)
Aa-Bayern: im Grundbach bei Fischen (8527/2) (1975) (E).
149. Hydrocotyle vulgaris L. (Wassernabel)
Hbo-Bayern: zwischen Rehlings und Oberreitnau (8424/1) (23.6.1976) (!!).
150. Chaerophyllum aureum L. (Gold-Kälberkropf)
Hbo-Bayern: "Neuweiher" bei Metzlers (8424/1) (24.5.1975) (!!).
151. Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke (Glänzender Kerbel)
Aa-Bayern: zwischen der Laufbichl-Alpe und der Lengensfeld-Alpe

im Obertal (8528/3) (7.6.1976) (!!); Wald nahe der Hinteren Erzberg-Alpe (8528/4) (8.6.1976) (!!).

152. Athamanta cretensis L. (Kretische Augenwurz)
 Aa-Vorarlberg: Fellisfluh am Hohen Ifen (8626/2) (2.9.1975) (!!);
 Aa-Tirol zwischen Mittlerer und Oberer Hochalpe bei Steeg
 (8727/2) (3.9.1976) (!!); im Bachgeröll des Schwarzwassertaales
 nahe der Eybele-Alp (8528/4) (18.6.1976) (!!).
153. Berula erecta (Hudson) Coville (Berle)
 Hbo-Württemberg: Oberes Ried südlich Gaisbeuren (8124/1) (12.11.
 1976) (!!); "Riedwiesen" westl. Aulendorf (8023/2) (14.2.1976)
 (!!); Ho: westlich Schwabbruck (8130/4) (11.9.1976) (!!).
154. Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. (Österreichischer Rippensame)
 Hbu-Vorarlberg: rechts der Bregenzer Ache bei Kennelbach
 (8524/1) (23.5.1976) (!!); Hbo-Vorarlberg: am Zusammenfluß der
 Weißbach und der Bolgenach (8425/4) (7.7.1976) (!!).
155. Bupleurum ranunculoides L. (Hahnenfußblättriges Hasenohr)
 Aa-Bayern: Güntleskopf, Buralpkopf, Rindalphorn (8426/4)
 (28.9.1976) (!!); nördlich des Ifengipfels (8626/2) (29.8.
 1975) (KD/!!); Aa-Vorarlberg: Hählekopf am Hohen Ifen (8626/3)
 (2.9.1975) (KD/!!); Hohe Kirche (8625/2) (16.9.1975) (KD/!!).
156. Apium repens (Jacq.) Lag. (Kriechender Sellerie)
 Aa-Tirol: am Lech bei Unterpinswang (8430/3) (1975) (entdeckt
 von Su, bestätigt!!). Aus unserem Alpengebiet bisher unbekannt.
157. Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. (Hirschwurz)
 Ho: nördlich Lechbruck (8230/4) (18.6.1976) (!!); Schwabsoien
 (8130/4) (3.8.1976) (!!).
158. Laserpitium prutenicum L. (Preußisches Laserkraut)
 Ho: Elbsee (8229/1) (11.5.1976) (!!); nordwestlich Geisenried
 (8229/1) (12.9.1976) (!!); südlich Gut Dessau (links des Lechs)
 massenhaft (8230/4) (10.6.1976) (!!); westlich Bernbach
 (8130/3) (18.9.1976) (!!).
159. Laserpitium siler L. (Echtes Laserkraut)
 Aa-Tirol: an den Südhängen des Häselgehrberges bei ca. 1400 m
 und bei ca. 1700 m (8628/4) (8.6.1975) (!!/Glö).
160. Cicuta virosa L. (Wasserschierling)
 Ho: westlich Schwabbruck (8130/4) (11.9.1976) (!!).
161. Pyrola minor L. (Kleines Wintergrün)
 Hbo-Bayern: Knechtental bei Oberreitnau (8324/3) (1976) (!!);
 Hbo-Vorarlberg: in 8424/4 nahe dem Gipfel des Pfänders und
 im obersten Wirtha-Tobel (1976) (!!).
162. Pyrola chlorantha Swartz (Grünliches Wintergrün)
 Aa-Tirol: bis 1300 m im Hägerauer Wald bei Steeg (Lechtal)
 {8727/2} {22.6.1975} (!!); Ho: zwischen Landsberg und Pitzling
 {7931/3} (1975) (R, bestätigt !!/Glö).

Höhenbachtal bei Holzgau (8728/1) (15.6.1976) (!!); Südhang des Kanzberges bei Hinterhornbach (8628/4) (1975) (!!); im Schwarzwassertal zwischen Eible-Alp und Unterer Lichtalpe (8528/4) (19.6.1976) (!!); etwas außerhalb der Grenze auch am Pimig (Pleisskopf) (8727/4) (5.8.1975) (!!).

181. Teucrium scorodonia L. (Wald-Gamander)

Hbo-Württemberg: Hasenberg bei Großholzleute, Neubestätigung (8326/1) (5.8.1976) (!!); "Fürstenwald" bei Ochsenhausen, Neubestätigung (7925/2) (4.8.1975) (!!); Revier Reichenbach südlich Edelbeuren (7926/1) (24.10.1976) (!!), Neubestätigung; Ho: zahlreich östlich Osterzell (8130/2) (19.9.1976) (!!).

182. Teucrium chamaedrrys L. (Edel-Gamander)

Hbo-Württemberg: Wellmutsweiler im Argental (8323/4) (20.10.1976) (!!), Neubestätigung; Kochermühle/Argen (8323/4) (20.10.1976) (!!), Neubestätigung; Ho: links des Lechs nördlich Dessau (8230/2) (10.6.1976) (!!); östlich Osterzell (8130/2) (19.9.1976) (!!); Nordrand von Schwabsoien (8131/3) (18.4.1976) (!!); Hirschauer Halde bei Reichling (8031/3) (26.5.1975) (R/!!).

183. Galeopsis bifida Boenn. (Zweizähniger Hohlzahn)

Ho: Moor bei Oberauerbach (7928/4) (10.9.1976) (entdeckt von Ha, bestätigt !!); östlich Nassenbeuren (7929/1) (2.8.1975) (entdeckt von Ha/Dr.BRAUN, bestätigt !!).

184. Leonurus cardiaca L. (Herzgespann)

Ho: Marienhof bei Erpfting (7930/4) (17.6.1975) (entdeckt R, bestätigt !!).

185. Stachys alopecurus (L.) Bentham (Fuchsschwanz-Ziest)

Aa-Tirol: Kanzberg bei Hinterhornbach (8628/2) (29.7.1975) (!!); Lechkies bei Stanzach (8529/4) (30.5.1975) (!!).

186. Nepeta cataria L. (Katzenminze)

Aa-Tirol: Adventiv in Köglen bei Elbigenalp (8728/1) (8.8.1976) (!!).

187. Mentha spicata L. (= M. crispata Schrader) (Krauseminze)

Aa-Bayern: Illerdamm bei Fischen (8527/2) (5.9.1976) (entdeckt von E, bestätigt !!); Ho: in einem Moor bei Geisenried (8229/1) (12.9.1976) (!!). Die Art war uns bisher aus dem Allgäu unbekannt.

188. Hyoscyamus niger L. (Schwarzes Bilsenkraut)

Ho: Adventiv bei Kaufering (7931/1) (1975) (R).

189. Mimulus guttatus DC. (Gauklerblume)

Ho: Hopfensee (8330/3) (14.10.1976) (!!).

190. Veronica austriaca L. ssp. teucrium (L.) D.A. Webb (Großer Ehrenpreis)

Hbo-Württemberg: Drachenstein bei Laimnau (Argental) (8323/4) (30.10.1976) (!!).

191. Melampyrum arvense L. (Acker-Wachtelweizen)
Ho: "Luss-Wald" bei Huttenwang (8129/1)(12.9.1976) (entdeckt von Bau, bestätigt !!).
192. Euphrasia hirtella Jordan (Zottiger Augentrost)
Aa-Tirol: Mittlere Schochenalpe bei Holzgau (8727/2) (15.8.1976) (!!); Häselgehrberg (8628/3) (26.5.1975) (!!).
193. Bartsia alpina L. (Alpenhelm)
Hbo-Bayern: Wildrosenmoos nahe Sulzberg/Vorarlberg (8425/4) (entdeckt von WE/Bri, bestätigt !!) (1975); neu für Hbo-Bayern! Ho: massenhaft links des Lechs südlich Gut Dessau (8230/4)(10.6.1976) (entdeckt KD, bestätigt !!); Quellmoor westlich und südlich der Gennachsäge (8130/3) (12.9.1976) (entdeckt von Bau, bestätigt !!); Moore westlich Schwabbruck (8130/4) (11.9.1976) (entdeckt von Bau, bestätigt !!); im Hofmahdgraben bei Erbenschwang (8130/4) (12.9.1976) (entdeckt von Bau, bestätigt !!); am Hornbach beim Korbsee (8230/1) (28.5.1976) (!!); Quellmoor am Kreuzweiher bei Welden (8030/4) (23.9.1976) (!!); im St.-Anna-Tal bei Mindelheim in einem Quellmoor (7929/1) (10.9.1976) (entdeckt von Ha, bestätigt !!); besonders dieser weit nach Norden vorgeschobene Wuchsort ist interessant!
194. Orobanche purpurea Jacq. (Blaue Sommerwurz)
Hbo-Württemberg: in großer Zahl auf *Achillea millefolium* nahe dem "Waldweiher" bei Bad Wurzach (8025/4) (13.7.1975) (!!), auch von Dr.HIRSCH (Memmingen) gefunden.
195. Orobanche flava C.F.P.Mart. (Gelbe Sommerwurz)
Aa-Bayern: Ostrachkies beim Giebelhaus (8528/3) (1976) (E); Aa-Tirol: Mittlere Schochenalpe bei Holzgau (8727/2) (15.8.1976) (!!).
196. Globularia vulgaris L. (Gewöhnliche Kugelblume)
Aa-Tirol: Elbigenalp (8728/2) (15.6.1975) (!!); Ho: nördlich Gut Dessau links des Lechs (8230/2)(10.6.1976) (!!).
197. Plantago indica L. (Sand-Wegerich)
Ho: Bf. Sontheim (7928/3) (24.9.1975) (entdeckt von Glö, bestätigt !!); neu für Ho!
198. Galium wirtgenii F.Schultz (Frühes Labkraut)
Hbo-Württemberg: Argental bei Wiesach (8323/4) (23.6.1976) (!!); Ho: zwischen Freßlesreute und Schönbichel (8330/1) (5.6.1976) (!!); nördlich Lechbruck (8230/4) (18.6.1976) (!!); südlich Gut Dessau (8230/4) (10.6.1976) (!!); Korbsee (8130/3) (1.7.1975) (!!).
199. Galium hercynicum Weig. (Harzer Labkraut)
Aa-Bayern: Tiefenberger Moor bei Fischen, zahlreich (8527/2) (6.6.1975) (!!).
200. Cruciata glabra (L.) Ehrend. (Kahles Kreuzlabkraut)
Ho: zwischen Maria Rain und der Lohmühle (8328/3) (8.6.1976) (entdeckt von Su, bestätigt !!); drittes uns bekanntes Allgäuer Vorkommen!

201. Lonicera periclymenum L. (Deutsches Geißblatt)
Hbu-Bayern: Waltersberg bei Oberreitnau (8424/1) (12.1.1975) (!!); "Neuweiher" bei Metzlers (8424/1) (24.5.1975) (!!).
Neu für unser Gebiet!
202. Valeriana tripteris L. (Dreiblättriger Baldrian)
Hbo-Vorarlberg: an der Rotach bei Rotach (8425/3) (23.4.1976) (!!); an der Bolgenach-Mündung (8425/4) (13.4.1976) (!!).
203. Valeriana montana L. (Berg-Baldrian)
Hbo-Württemberg: Schleifertobel (8226/4) (28.4.1976) (!!);
Hbo-Bayern: Gerbertobel (8425/3) (3.6.1975) (!!); Ho: am Lech
in einer Schlucht nahe dem "Kurzenhof" (8330/2) (1.5.1976)(!!).
204. Valeriana supina Ard. (Niedriger Baldrian)
Aa-Bayern: Bockkar-Scharte (8727/2) (7.8.1976) (!!); Aa-Tirol:
nahe den Schochenalpen-Seen (8727/2) (15.8.1976) (KD); Grat an
der Schwarzen Milz (vielleicht noch in Bayern) (8627/4) (7.8.
1976) (!!); im Bachkies des Hornbaches bei Hinterhornbach
(8628/2) (9.7.1975) (KD/!!).
205. Phyteuma nigrum F.W.Schmidt (Schwarze Teufelskralle)
Ho: Roßkopf (8028/2) (10.6.1975) (Ha, bestätigt !!); Apfel-
tracher "Gemeindewald" (7928/4) (2.5.1975) (Ha, bestätigt !!).
206. Phyteuma hemisphaericum L. (Halbkugelige Teufelskralle)
Aa-Vorarlberg: Pellingens Köpfe am Hohen Ifen (8626/1) (2.9.
1975) (!!); Aa-Tirol: Hintere Mutte bei Holzgau (8727/2)
(8.8.1975) (!!); Schwarze Milz (8627/4) (7.8.1976) (!!).
207. Erigeron acer L. ssp.angulosus (Gaud.) Vacc.
Aa-Bayern: Fischen (8527/2) (6.9.1976) (!!).
208. Erigeron atticus Vill. (Drüsiges Berufskraut)
Aa-Bayern: Doismen-Alpe im Obertal (8528/3) (14.7.1976) (!! / KD),
bestätigt von E/!! am 19.7.1976. Zweites Vorkommen in Deutsch-
land, drittes uns bekanntes Vorkommen in den Allgäuer Bergen!
209. Inula salicina L. (Weidenblättriger Alant)
Aa-Bayern: Oberstdorf (8527/4) (1975) (E).
210. Leontopodium alpinum Cass. (Edelweiß)
Lechauen bei Grünau (8728/2) (28.6.1975)
211. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (Ruhrwurz)
Hbo-Württemberg: Revier "Karlswinkel" bei Seibranz (8125/2)
(24.10.1976) (!!); Ho: Hirschau (Lech) (8031/3) (26.5.1975)
(R,!!).
212. Chrysanthemum segetum L. (Saat-Wucherblume)
Ho: adventiv auf Müll nordwestlich Buxheim (7926/4) (5.9.1976)
(!!/E).
213. Artemisia mutellina Vill. (Edelraute)
Aa-Bayern: nahe der Trettach (8727/2) (7.8.1976) (!!).
214. Artemisia vulgaris L. (Gemeiner Beifuß)
Aa-Bayern: Haldenwanger Alpe bei 1600 m (8727/1) (15.8.1975)(!!).

215. Artemisia campestris L. (Feld-Beifuß)
Ho: zwischen Westerheim und Erkheim (7927/4) (7.8.1975) (entdeckt von Glö, bestätigt !!); neu für unser Untersuchungsgebiet!
216. Petasites paradoxus (Retz) Baumg. (Alpen-Pestwurz)
Hbo-Württemberg: im Schleifertobel (8226/4) (22.6.1976) (!!); Neubestätigung; Hbo-Bayern: Maisachtobel bei Buchenbühl, an einer Rutschstelle zahlreich (8425/1) (15.5.1976) (!!/Glö); Ellhofener Tobel an unzugänglicher Felswand (8425/2) (15.5.1976) (!!/Glö); Hausbachtobel bei Weiler (8425/2) (2.5.1975) (!!); ihrer schweren Zugänglichkeit wegen wurden die Wuchsorte dieser Art im bayerischen Westallgäu bisher übersehen. Auch ADE erwähnte kein Vorkommen. Hbo-Vorarlberg: in einem Tobel nordwestlich der "Bärenbrücke" bei Müselbach (8525/1) (6.7.1976) (!!); an Weißbachhängen unweit Krumbach und an der Weißbachmündung (8525/1) (17.4.1976) (!!); an der Bolgenach (Rutschhänge) unterhalb der "Bärenbrücke" (8525/2) (13.4.1976) (!!); am Zusammenfluß zwischen Weißbach und Bolgenach (8425/4) (13.4.1976) (!!); Ho: unweit Sachsenried (8130/4) (18.4.1976) (!!); Straßenrand in Burggen (8230/2) (5.5.1976) (!!); Westhang des Moosberges südöstlich Altensteig (7929/3) (entdeckt von Ha, bestätigt !!). Zum Unterschied von Hbo wächst die Alpen-Pestwurz in Ho (außerhalb des Lechs) fast ausschließlich als Begleiter von Verkehrswegen.
217. Homogyne alpina (L.) Cass. (Alpenlattich)
Hbo-Württemberg: Schlaunenberg bei Doberatsweiler (8324/3) (19.2.1976) (!!); wegen seiner tiefen Lage (wenig über 500 m) ein bemerkenswerter Wuchsort! Hbo-Bayern: Wildrosenmoos nahe Sulzberg (Vorarlberg) (8425/4) (23.4.1976) (!!); zwischen Wildrosenmoos und Bruckmoos (8425/4) (21.5.1976) (!!); Eybele-Mühle bei Aach (8425/4) (27.4.1976) (!!); Kalzhofener Höhe bei Oberstauten (8426/1) (1.5.1976) (!!); Vorderreute bei Weiler (8425/2) (1976) (!!); Hbo-Vorarlberg: Hirschberg am Pfändermassiv (8424/4) (3.7.1976) (!!); Ho: zwischen Ullenberg und Rimmelsberg bei Obergünzburg (8128/3) (15.10.1975) (entdeckt von Glö, bestätigt !!).
218. Doronicum columnae Ten. (Herzblättrige Gemswurz)
Ho: verwildert im Hofener Wald nahe dem Korbsee (8230/1) (28.5.1976) (!!).
219. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Telekie)
Ho: in großer Menge südlich Gut Dessau links des Lechs (8230/4) (7.8.1976) (!!).
220. Senecio carniolicus Willd. (Kärtner Kreuzkraut)
Aa-Bayern: Rappensee spärlich, Neubestätigung (8727/2) (19.8.1976) (!!); Aa-Vorarlberg: Pellingers Köpfe am Hohen Ifen (8626/1) (29.7.1976) (!!).
221. Senecio abrotanifolius L. var. tirolensis (Kern.) Beg.
(Edelrautenblättriges Kreuzkraut)
Nicht im eigentlichen Gebiet, aber ganz knapp außerhalb der Untersuchungsgrenze am Pimig (8727/4) (5.8.1975) (entdeckt von KD, bestätigt !!); könnte in Aa-Tirol vorkommen.

222. Senecio vernalis Waldst. & Kit. (Frühlings-Kreuzkraut)
Aa-Bayern: Tiefenbach bei Hindelang (8428/3) (13.6.1976) (!!).
223. Cirsium eriophorum (L.) Scop. (Wolldistel)
Aa-Tirol: Aufstieg von Dürrenau zur Vorderen Mutte (8727/2) (28.6.1975) (!!); der Wuchsort liegt bei 1500 m ! Rotwand bei Elbigenalp, Häselgehrberg (8628/4) (1975) (!!).
224. Cirsium tuberosum (L.) All. (Knollige Distel)
Ho: links des Lechs bei Urspring (8230/4) (18.6.1976) (!!); links des Lechs bei Gut Dessau (8230/2) (18.6.1976) (!!).
225. Aposeris foetida (L.) Less. (Hainsalat)
Ho: linksseitige Illerauen bei Krugzell (8227/2) (21.5.1976) (entdeckt von FEURER/Su, bestätigt !!). Ein bemerkenswerter Fund im Illergebiet! Bisher war die Art unterhalb Rauns bei Waltenhofen unbekannt.
226. Solidago graminifolia (L.) Sal. (Grasblättrige Goldrute)
Hbo-Württemberg: Naßsee bei Malmishaus (Ebenweiler) (8123/1) (30.9.1976) (!!).
227. Picris hieracioides L. (Gemeines Bitterkraut)
Aa-Bayern: auf der Kuhplatten-Alpe bei ca. 1700 m (8528/3) (2.8.1976) (!!/E).
228. Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Milchlattich)
Hbo-Bayern: zwischen Bruck- und Wildrosenmoos (8425/4) (21.5.1975) (!!); Hbo-Vorarlberg: Wirtha-Tobel und Hirschberg am Pfändermassiv (8424/4) (3.7.1976) (!!).
229. Crepis treglouensis (Hacq.) Kern. (Triglav-Pippau)
Aa-Bayern: am Hohen Ifen auf bayer. Gebiet (8626/2) (2.9.1975) (!!).
230. Hieracium humile Jacq. (Niedriges Habichtskraut)
Aa-Vorarlberg: Schneckenlochwald (8626/1) (11.7.1976) (!!); Aa-Tirol: Oberstockach (8728/2) (13.7.1975) (!!); Roßkar am Hochvogel (1950 m) (8628/2) (31.7.1975) (!!); Aa-Bayern: Geishorn im Kleinen Walsertal (2300 m !) (8727/2) (13.8.1975) (!!/Glö).

Nachtrag:

Dryopteris cristata (L.) Gray (Kammfarn)

Hbo-Württemberg: Altshausener Weiher (8023/3) (14.11.1976) (!!); in Torfstichen bei Laubbronnen nahe Aulendorf (8023/2) (14.11.1976) (!!); Unteres Ried bei Waldsee (8023/3) (13.11.1976) (!!); Ho: Leuterschach bei Marktoberdorf (8229/4) (entdeckt von Bau, bestätigt !! am 29.11.1976). Mit diesen neuen Funden erhärtet sich das Bild von einer bestimmten, mehr oder weniger zusammenhängenden Verbreitung des Kammfarns.

Dianthus armeria L. (Büschelnelke)

Aa-Bayern: zwischen Untermaiselstein und Immenstadt (8427/1) (1975) (E).

Potentilla norvegica L. (Norwegisches Fingerkraut)

Ho: Unggenrieder Weiher bei Mindelheim (7928/4) (1976) (Ha).

Carex pseudocyperus L. (Cyperngras-Segge)

Hbo-Württemberg: Laubbronnen b. Aulendorf (8023/2) (14.11.1976) (!!); Musbacher Ried (8023/1) (21.11.1976) (!!).

Euphorbia dulcis L. (Süße Wolfsmilch)

Aa-Bayern: Obertal nahe Engeratsgunder Hof (8528/3) (1.10.1975) (E).

Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Einblättrige Fischblume)

Aa-Bayern: oberhalb Altstädten nicht selten (8527/2) (10.7.1976) (E); am Ochsenberg (8527/4) (3.7.1975) (E); am Imberg - 37 Exemplare! (8528/1) (8.7.1975) (E); zwischen Hinterstein und Eckalpe (8528/1) (13.7.1975) (E).

Poa hybrida Gaud. (Bastard-Rispengras)

Aa-Bayern: Mittlere Wengenalp (8528/3) (18.7.1976) (!!/E).

Cymbalaria muralis Gärtn., Mey. u. Scherb. (Zimbelkraut)

Aa-Bayern: Ostrach - Uferbefestigung bei Vorderhindelang (8428/3) (1975) (E).

Anschrift des Verfassers:

Dr. Erhard DÖRR
Oberstudiendirektor
Bodmanstr. 30
D-896 Kempten/Allgäu

Wichtiger Hinweis

Die von uns bisher verwendete Abkürzung für Literaturhinweise "Naturwiss.Mitt.Kempten" in der Kopfleiste der Aufsätze hat in neuerer Zeit mehrfach zu nutzlosen Anfragen bei Bibliotheken geführt, weil es üblich ist, bei kleineren Arbeiten den Titel der Zeitschrift, in der sie abgedruckt sind, zu zitieren.

Wir haben daher schon heute die Hinweise auf unsere Zeitschrift in der Kurzform den Arbeiten vorangestellt und bitten die Autoren, bei weiterer Versendung älterer Sonderdrucke die Kopfleiste entsprechend zu ändern, und in zukünftigen Manuskripten, bei Briefwechsel usw. unsere Publikationen - wie auf dem Umschlag aufgedruckt - als "Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten/Allgäu" zu bezeichnen, um "Zweigeleisigkeiten" zu vermeiden.

Gegen Abkürzungen ist nichts einzuwenden.

Die Schriftleitung

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [20_2](#)

Autor(en)/Author(s): Dörr Erhard

Artikel/Article: [Allgäu-Floristik 1975/76. 21-45](#)