

Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen, 2. Teil
=====

Von Richard WISMATH, Füssen

Fortsetzung der Artenliste:

(Der 1. Teil wurde im April 1974 in den Mitteilungen des Naturw.-wiss.Arbeitskreises Kempten, Jgg.18/1:42-52 veröffentlicht)

103. Sperlingskauz (Glaucidium passerinum):

Wohl regelmäßiger BV am Alpenrand, jedoch erst einmal als BV bzw. fütterndes ♀ bei Pfronten beobachtet. (H.) -
Singende ♂ am 25.2.69 Kienberg (Wis.); 27.2.69 1 Ex.b.Schwangau (Wis.); 11.3.69 1 sing.♂ Schwanssee (Wis.); 18.3.69 2 Ex. durch Tonband angel.(18 Uhr 30 Min. - Kitzberg) (Wis.); 9.4.69 1 Ex. durch Tonband angel. am Pilgerschrofen (Wis.); 25.4.69 1 ♀ durch Tonband angel. (15 Uhr), Entfernung ca. 4m.
Verhaltensweise: ruft unentwegt wie "pieps" ... "pieps" ..., ca. 2 Min. - Nach einer kurzen Ruhepause würgte das ♀ vor mir ein Gewölle hervor. (Länge 4 cm; $\emptyset = 0,8$ cm) (Wis.);
4.9.69 1 sing. ♂ an der Fürstenstr. von 9 - 11 Uhr bei vollem Sonnenschein. (Wis.); 24.10.71 1 sing. ♂ am Kitzberg (Wis.).

104. Steinkauz (Athene noctua):

Bisher erst zwei Brutnachweise bei Pfronten und Füssen.
29.5.64 am Stadtrand von Füssen; 1966 bei der Vilstalsäge/Pfronten fütternde Ex. (A.); 11.2.70 1 rufendes ♂ bei Pfronten (Ha.).

105. Waldkauz (Strix aluco):

Häufigste Kauzart. BV und Jahresvogel in ca. 25 Paaren (Wis.).

106. Waldohreule (Asio otus):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel in umliegendem Rand und Feldgehölz. Bisher 6 nachgew. BP (Wis.).

107. Sumpfohreule (Asio flammeus):

18.4.67 1 Ex. b. Helmstedt/Roßhaupten fliegend (Wis.).

108. Rauhfußkauz (Aegolius funereus):

Bisher erst ein Brutnachweis 15.5.67 (Vilser Alp), jedoch über der Landesgrenze. - Singende ♂ auf deutschem Gebiet: 26.5.68 1 Ex. am Säuling (1300 m ü.NN); 9.4.69 1 Ex. Drehhütte bei Schwangau (1350 m ü.NN) (Wis.).

109. Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus):

28.5.67 1 Ex. Weißenseer Moos (Wis.).

110. Mauersegler (Apus apus):

Regelmäßiger BV in Mauernischen und Gebälk.- Ankunft 20.4.-25.4.68. Die Eiablage fand bei einem Paar am 17.6.68 statt; Schlüpfstermin: 12.7.68. Am 1.7.69 fand ich in einem Staren-Nistkasten bereits ein ca. 8 Tage altes Juv. bei Hopfen/a.See (Wis.). Besonderes: Am 18.7.67 wurde ein Juv. von über 20 Ex. mit Futter versorgt. Das Juv. saß in einer Aussparung am Dachfirst eines Wohnhauses, mitten in der Stadt (Wis.).

111. Alpensegler (Apus melba):

Bisher erst zwei Beobachtungen. Am 12.8.65 3 Ex. am Roßberg (1600 m ü.NN) (Wis.); 28.6.71 2 Ex. am Roßberg (ca. 1700 m ü.NN) (Wis.).

112. Eisvogel (Alcedo atthis):

23.5.64

Sehr seltener Brutvogel in 1 - 2 BP. - 1 BP an der Lände Oberer Lech (Wis.). - Als Wintergast tritt der Eisvogel regelmäßig am WS, FS, Halblech und an der Lände Oberer Lech auf.

113. Wiedehopf (Upupa epops):

Regelmäßiger Dz im Frühjahr, jedoch sehr vereinzelt. 15.-20.4.68 1 Ex. Eschacher Moor (Wis.); 1.-14.5.70 insg. 8 Beobachtungen, Alterschrofen, Brunnen, Bannwaldsee u. Hergratsried (W

114. Grünspecht (Picus viridis):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel in mindestens 7 BP (nachgewiesene!) (Horn, Hohenschwangau, Pfronten, Eschach, Rieden, Füssen, Roßhaupten) (Wis.).

115. Grauspecht (Picus canus):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel in 3 - 4 Paaren. 1971 Schwarzenberg, Schwansee-Park, Hornburg (Wis.).

116. Schwarzspecht (Dryocopus martius):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel in angrenzenden Gebirgswäldern. (Mindestens 20 - 25 Paare (Wis.). 1969 am 12.5. Eiablage; 30.5. fütternde Ad.; 28.6. Juv. flügge Schwarzenberg 980 m ü.NN (Wis.).

117. Buntspecht (Dendrocopos major):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel in mind. 30 Paaren. 5.7.67 1 BP bei Heideleibach mit bereits flüggen Juv. (Wis.).

118. Kleinspecht (Dendrocopos minor):

Erst ein Brutnachweis in den Lechauen: - Oberer Lech, 26.6.70 (Wis.).

119. Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos):

Seltener BV in einer Höhenregion v. 900-1000 m ü.NN: 15.7.70 1 Ad. mit flüggen Juv. am Schwarzenberg-Nord (Wis.). 5.4.71 Balzspiel; 11.4. ♀ zimmert an der Nisthöhle; 21.4. Kopula; 10.6. fütternde Ad. (Frauenstein 895 m ü.NN; Brutbaum: Fichte; Nisthöhle ca. 12-14 m Höhe) (Wis.).

120. Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*):
Regelmäßiger BV in 1100-1400 m ü.NN; 12.6.67 Juv. etwa 1-2 Tage alt! Einstein 1100 m ü.NN (Wis.); 30.6.69 flügge Juv. am Schnepflin 950 m ü.NN (Wis.); 15.10.71 1 Ex. am Schwarzenberg; 17.10.71 1 Ex. am Wertacher Horn (Wis.).
121. Wendehals (*Jynx torquilla*):
Bisher erst zwei Beobachtungen: 28.4.69 1 Ex. Alter Friedhof Füßen (Wis.); 26.4.71 1 Ex. bei Brunnen (Dellm.).
122. Heidelerche (*Lullula arborea*):
Erst eine Beobachtung auf dem Herbstzug: 9.10.71 FS 1 Ex. (Schub.-Wis.).
123. Feldlerche (*Alauda arvensis*):
Regelmäßiger und zahlreicher BV im Landkreis. Ankunft im Brutrevier 1.4. (Wis.); 3.5.69 1 Paar bei Brunnen (Nestbau!) (Wis.).
124. Uferschwalbe (*Riparia riparia*):
Im Landkreis noch kein fester Brutnachweis! - 18.5.71 3 Ex. unter ca. 50 Rauchschwalben (*Hirundo rustica*) futtersuchend am FS (Wis.); 6.7.71 2 Ex. Kiesgrube b.Schiggen (Wis.).
Kein Brutnachweis!
125. Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*):
Sehr seltener BV; 13.9.68 Ad. mit Juv. am Falkenstein bei Pfronten (SCHRÖPPEL); 1.7.71 2 Ex. Rote Wand (Pinswang/Tirol) Brutverdacht! (Wis.).
126. Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*):
Regelmäßiger und zahlreicher BV in umliegenden Ortschaften und Höfen. - Ankunft 11.4.69 50 Ex. am O. Lech (Wis.). In den letzten 5 Jahren erkennt man einen merkbaren Rückgang dieser Art.
127. Mehlschwalbe (*Delichon urbica*):
Regelmäßiger BV in Ortschaften, jedoch seltener wie vorige Art; 17.5.68 1.Brut!; 22.7.68 2.Brut! Hopfen am See (Wis.).
128. Schafstelze (*Motacilla flava*):
18.5.68 1 Ex. SaW (Wis.-Dellm.); 13.5.70 2 Ex. FS (Wis.).
129. Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*):
Regelmäßiger und zahlreicher BV am Lech und an umliegenden Seen. Ankunft: 16.3.70; Vollgelege 31.5.70 am KW - Horn (Wis.).
Höchstgelegener Brutnachweis im Kenzengebiet 1400 m ü.NN (29.6.67 durch Wis.).
130. Bachstelze (*Motacilla alba*):
Regelmäßiger und häufiger BV im Gebiet. - Ankunft: 15.3.68; 16.3.69; 15.3.70; 14.3.71 am KW - Horn (Wis.).

131. Baumpieper (Anthus trivialis):

Regelmäßiger BV und Sommervogel in mäßiger Anzahl. 14.5.69
3 singende ♂♂ bei Eschach (Wis.).

132. Wiesenpieper (Anthus pratensis):

Kein Brutnachweis! - 16.4.69 2 Ex. bei Hergartsried; 4.5.70
1 Ex. im Balzflug!; 19.5.71 1 Ex. im Balzflug am SeS (Wis.).

133. Wasserpieper (Anthus spinoletta):

Regelmäßiger BV in Regionen von 1100-1700 m ü.NN - 20.7.68
8 Ex. Jägerhütte (Blöckenau) (Wis.); 1.8.69 16 Ex. Bärenmoos-
alp (Pfronten) (Wis.); 21.10.69 8 Ex. am FS (Wis.).

134. Neuntöter (Lanius collurio):

Regelmäßiger BV in 8 sicheren BP; davon entfallen allein 4
Paare auf 1 ha Fläche. (Lechauen bei Roßhaupten) 30.5.66 (Wis.
31.5.69 waren an dieser Stelle 3/3 noch am Nestbau beschäftigt
(Wis.); 31.5.70 ♀ futtertragend b. Eschach (Wis.); 4.6.70 1/1
am Langenwalder See (Moorwiese) mit Nestjungem! (Wis.).

135. Raubwürger (Lanius excubitor):

Bisher 2 gesicherte Brutnachweise im Jahr 1968 u. 1971 b. Grei
(Wis.); 20.3.67 1 Ex. bei Brunnen; 4.1.68 1 Ex. bei Mühlberg;
10.5.68 Nestfund mit 4 Juv. b. Greit (Wis.); 11.4.69 1 Ex. mit
einer Maus (!) b. Brunnen (Wis.); 24.4.71 2 Ex. b. Greit;
17.5.71 Nestfund mit 5 Juv.! Bannwaldsee - Moor (Wis.);
1973 3 Nestfunde mit Juv.

136. Seidenschwanz (Bombycilla garrulus):

In den Wintern 1964/65 (max. 4 Ex. 3.1.65 - Wis.); 1966/67
(max. 35 Ex. - Wis.); 1967/68 (21 Ex. - Wis.). Alle Beobach-
tungen stammen aus den Lechauen (Wis.).

137. Wasseramsel (Cinclus cinclus):

Regelmäßiger und relativ zahlreicher BV an Flüssen und Gebirgs-
bächen (12 sichere Paare!); Nestbauzeit diff. zwischen 24.3.-
13.4. (Baubeginn!). Die Daten stammen vom Jahr 1962-71 am
AÜW. (Wis.).

138. Zaunkönig (Troglodytes troglodytes):

Regelmäßiger und zahlreicher BV bis in die Höhenlagen um 1400
ü.NN (Wis.); 23.4.70 1 Paar am AÜW (Gelege!) (Wis.).

139. Alpenbraunelle (Prunella collaris):

Bisher noch kein Brutnachweis - jedoch in Höhen v. 1600-1700 m
ü.NN Brutverdacht! ; 31.1.69 3 Ex. Hochalp (Breitenberg) (Wis.
9.7.71 2 Ex. Pfrontener Hütte (Aggenstein) (Wis.).

140. Heckenbraunelle (Prunella modularis):

Mehrzähliger BV in Fichtenschonungen und Randgehölzen einiger
Moore; 4.5.70 2 Ex. an der Pöllat (Neuschwanstein) (Wis.).

141. Feldschwirl (*Locustella fluviatilis*):
4.6.68 1 Ex. Lechauen am Oberlech (Wis.); 1.6.70 1 singendes ♀ am Seeger See. (Wis.).
142. Schilfrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*):
29.5.71 1 singendes ♂ am HW (Wis.). 17.7.72 1 balzfliegendes ♂ am Eschacher Weiher (Schub.).
143. Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*):
8.7.72 2 Ex. "singend" am Seeger See (Schub.).
144. Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*):
Regelmäßiger BV und Sommervogel am BaW; EW; HW; SaW; LaS; WS; HS; - 4.7.71 2 Ad. m. 4 Juv. am BW; 6.7.71 2 Ad. m. Juv. (Wis.).
145. Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*):
Regelmäßiger BV in 5 nachgewiesenen Paaren. BW; LS; WS; SaW; - 21.7.68 Nestfund mit 4 Juv. am BW (Wis.); 17.7.71 2 singende ♂♂ am LaS (Wis.).
146. Gelbspötter (*Hippolais icterina*):
Spärlicher BV und Sommervogel in Nähe menschlicher Ansiedlung. 18.5.71 1 Ex. bei Waltenhofen (Dellm.); 16.5.71 1 Ex. Moor beim Seeger See (Schub.); 18.7.71 1 Ex. Moor bei Weizern-Hopferau, (Schub.).
147. Gartengrasmücke (*Sylvia borin*):
Regelmäßiger BV in der Lechauen und HW - 21.5.70 Nestfund am HW (Wis.).
148. Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*):
Mehrzähliger BV und Sommervogel bis 900 m ü.NN - 18.5.70 2 Ad. mit Juv. bei Mühlberg; 29.6.70 2 Ad. mit flüggen Juv., Schloß Neuschwanstein (Wis.); 16.6.71 Nestfund mit 7 frischgeschlüpf-ten Juv. (Schloß Neuschwanstein) (Wis.).
149. Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*):
Wohl spärlich als BV in den Lechauen und am SaW. 18.7.70 1 ♂ bei Eschach (Wis.).
150. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*):
Mehrzähliger BV und Sommervogel in der Nähe umliegender Weiher. 4.6.71 2/2 mit flüggen Juv. am HW (Wis.).
151. Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*):
Zahlreicher BV und Sommervogel außerhalb vom Stadtgebiet. - 26.5.71 1 singendes ♂ Nähe Jägerhütte 1450 m ü.NN (Wis.).
152. Fitis (*Phylloscopus trochilus*):
Zahlreicher BV und Sommervogel im ganzen Landbezirk.- 31.5.69 Nestfund bei Roßhaupten (Wis.); 29.4.71 1 Ex. b. Eschach (Wis.).

153. Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli):
Zahlreicher BV und Sommervogel in umliegenden Moorwiesen.
154. Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix):
Regelmäßiger BV und Sommervogel in spärlicher Anzahl.- 16.4.70
2 Ex. bei Hergratsried (Wis.); 17.5.70 1 Ex. am Attlesee (Wis.)
155. Wintergoldhähnchen (Regulus regulus):
Zahlreicher BV und Jahresvogel in Fichtenbeständen außerhalb
des Stadtgebiets.- 8.5.70 2 ♂♂/ 1 ♀ bei Agresivverhalt um das
♀ beobachtet (Roßhaupten); 19.4.71 1/1 beim Balzspiel beob.;
21.4.71 gleiches Paar baut ihr Nest mit Watte aus. (Wis.).
156. Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus):
Spärlicher BV in kleinen Fichtenbeständen.- 14.5.68 2 Ex. Nähe
Illasbergsee (Wis.).
157. Grauschnäpper (Muscicapa striata):
Spärlicher BV und Sommervogel umliegender Seen und Weiher.-
22.5.70 1 Paar mit Juv. am BaW (Wis.); 15.5.71 brütendes ♀ in
einer Birke (Wis.); 28.6.71 gleiches BP hat bereits flügge Juv
Eschacher Moor (Wis.).
158. Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca):
Regelmäßiger BV in mäßiger Anzahl. Gesicherte Brutnachweise
bei Pfronten, Brunnen, Eschach und Hohenschwangau. 2.6.68 1 ♀
brütend bei Pfronten, am Dachfirst eines Wohnhauses (Wis.).
159. Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis):
Erst eine Beobachtung eines ♂ am 13.4.65 am Lechufer nahe AÜW
(Wis.).
160. Zwergschnäpper (Ficedula parva):
Regelmäßiger BV und Sommervogel in spärlicher Anzahl.- 20.9.69
1 Ex. nahe Schloß Neuschwanstein (Schub.); 1969 angebl. Brut-
nachweis von Dr.LÖHRL - nahe Schloß Neuschwanstein; 22.6.71
1/1 beim Balzspiel im Säulinggebiet 1330 m ü.NN beobachtet (Wi)
161. Braunkehlchen (Saxicola rubetra):
Regelmäßiger BV und Sommervogel in spärlicher Anzahl.- 10.5.70
1 ♂ Eschacher Moor; 25.4.71 1/1 bei Brunnen; 25.4.71 1/1 bei
Hergratsried; 25.4.71 1/1 bei Mühlberg (Wis.); 9.5.72 1/1
Bannwaldsee-Moor; 25.6.72 1/1 Lobach-See "warnend" (Wis.).
162. Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus):
Regelmäßiger BV und Sommervogel in Gartenhäusern und Scheunen.
12.5.70 Nestfund mit Juv. bei Roßhaupten (Wis.).
163. Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros):
Regelmäßiger BV und Sommervogel in Gebäuden aller Art.- An-
kunft 28.3.70 am Brutort (AÜW), 1. Brut 10.5., 2. Brut 30.6.70
im Gebäude v.AÜW (Wis.).

164. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*):
Erst eine Beobachtung durch Dellm. bei Waltenhofen 1 singendes ♂ am 1.5.71.
165. Blaukehlchen (*Luscinia svecica*):
Erst einen Nachweis von 2 Ex. auf dem Durchzug 12.4.67 am HS (Wis.).
166. Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*):
Regelmäßiger und zahlreicher BV und Jahresvogel bis 900 m ü.NN 19.6.71 Nestfund bei Faulenbach, unter einer Baumwurzel (Wis.).
167. Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*):
Bisher noch kein Brutnachweis! - Einzelbeobachtungen: 16.4.68 2 Ex. Vogelberg/Brunnen; 22.4.70 3/1 Ex. bei Greit; 4.5.70 4/4 Ex. bei Rieden; 26.8.71 1 ♀ bei Illasberg (Wis.).
168. Steinrötel (*Monticola saxatilis*):
Bis 1964 noch nachgewiesener BV am Roßberg 1400 m ü.NN (Zw.). Seit dieser Zeit konnte ich diese Art nur einmal an gleicher Stelle sicher nachweisen! - 14.5.67 1 singendes ♂ auf einer Fichtenkrone (Wis.); weitere Beobachtungen blieben ohne Erfolg! Es ist jedoch möglich, daß sich noch mind. 1 Paar am sogenannten "Vinzenzbrunnen" (Roßberg) nachweisen läßt (Extreme Kletterei erforderlich!) (Wis.); 19.6.71 1 ♀ bei Pfronten (Schub.).
169. Misteldrossel (*Turdus viscivorus*):
Regelmäßiger BV in mäßiger Anzahl. 4.5.70 Nestfund mit 3 Eiern bei Seeg (Wis.).
170. Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*):
Regelmäßiger und sehr häufiger BV in allen Randhölzern von sumpfigen Wiesen. Extremer Brutnachweis am 28.7.71: 1 ♀ auf Vollgelege; die Juv. wurden erst um den 20.8.71 flügge! SchaS (Wis.)!
171. Singdrossel (*Turdus philomelos*):
Mäßiger BV in 10 - 15 jährigen Fichtenbeständen, nahe offenen Wiesen.
172. Rotdrossel (*Turdus iliacus*):
Vereinzelte Nachweise in den Wintermonaten. - 20.12.68 1 Ex. beim WS (Ha.); 17.10.71 3 Ex. Horner Bucht FS (Wis. u. Schub.); 14.4.72 1 Ex. Illasberg FS (Wis.).
173. Ringdrossel (*Turdus torquatus alpestris*):
Verbreiteter BV im Alpengebiet ab 1000 1400 m ü.NN - 22.4.70 3 Ex. bei Hergratsried; 2.5.70 14 Ex. bei Mühlberg; 4.5.70 42 Ex. bei Brunnen; 19.6.71 Nestfund mit Juv. nahe Bärenmoosalp/Pfronten 1000 m ü.NN in einer Fichte (Wis.).
174. Amsel (*Turdus merula*):
Zahlreicher BV und Jahresvogel überall im Gebiet. (Wis.).

175. Schwanzmeise (Aegithalos caudatus):
Regelmäßiger BV und Jahresvogel in den Lechauen.- 18.5.71
2 Nestfunde am Oberen Lech (Lechau) mit je mind. 8-10 Juv.
(Wis.); 25.6.71 21 Ex. bei Roßhaupten (Wis.).
176. Haubenmeise (Parus cristatus):
Mäßiger BV und Jahresvogel in Kiefer- und Fichtenbeständen.
7.5.69 2 Ex. beim Nestbau! Illasberg/Roßhaupten (Wis.).
177. Sumpfmeise (Parus palustris):
Mehrzähliger BV und Jahresvogel in den Lechauen und Zwerg-
kiefernbeständen. 22.5.71 1/1Ad. füttern Juv. bei Faulenbach
(Wis.).
178. Weidenmeise (Parus montanus):
Mäßiger BV und Jahresvogel nahe von Uferzonen. 25.4.64 Nest-
fund am Faulensee/Rieden (Wis.); 6.5.71 Nestfund am Ober-Lech
in einer faulen Birke (Wis.).
179. Blaumeise (Parus caeruleus):
Mäßiger BV und Jahresvogel überall im Gebiet. 19.6.70 Nest-
fund an der Lände (Wis.); 15.5.71 Nestfund - brütendes ♀ in
einer Birke (Wis.); 22.5.71 gleiches Paar hatte frischgeschl.
Juv. (Weissensee-Moos) (Wis.).
180. Kohlmeise (Parus major):
Zahlreicher BV und Jahresvogel überall im Gebiet. 8.5.68
Nestfund in einem Jaucherohr! (Wis.).
181. Tannenmeise (Parus ater):
In Höhenlagen ab 850 - 1650 m ü.NN überall anzutreffen, als
BV und Jahresvogel.
182. Kleiber (Sitta europaea):
Zahlreicher BV und Jahresvogel in Parkgelände und Nadelholz-
wäldern bis 1300 m ü.NN nachgewiesen. 27.5.71 1/1 Ad. mit
7 Juv. in einem angelegten Nistkasten. 16.6.71 1/1 Ad. füttert
Juv. in einer zugemauerten Schwarzspechthöhle am Kitzberg
1000 m ü.NN (Wis.).
183. Mauerläufer (Tichodroma muraria):
Verbreiteter BV und Jahresvogel in Höhen von 800-1950 m ü.NN
(Gabelschrofen, Geiselstein, Säuling, Roßberg, Rote Wand, Hoc-
platte, Schloß Neuschwanstein); 14.6.71 1 Paar am Gabelschrof
(Wis.); 16.6.67 1 Paar mit Juv. am Schloß Neuschwanstein (Wis.)
7.7.69 1 Paar am Schloß Neuschwanstein mit bereits flüggen Ju
Wis.).
184. Waldbaumläufer (Certhia familiaris):
Zahlreicher BV in Baumgärten und Gebirgswäldern bis 1500m ü
(Tegelberg); 20.5.67 Nestfund in einer Baumgabelung (Höhle)
bei Heidelbuch (Wis.).

185. Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*):
Mäßiger BV und Jahresvogel in Baumgärten und Parkanlagen. -
14.6.69 2 Ex. Parkanlage Kreiskrankenhaus Füssen, auf Nah-
rungssuche (Wis.).
186. Goldammer (*Emberiza citrinella*):
Zahlreicher, im Gebiet stark verbreiteter BV und Jahresvogel.
Besonders stark vertreten im Bannwaldsee-Moor.- 22.12.70
38 Ex. an einer Vogel-Futterstelle im Stadtgebiet (Wis.).
187. Zippammer (*Emberiza cia*):
Erst ein Nachweis als Dz. im Stadtgebiet: 28.8.69 3 Ex. im
Alten Friedhof Füssen (Wis.).
188. Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*):
BV an Uferzonen in ca. 15 Paaren.- 23.5.68 Nestfund am EW (Wis.);
am 17.6.68 wurden die Juv. flügge! (Wis.); 5.4.71 1/1 am BaW
(Wis.); 18.5.71 1/1 füttert Juv. am EW (Wis.).
189. Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*):
Erst einen Nachweis als Dz durch Schub.-Hackel am FS 14.11.71.
190. Buchfink (*Fringilla coelebs*):
Zahlreicher BV und Jahresvogel überall im Gebiet.
191. Bergfink (*Fringilla montifringilla*):
Regelmäßiger WG in großer Anzahl: Mitte Nov. - Ende März.-
12.1.69 ca. 150 Ex. am Baumgarten (Wis.); Extremdaten: 14.11.71
ca. 500 Ex. über dem FS (Schub.-Hackel).
192. Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*):
Mäßiger BV in Regionen ab 1200-1500 m ü.NN .- 14.5.70 2-3
Paare an der Jägerhütte (Blöckenau) (Wis.); weitere Nachweise
an der Bärenmoosalp/Pfronten u. Saloberalp (Wis.).
193. Girlitz (*Serinus serinus*):
Spärlicher BV und Sommervogel in Baumgärten und Friedhöfen.
17.4.70 1/1 Ex. bei Mühlberg; 25.6.72 1 "singendes" ♂ bei
Nesselmann; 8.7.72 1 "singendes" ♂ bei Schweinegg (Schub.).
194. Grünling (*Carduelis chloris*):
Zahlreicher, überall im Gebiet verbreiteter BV und Jahresvogel.-
21.6.69 1/1 Ad. füttert Juv. (Alter Friedhof) (Wis.); 17.7.71
1/1 Ad. mit flüggen Juv. am LaS (Wis.).
195. Stieglitz (*Carduelis carduelis*):
Mäßiger BV in ortsnahen Obstgärten (Apfelbäume); 17.6.69
Nestfund mit 5 Juv. im Stadtgebiet (Wis.).
196. Zeisig (*Carduelis spinus*):
Noch kein Brutnachweis! Jedoch dürfte diese Art vereinzelt

bei uns brüten.- 22.6.71 1/1 am Grenzhaus "Vilstal"/Pfronten (Wis.).

197. Birkenzeisig (Carduelis flammea):

Die ersten Nachweise als BV stammen von 1971! (Wis.); 21.5.71 1/1 Ad. macht Balzflüge mit darauffolgender Kopula! (Moor am SeS) (Wis.); 18.6.71 1/1 Ad. mit 6 Juv. - bereits flügge SeS (Wis.); 28.6.71 1/1 Ad. mit flüggen Juv. im Eschacher Moor (W:

198. Hänfling (Carduelis cannabina):

Mäßiger BV in Gartenanlagen und Hecken offener Gelände.- 10.5.67 Nestfund in Beerengesträuch mitten im Stadtgebiet (Wis.); 14.11.71 14 Ex. im Flug über den FS (Schub.-Hackel).

199. Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra):

Nachgewiesener BV aus dem Jahr 1960.- 15.12.60 Nestfund in einer gefällten Tanne am Tegelberg ca. 1450 m ü.NN; 14.4.64 30 Ex. Eschacher Moos, auf Kiefern (Wis.); 8.6.66 12 Ex. am Kienberg 900 m ü.NN (Wis.); 28.6.71 1/1 Ad. mit 2 Juv. am Tegelberg 1640 m ü.NN (Wis.); 14.9.71 2/2 Ex. am Breitenberg/Pfronten (Wis.); 28.11.71 1/1 Ad. macht Balzflüge - ♂ mit Gesangseinlagen, am Tegelberg (Wis.).

200. Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes):

Spärlicher BV im Gebiet.- 4.5.67 1 ♂ bei Roßhaupten (Wis.); 15.3.70 3 Ex. am Baumgarten (Wis.-Dellm.); 22./23./24.6.71 1/1 Ad. am Grenzhaus "Vilstal"/Pfronten. (Starker Brutverdacht (Wis.).

201. Gimpel (Pyrrhula pyrrhula):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel, zahlreich. Hauptsächlich in Gärten, Hecken und Fichtenbeständen.

202. Schneefink (Montifringilla nivalis):

Erst ein Nachweis vom Breitenberg-Hochalpe/Pfronten in ca. 1600 m ü.NN mit 2 Ex. 18.8.69 (Wis.).

203. Haussperling (Passer domesticus):

Zahlreicher BV und Jahresvogel in menschl. Ansiedlungen.- Höchste Gel. Brutplatz am Tegelberghaus 1680 m ü.NN.

204. Feldsperling (Passer montanus):

Zahlreicher BV, überall im Gebiet verbreitet.- 15.5.69 Nestfund am LW (Scheune) - (Wis.).

205. Rosenstar (Sturnus roseus):

Erst ein Nachweis als Dz oder Irrgast, am 21.4.65 1 Ex. unter ca. 30 Staren (Sturnus vulgaris) ! am Stadtrand von Füssen (Wis.).

206. Star (Sturnus vulgaris):

Sehr zahlreicher BV im Gebiet. (Naturhöhlen und aufgehängte

Nistkästen). Extremdaten: 3.3.70 26 Ex. bei Füßen (Wis.); In den Herbstmonaten versammeln sich im Schilfbestand von HS, SeS und WS allabendlich bis 10 000 Ex. ; maxim. am HS ca. bis 5000 Ex. (5.10.71) (Wis.).

207. Pirol (Oriolus oriolus):

Vereinzelte als Dz nachgewiesen.- 20.9.69 1 ♀ am SchaS (Dellm.); 26.5.71 1 singendes ♂ am Schwansee-Park (Wis.).

208. Eichelhäher (Garrulus glandarius):

Zahlreicher BV und Jahresvogel in Nadelholzbeständen.- 23.6.71 1/1 Ad. mit Juv. bei Pfronten (Wis.).

209. Elster (Pica pica):

Mehrzähliger BV und Jahresvogel in Feldgehölz und in der Nähe von Schuttplätzen.- 2.7.68 Nestfund mit fast flüggen Juv. bei Horn (Wis.).

210. Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel von 800 - 1300 m ü.NN. - Bisher 6 sichere Brutnachweise (Wis.); 30.4.66 Nestfund am Enzensberg/Hopfen a.See (Wis.).

211. Alpendohle (Pyrrhocorax graculus):

Regelmäßiger BV und Jahresvogel im Hochgebirge.- 30.3.69 32 Ex. am Tegelberghaus; 20.6.68 Horstfund am Aggenstein mit 3 Juv. (Fels) (Wis.); 9.7.71 4 Ad. mit 6 Juv. am Roßberg (Wis.).

212. Dohle (Corvus monedula):

Nach Schub. sollten 1969 noch 2 Ex. an der Kolomanskirche bei Schwangau gesichtet worden sein.

213. Saatkrähe (Corvus frugilegus):

Erst einen Nachweis vom 10.4.67: 26 Ex. am Schuttplatz bei Roßhaupten auf dem Feld (Wis.).

214. Aaskrähe (Corvus corone):

Zahlreicher BV und Jahresvogel überall im Gebiet verbreitet.- Hauptsächlich am Randgehölz von Schutthalden.

215. Kolkrabe (Corvus corax):

Regelmäßiger BV in 10 - 12 Paaren und Jahresvogel im Gebiet: Vilstal, Achtal, Weissensee, Rote Wand, Tegelberg, Hopfen, AÜW; 15.4.68 Nestfund am Salober/Weissensee (Wis.); 15.3.70 1/1 Ad. am Nestbau (Baumhorst) beschäftigt (Wis.) Enzensberg/Hopfen.

Irrgäste:

216. Streifengans:

27.4.73 1 Ex. ♂ am Forggensee (entflogen vom Max-Planck-Institut, Seewiesen (Wis.).


217. Mandarinente: (Zooflüchtling?)

19.10.73 2 Ex. an der Ach bei Pfronten (Wis.).

(Das Manuskript wurde vom Verfasser am 31.12.1971 abgeschlossen;
Ergänzungen erfolgten am 2.11.1973; weitere Nachträge wichtiger
Beobachtungen sind vorgesehen.)

Anschrift des Verfassers:

Richard WISMATH
Klosterstraße 6
D 8958 Füssen



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [21_1](#)

Autor(en)/Author(s): Wismath Richard

Artikel/Article: [Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen, 2.Teil. 17-28](#)