© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten
Jahrgang 28 - Folge 1/2: 37 - 61
(April 1988) - ISSN 0344 - 5054



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu

- Beobachtungen 1986 -

Von Dietmar WALTER, Börwang

In dieser Zusammenstellung, die im wesentlichen den Landkreis Oberallgäu berücksichtigt, wurden wieder alle seltenen Brutvögel, alle Durchzügler sowie Ankunfts- und Abzugsdaten trivialer Arten für das Jahr 1986 aufgenommen. Für die freundliche Überlassung ihrer Beobachtungsnotizen danke ich allen Feldornithologen des ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES OBERALLGÄU, die es mir somit ermöglichten, diese Jahresbilanz zu erstellen.

Einige Vogelarten wurden - im Vergleich zu den Vorjahren - in diesem Beobachtungsjahr auffallend selten gemeldet: So z.B. Krickente, Schnatterente, Wachtel und Grauspecht! Ob dies nur auf zufälligen Beobachtungslücken basiert oder aber tatsächliche Fluktuationen widerspiegelt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Demgegenüber sind vom Eisvogel - trotz der vorangegangenen strengen Winter - erfreulicherweise viele Meldungen eingegangen!

Leider ist unser Kenntnisstand über eine ganze Reihe relativ häufig vorkommender Brutvögel noch gering, was ihre Höhenverbrei-

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

tung oder auch ihr Eindringen in die Alpentäler betrifft: Diesbezügliche Angaben wären z.B. von unseren Rohrsängern, Meisen, Ammern und vielen Finken-Arten sehr erwünscht! Im Gegenzug dazu natürlich ebenso die tiefsten Brutvorkommen bzw. die nördlichsten Verbreitungsareale unserer montanen und alpinen Arten!

Viele dieser angesprochenen Vogelarten sind auch für einen Laien ohne weiteres bestimmbar und somit zu erfassen: so z.B. Mauersegler, Rauch- und Mehlschwalbe, Kohl- und Blaumeise, Grünfink und Stieglitz, Haus- und Feldsperling. Bitte helfen Sie mit unser Wissen über diese Arten zu verbessern, indem Sie diese in den genannten Grenzbereichen (Höhen- und Nord-Süd-Verbreitung) als Brutvogel oder revieranzeigendes Exemplar (z.B. singend) notieren und uns melden.

Von einigen Vogelarten sind in nächster Zukunft Brutnachweise zu erwarten bzw. schon überfällig: Dazu gehören z.B. Schwarzhalstaucher, Flußregenpfeifer, Zwergschnäpper, Schwarzkehlchen, Zippammer und Karmingimpel. Es würde sich vielleicht lohnen, gezielt in den jeweiligen in Frage kommenden Biotopen nach diesen Arten zu fahnden!

Was den Vogelzug - genauer, den Herbstzug - im Oberallgäu betrifft, so hat sich gezeigt, daß dieser keineswegs so unbedeutend ist wie zunächst angenommen. (Siehe "Avifaun. Kurzmitt. a.d. Oberallgäu - Beobachtungen 1985" in Mitt. Naturwiss. Arbeitskreis Kempten, Jahrgang 27 - Folge 2: 60). Gezielte Beobachtungen zeigten, daß sowohl quantitativ als auch qualitativ bemerkenswerte Anzahlen und Arten, vor allem auf der Route Grünten ⟶ Großer Alpsee gegen Westen ziehen. Dieses, zumindest regional nicht unbedeutende Zuggeschehen, zeigte sich z.B. bei Greifvögeln, Störchen, Kormoran, Ringeltaube, Lerchen, Piepern und Buchfink. (Siehe hierzu in der folgenden Artenliste). Leider stehen uns für diesbezügliche systematische Forschungen keine Beobachter zur Verfügung, sodaß es wohl immer nur sporadische "Einzelaufnahmen" bleiben werden. Aber auch in diesem Falle könnten sowohl ornithologische Laien als auch "Fortgeschrittene" einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie etwa in den Monaten September bis November auf Bergen wie Grünten, Rottachberg, Hauchenberg, Salmaserhöhe, Piesenkopf usw. für einige Stunden die vorbeiziehenden Vogelarten möglichst <u>quantitativ</u> erfassen. Dabei bliebe es dem einzelnen überlassen, ob er sich nur

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

auf eine oder wenige leicht erkennbare Arten beschränkt oder auch schwieriger zu bestimmende Arten mit zu erfassen versucht.

Folgende Abkürzungen wurden verwndet:

Beobachter: (in Klammern gesetzt)				
	FA	FARKASCHOVSKY, H.	MU	MUTH, M.
	FE	FEURER, A.	PU	PUDIMAT, K.
	HE	HEINLE, R.	SA	STADELMANN, H.
	HF	HAFNER, A.	SC	SCHÜSSEL, F.K.
	HZ	HERZ, H.	ST	STEINHÜBL, G.
	KG	KRIEGL, J.M.	WA	WALTER, D.
	KR	KRETLOW, G.	WI	WINKLER, S.
	KU	KUTSCHERA, A.		

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
Herr	Herrenwieser ...
I/...	Iller/ mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) bei Niedersonthofen
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
max	maximale Zahl aller Jahresbeobachtungen
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
OAL	Landkreis Ostallgäu
P	Paar(e)
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenrieder ...
Schwab	Schwabelsberger
Schwarz	Schwarzenberger
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdensteiner
Widd	Widdumer
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Normalnull.

© Volkshochschule Kaufbeuren, download unter www.biologiezentrum.at

Prachttaucher (Gavia arctica)

1 Ex 8.11. Grüntensee (WA)

Sterntaucher (Gavia stellata)

2 Ex 15.11. Grüntensee (PU)

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

insgesamt 10 ad mit 13 juv 19.8. Ins See (PU)
1 P mit 3 juv 14.9. Oberer Ins See (PU)
8 P mit 11 juv 14.9. Nied See (PU)
(Die Insel-Seen sind mit dem Niedersonthofener See verbunden (WA)
2 P mit je 1 juv 14.9. Gr. Alpsee (PU)
1 ad mit 1 juv 14.9. Kl. Alpsee (PU)
36 Ex 8.11., 27 Ex 20.11., 17 Ex 27.11., 2 Ex 30.12. Nied See (WA)
20 Ex 8.11., 18 Ex 27.11. Ins See (WA)
13 Ex 8.11., 10 Ex 15.11., 2 Ex 30.12. Gr. Alpsee (SA,WA)
5 Ex 8.11. Kl. Alpsee (WA)
40 Ex 9.11., 36 Ex 13.11., 44 Ex 15.11., 42 Ex 20.11., 27 Ex 23.11., 43 Ex 25.11., 41 Ex 27.11., 21 Ex 31.12. Öschle See (KR,SA,WA)
23 Ex 8.11. Grüntensee (WA)

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

insgesamt führen 14 ad (7 P?) 14 juv 31.7. Trollweiher/Seeg-NO (OAL) (H. u. B. STARK)
2 Ex 12.5. Grüntensee (PU)
1 Ex 13.11. Öschlesee (WA)

Zwergtaucher (Podiceps ruficollis)

3 erfolgreiche Bruten Schwab W (MU)
1 erfolgreiche Brut Herr W (MU)
2 BP Manzen W (FE)
1 ad mit 1 juv 24.8. I/Kalden (MU,SA)
1 Brut (2 juv 7.9.) Konstanzer Ach/ Ratholz (HE)
2 ♂ balzen Juni Schwarz W (KR)
5-6 Ex von Jan-März und Nov.,Dez. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km)(KU)
2-5 Ex von Jan-März I/KE - Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)
10 Ex 30.12. I/KE-Hegge → Nordbrücke (6 km) (WA)
8 Ex(max) 21.10. I/Alt (FA)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

1 Ex (Brutkleid, kontinentale Rasse) 16.3., 1 Ex 31.3., 1 Ex (Brutkleid, kontinentale Rasse) und 1 juv 14.4. I/Kalden (MU,SA,WI)
1 Ex 7.4. I/Alt (FE)
28 Ex 19.4., 2 Ex 23.10., 2 Ex 24.12. Nied See (KR,PU)
1 juv 22.4.Baggersee Eggen (SA)
1 Ex 6.9., 1 immat 20.11. Öschle See (SA,WA)
1 Ex 8. und 30.11. und 21.12. Gr. Alpsee (HE,PU)
Es ziehen nach W:
1 Ex 12.9. Hauchenberg (MU)
14 Ex 5. und 13.10., 5 Ex 27.10., 1 Ex 31.10., Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)

Graureiher (Ardea cinerea)

11 besetzte Horste 9.6. Nied See-N (PU)
10 besetzte Horste 22.6. Oberstaufen/Sinswang (PU)
mind 4 besetzte Horste Juni Haldenwang-W (WA)

© Volkshochschule Villach, download unter www.biologiezentrum.at

mind 4-5 besetzte Horste Juni Krugzell-W (WA)
mind 4 besetzte Horste 17.6. Jungholz-W (PU,SA)
4 besetzte Horste mit 10 juv Baggersee Sf-W (KG)
1 Brut (4 flügge juv) Rottachmoos (W. NITSCHE,SA)
Kolonie Alt verlassen (FA)
Dies sind mind 38-39 besetzte Horste für das Jahr 1986 (WA)
14 Ex (max) 20.9. I/Alt (FE)

Seidenreiher (Ergretta garzetta)

1 Ex 22.4. I/Alt (WI)

Weißstorch (Ciconia ciconia)

1 Ex 26.3., 3 Ex 11.-16.6., 2 Ex 7.9. I/Alt (FE,WI)
4 immat 25.4. Widd W (SA)
4 Ex 5.5. Ahegg (MU)
5 Ex vom 16.5. bis 28.6., 10 Ex 29.6. Burgratz (Ottacker-NW) (M.BREUNIG, KR,PU,SA)
1 Ex 4.6. Betz M (WA)
3 Ex 18.6., 4 Ex 19.6., 5 Ex 23. und 28.6. Krug (S.BÖNSCH,WA,WI)
1 Ex 29.6. Frohnschwenden (Wildpoldsried-NO) (HARTMANN)
3 Ex ziehend nach WSW 13.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

1 Ex 19.6. Krug-W (WA)
2mal je 1 Ex ziehend nach WSW (jeweils unter Bussarden) 5.9. Salmaser Höhe (MU)

Höckerschwan (Cygnus olor)

1 P mit 5 juv 25.6. KE-Schwab W (R.DREHER, MU)
1 Brut (3 juv) KE-Steufzger W (HF,MU)
1 Brut (4 juv) KE-Stadt W (HF,MU)
1 erfolgreiche Brut W in KE-Thingers (MU)
1 Brut (3 juv) Leubas/Gräbelesmühle (HF)
1 Brut (1 juv) Bachtel W (HF)
1 BP Manzen W (FE)
1 erfolgreiche Brut I/Kalden (MU)
1 Brutversuch I/Alt (FA)
1 Brutversuch I/Altwasser-Lauben (HF)
1 Brutversuch Notzen W (HF)
1 BP Nied See (WA)
93 Ex 2.2., 62 Ex 9.2., 50 Ex 7.4., 56 Ex 15.11., 58 Ex 24.11. I/Alt (FA,FE,HZ)
43 Ex 18.11., 77 Ex 12.12. I/Kalden (HZ)
47 Ex 11.2. I/KE-Riederau → Hirschdorf (2 km) (HF)
42 Ex (max) 3.1. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)
27 Ex 5.1. I/KE-Hegge (KU)

Graugans (Anser anser)

22 Ex (größtenteils beringt) vom 3.1. bis 20.2. I/KE-St.MangBrücke (WA)
12 Ex 2.3. I/Alt (FE)
2 Ex 14.4. I/Kalden (SA)

Pfeifente (Anas penelope)

2 "♀" 5.1. Nied See (PU)
1 P 10.4., 1♀ 13.12. Ins See (PU)
5 Ex (Ruhekleid) 5.11. Grüntensee (PU)
2♀ 15.11. und 12.12. I/Alt (FE,FA,HZ)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

Schnatterente (Anas strepera)

2 P 14. und 16.3.I/Kalden (MU,SA)
1 Ex 7.9. I/Alt (MU)

Krickente (Anas crecca)

mind 1 Brut (1♀ mit 8 juv 15.7.) Walt M (FA,PU)
950 Ex 8.3., 1051 Ex 15.3. I/Alt (FA,FE)
12 Ex 30.12. I/KE-Hegge (WA)

Stockente (Anas platyrhynchos)

1♀ mit 8 juv 8.8. Kalbelesee (1650 m!) Widderstein-S (Österreich)(MU)
4-7 BP Betz M (WA)
1♀ mit 6 juv 25.6.KE-Schwab W (R. DREHER)
1♀ mit 5 juv 7.7. KE-Stadt W (MU)
1♀ mit 5 juv 10.8. I/KE (KU)
2♀ mit je 5 und 6 juv 5.7. Herr W (MU)
1♀ mit 3 juv (ca 1 Woche alt) 20.6., 1♀ mit 9 juv 12.7., 1♀ mit 4 juv (Dunen) 28.7. Esch W (HZ,WA)
1♀ mit 8 juv 29.6. I/Fischen (WA)
1 brütendes ♀ 16.5. Walt M (MU)
1♀ mit 10 juv 28.6., 1 Ex (schwarzer Bastard) 20.1. Blaichach,
1 ebensolches Ex 16.11. Gr. Alpsee (HE)
1200 Ex 15.3., 1600 Ex 13.11., 1400 Ex 15.11., 1600 Ex 13.12., 1200 Ex 31.12. I/Alt (FE)
117 Ex 5.1., 133 Ex 21.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km) (KU)
529 Ex 30.1., 349 Ex 30.12. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km)(WA)
469 Ex 30.12. I/KE-Hegge → Nordbrücke (6 km) (WA)
47♂ 36♀ 11.2. I/KE-Riederau → Hirschdorf (2km) (HF)
50 Ex 19.2. I/Lauben (HF)
70-80 Ex 6.8. KE-Schwab W (R. DREHER)
261 Ex 30.12. Unterer Ins See (WA)
147 Ex 30.12. Gr. Alpsee (WA)

Spießente (Anas acuta)

1♂ 20.1., 2 Ex 8.3., 1♀ 21.10., 2♀ 12.12. I/AIt (FA,FE,HZ,MU.WI)
2♂ 1♀ 14.4., 2 Ex 12.12. I/Kalden (HZ,SA)

Knäkente (Anas querquedula)

2♂ 7.4. I/Alt (FE)

Löffelente (Anas clypeata)

1♂ 1.4. KE-Schwab W (MU)
1 P 19.4., 3♂ 20.4. Teufelssee (HE,PU)
1♀ 15.11. Nied See (PU)

Kolbenente (Netta rufina)

1♂ 5.1. I/KE-S (KU)
2♂ 1♀ 12.10. Grüntensee (PU)
2♂ (juv oder Schlichtkleid) 28.11. KE-Stadt W (WA)

Tafelente (Aythya ferina)

Für 1986 ging kein Brutnachweis ein ! (WA)
1597 Ex (max) 12.12. I/Alt (FA,HZ)
350 Ex 19.2. I/Lauben → Hinwang (1,5 km) (HF)
170♂ 100♀ 11.2. I/KE-Riederau → Hirschdorf (2 km) (HF)

© Volkshochschule Klagenfurt; download unter www.biologiezentrum.at

43 Ex 16.2., 24♂ 22♀ 30.12. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km) (KU,WA)
25♂ 5♀ 30.1. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km) (WA)
99 Ex 8.11. Grüntensee (WA)
8♂ 8♀ 27.11. Öschlesee (WA)

Moorente (Aythya nyroca)

3♂ 20.1. I/Alt (WI)
1♀ 8.2. I/KE-Hegge (PU)
2♀ 16.2., 1♀ 16.3., 1 Ex 8.11., 1♀ 15.11. Ins See (PU,SC,WA)
1 Ex 8.11. Nied See (WA)

Reiherente (Aythya fuligula)

1♀ mit 6 juv 25.6. KE/Schwab W (R.DREHER)
2♀ mit je 2 juv 19.8. Herr W (MU)
1♀ mit 7 juv 6.8. Widd W (SA)
Im Vergleich zu den Vorjahren sind dies extrem wenig Reiherenten-Bruten ! (WA)
1 Ex albinotisch:
Flanken rein weiß, Brust und Rücken hell sandfarben, Kopf etwas dunkler als Brust und Rücken; insgesamt wirkte die Ente hell-ockerfarben 30.12. I/KE-Georgsinsel (WA)
1609 Ex 2.2., 1050 Ex 15.3., 1110 Ex 12.12. I/Alt (FA,FE,HZ)
383 Ex 16.3. I/Kalden (MU,SA)
200 Ex 19.2. I/Lauben → Hinwang (1,5 km) (HF)
110♂ 50♀ 11.2. I/KE-Riederau → Hirschdorf (2 km) (HF)
206 Ex 16.2., 125 Ex 2.3., 119 Ex 23.3. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km) (KU)
122 Ex 30.1., 92♂ 53♀ 30.12. I/KE-Südbrücken → Nordbrücke (3 km)(WA)
105♂ 59♀ 30.12. I/KE-Hegge → Nordbrücke (6 km) (WA)
108 Ex 8.11., 107 Ex 30.12. Gr. Alpsee (WA)
45 Ex 8.11. Kl. Alpsee (WA)

Bergente (Aythya marila)

1 P 1.3. Weidachsee/Blaichach (HE)
1♂ 9.4. Widd W (SA)

Eiderente (Somateria mollissima)

1♀ 24. - 31.12. Gr. Alpsee (PU)

Samtente (Melanitta fusca)

bis zu ca 30 "♀" 1. - 5.1., 1♀ 12.1., 1♂ 22.1. Gr. Alpsee (HE,PU)
1♀ 12.1. Nied See (PU)
1♀ 3.12. Grüntensee (HE)

Schellente (Bucephala clangula)

1♂ 5♀ 6.1. I/Krug-W (PU)
2♀ 22.1. Gr. Alpsee (HE)
4 Ex 9.2., 2♂ 12.2., 3 Ex 2. und 15.3., 2 Ex 13.12., 1 Ex 31.12. I/Alt (FA,FE,HZ)
1♀ 22.2. Baggersee Blaichach-S (KG)
9♂ 8♀ 6.3., 31 Ex16.3., 2♂ 21.10., 4♂ 2♀ 18.11. I/Kalden (HZ,MU,SA,WI)
2♂ 3♀ 31.3. Ins See (PU)
1 P 24.12. Kl. Alpsee (HE)
1♂ 30.12. Nied See (WA)
1 juv ♂ 30.12. I/KE-S (WA)
1♀ 16.2., 2♀ 2.3. I/KE-S (KU)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Gänsesäger (Mergus merganser)

9 - 11 beobachtete Schofe im Oberallgäu auf der Iller (z.B. 2♀ mit je 8 pulli am 29.6. auf 40 Fluß-km), Breitach, Weiler Ach und Rottach. (FA,FE,HZ,KG,KR,KU,MU,PU, W.SCHREIBER, ST, H.STARK,WA)
Der Brutzeitraum streut wieder stark: So z.B. 3 führende ♀ mit je 6,7 und 8 juv am 3.5. auf der Iller, aber auch noch 1♀ mit 9 juv (2-3 Tage alt) am 5.7. auf der Iller bei Altstädten (KG,H.STARK,WA)
Die nördlichste Brut des Landkreises fand in einem Kasten bei Schwarzenbach (Krug-W) statt (FE)
Brutverdacht für 1♀ in KE an der Rottach (damit sind mind 1-2 Bruten im Stadtgebiet KE (HZ,W.SCHREIBER,WA)
8♂ 14♀ 14.4. Grüntensee (PU)
10 - 15 "♀" 2.7. Ostrach/Reckenberg-S (WA)
mind 120 Ex 10.11. Seeger See-S (OAL) (KR)
21 "♀" 4.12. I/Lauben (HF)

Steinadler (Aquila chrysaetos)

2 Ex 8.3. KE (E.DÖRR)
1 Ex 19.4. Emmereiser M (HE)

Mäusebussard (Buteo buteo)

1 Brut Rottachtobel (Rottachberg) (KR)
1 Brut Rottachberg/Untermaiselstein (KR,SA)
1 Brut Rottachmoos (KR,SA)
1 Brut Bodelsberg-S (KR,SA)
Regelmäßiger Durchzügler nach WSW von Sept. bis Nov. am Hauchenberg und Salmaser Höhe. Z.B.: 122 Ex in 6,5 Std., 13.10., 84 Ex in 1,5 Std. 14.10., 76 Ex in 3,5 Std. 5.11. (FA,HZ,MU)
20-25 Ex im Überflug nach SW 25.12. Börwang (WA)

Sperber (Accipiter nisus)

2 BP Grünten (zwischen Burgberg und Roßalpe) (KR)
1 BP Rauhenzell-Rottachberg (KR)
1 Brut (2 juv) Gr. Alpsee-N (HE)
1♀ fliegt mit Beute im Wald 3.5. Schwarzer Grat (MU)
ca 15 Ex (Totfunde) sind 1986 aus dem Oberallgäu dem Präparator M. HAUSMANN gebracht worden.
1♀ 3.1. Kimratshofen (WI)
1 Ex (5 Beobachtungen) vom 26.2. bis 24.12. SF (KG)
1♀ 25.4. Siplinger Nadeln (SA)
1 Ex 30.7. Betz M (WA)
1♂ jagt Fledermaus 7.10. Herr W (MU)
1 Ex 23.11. Waizenried (E. MAYRHANS)
1♀ Winter 86/87 Sulzbrunn (SA)
Regelmäßiger,seltener (jedoch häufiger als ziehende Habichte) Durchzügler nach WSW im Okt. und Nov. Salmaser Höhe, Hauchenberg, Piesenkopf, Rottachberg (FA,HZ,MU)

Habicht (Accipiter gentilis)

1 Brut (3 juv Juni) Kimratshofen (WI)
1 BP I/Alt (FE)
1 BP Rottachmoos (SA)
1 Brutverdacht Sulzberg-NO (SA)

Rotmilan (Milvus milvus)

1 Ex 31.3. Friesenried (OAL) (WI)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 8. und 13.5.Herr W (HZ,MU)
1 Ex im Überflug nach O 23.5. Hirschberg (FA)
1 Ex im Überflug nach SW 18.10. Walt M (FA,MU,SA)
Es ziehen nach WSW
1 Ex 11.9., 2 Ex 13.10. Hauchenberg - Salmaser Höhe (FA,HZ,MU,SA)

Schwarzmilan (Milvus nigrans)

1 Ex 29.3. und 21.5. Alt (FA,FE)
1 Ex 1.4. Legau (WI)
1 Ex 2.4. Herr W (MU)
2 Ex 14.4. I/Kalden (SA)
1 Ex 27.4. Haldenwang-W (WA)
1 Ex 1. und 7.5. Walt M (MU,SA)
1 Ex 12. und 19.5. Ahegg (MU)
1 Ex 16.6. Sachs W (SA)
1 Ex 28.6. Betz M (WA)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

1 Ex 23.5. Hirschberg (FA)
1 balzt 16.8. Rottachberg (MU,SA)
1 Ex 8.9. Eckarts (SC)
1 Ex 21.9. Warmatsgundkopf-S 21.9. (ST)
Regelmäßiger Durchzügler von Ende Aug. bis Sept. Salmaser Höhe - Hauchenberg (MU)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

1♂ 25.3., 1♀ 27.4. und 1.5. Walt M (FA,PU)
1 "♀" 28.3. Herr W (MU)
1♂ 13. - 15.4., 1♀ 12.8. Ins See (PU)
1♀ 3.5. Betz M (WA)
1 immat 7.9. Gr.Alpsee-W (HE)
1 "♀" ziehend nach WSW 11.9. und 13.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU,SA)

Kornweihe (Circus cyaneus)

2♂ 1.1. Gruppenklärwerk Seifen (HE)
je 1 "♀" (Weißbürzelweihe) ziehend nach WSW 13., 14. und 31.10. und 5.11. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)
1♀ 28.11. - 12.12. Gr. Alpsee (HE)

Fischadler (Pandion haliaetus)

1 Ex 6.4. Nied See (HE)
1 Ex im Überflug nach NO 1.5. Walt M (FA)
je 1 Ex 4.5. Ahegg und Herr W (MU)
1 Ex 7. und 11.9. Gr. Alpsee (HE,KG)

Baumfalke (Falco subbuteo)

1 erfolglose Brut 1985 Widd W (SA)
1 Brutverdacht 1986 Widd W (SA)
1 Brut (mind 1 flügges juv) Ruine Vorderburg (Rottachberg) (FA,PU,SA)
2 juv (Bettelflug) 1.9. I/Alt (FA)
1 Brutverdacht Kreuzthal (SA)
1 P von Mai bis Anfang Juni, dann verschwunden Betz M (WA)
Ansonsten 16 weitere Sichtbeobachtungen an 14 Orten im Oberallgäu; frühestes Datum 25.4., spätestes 1.10. (FA,FE,HE,KG,KR,MU,SA,SC,WA)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

Wanderfalke (Falco peregrinus)

Von 5 BP im Allgäu wurden offensichtlich nur von 1 P 2 juv flügge (FA,HZ,MU,PU,WA)
1♂ 18.4. Alt-W (WI)
1♂ 28.6. Betz M(WA)
1♂ 12.9. Nied (MU)
1♂ 21.9. Nebelhorn-W (2000 m) (MU,SA)
1 Ex 21.9. Walser Hammerspitze (ST)
1 immat 27.9., 1♀ 29.9. Walt M (FA,MU)
1 Ex 10.10. Piesenkopf (FA,HZ,MU)
1 Ex 25.10. Salmaser Höhe (MU)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

1 erfolgreiche Brut KE-Stadtkrankenhaus (WA)
1 BP Haldenwang-W (WA)
1 BP Betz M (PU,WA)
1 BP Walzlings (Alt-SW) (FE)
1 BP (erfolglos) Walt M (FA,PU)
1 Brut Grünten-S (KR)
2 BP Tiefenbach (Oberstdorf-NW) (PU)
1 Brut (3 flügge juv 16.7.) Obere Gottesackerwände-O (1800 m) (WA)
1 P 29.6. Obere Willersalpe (HE)

Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

1♂ mit 2 juv (ca 2 Wochen alt) 27.7. Seeköpfle (1800 m) (KR)
1♀ mit 4 juv 9.8. Rappensee-O (2080 m) (HZ,SA)
1 Ex 13.3. Entschenkopf (2020 m) (HZ,MU)
1 Ex 15.3. Mädelejoch (1980 m) (HZ,MU)
2 Ex 20.5. Koblat (SA)
2 Ex 16.6. Ponten (1900 m) (SA)
2 Ex 16.6. Gaishorn (2100 m) (SA)
2 Ex 21.6. Fiderepaß (2000 m) (SA)
2 Ex 21.6., massenhafte Mauserfedern lassen auf ein Volk von über 15 Ex schließen. Mindelheimer Hütte (2000 m) (KR,SA)
1 ruft 30.6. Schrecksee (1800 m) (MU,SA)
8 Ex 11.10. Kemptner Kopf (KR)
12 Ex (Übergangskleid) 19.10. Laufbacher Eck → Himmeleck (E.MAYRHANS)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

Maximal 5 balzende ♂ im Früjahr und 3 balzende ♂ im Herbst
Wannenkopf (KR)
4 ♂ balzen 25.4. Hochgrat (1500 m) (SA)
4♂ balzen 25.4., 5 - 6♂ balzen 19.5. Stuiben, Steineberg, Dreherberg, Prodel (1360 m - 1560 m) (FE,HZ,MU,SA)
1♀ 4.5. Laufbichelkirche (1300 m) (SA)
5♂ balzen 1.6. Bleicherhorn, Siplingerkopf (PU,SA)
1♂ 15.6. Iseler-S (SA)
1♀ 22.6. Haldenwanger Kopf (2000 m) (SA)
3♂ (2 balzen) 5.10. Piesenkopf-N (1400 m) (HZ)
"Ein jämmerlich gurgelnder Junghahn" 18.10. Fellhorn (KR)
1♂ balzt 19.10. Siplinger Kopf (1500 m) (MU)
3♂ balzen 30.11. Wertacher Horn (SA)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

1♂ balzt 15.2.(!) Stuiben (1400 m) (MU,SA)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

Wachtel (Coturnix coturnix)

2 rufen 6.6., 8 rufen 28.6., 4 rufen 5.7. Betz M (WA)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

1 Ex 16.6. Sachs W (SA)
1 Ex 24.8. I/Kalden (MU,SA)
1 Ex 20.9. I/Alt (FE)
1 ruft 24.10. Widd W (SA)
1 Ex 8.11. Gr. Alpsee (HE)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

2 Ex 13.9. I/Alt (FE)

Teichralle (Gallinula chloropus)

mind 2 erfolgreiche Bruten KE-Schwab W (MU)
1 Brut Betz M (WA)
1 ad 2.1., 1 ad 1 juv 3.1., 1 juv 30.12. I/KE-St.Mang-Brücke (WA)
1 juv 30.12. I/KE-Hegge (WA)

Bleßralle (Fulica atra)

150 Ex (max) 1.1. Baggersee Sf-W (KG)
110 Ex 2.3. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km) (KU)
206 Ex 30.12. I/KE-Hegge → Nordbrücke (6 km) (WA)
420 Ex 8.3., 422 Ex 15.3. I/Alt (FA,FE)
262 Ex 8.11., 410 Ex 30.12. Gr. Alpsee (WA)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

ca 5 BP (wohl alle ohne Erfolg trotz 1-2 Nachgelegen), ca 200 Ex 17.3. Betz M (MU,WA)
3-6 BP (erfolglos), 30 Ex im Überflug nach W, Walt M (FA,HZ,PU,MU)
1-2 BP (erfolglos) Rottachmoos (SA)
7 Ex 2.3. Werd M-N (SC)
84 Ex 7.3. Börwang-SW (WA)
15 Ex 7.3. über KE (WI)
48 Ex 15.3. I/Alt (FE)
53 Ex 16.3. Waizenried (E.MAYRHANS)
1 Ex 21.12. Gr. Alpsee (HE)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

Brutverdacht für 1 P Juni-Juli, Kiesgrube westlich der Iller, Schlatt-N (Leubas-SW) (W.NITSCHE)
7 Ex (3 balzen) 20.4., 1 juv 14.8., 3 juv 1. und 7.9. I/Alt (FA,FE,MU,P
3 Ex (2 balzen) 1.5. Kiesgrube Eggen (SA)

Bekassine (Gallinago gallinago)

3 BP Betz M (WA)
35 Ex 4.4., 2-3 revieranzeigende Ex Mai Walt M (FA,PU)
2-3 Ex (Brutverdacht) 29.3. - 8.11. Teufelssee (HE)
2 Ex 15.3. und 27.7. Werd M-N (SC)
1 Ex 9.8. Kalbelesee (1650 m) (Widderstein-S)(Österreich) (MU)
3 Ex 4.10. Ins See (M.MENNINGER)

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

2 Ex 29.3. Walt M (PU)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 balzt 6.5. Teufelsküche/Kemptener Wald (SA,PU)
1 Ex 14.5. Walzlings (Alt-SW) (FE)

Großer Brachvogel (Numenius arquata)

1 Ex im Überflug 10.8. Walt M (PU)
1 Ex im Überflug 20.8. KE-Schwab W (MU)

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

2 Ex 24.8. I/Alt (FE)

Grünschenkel (Tringa nebularia)

2 Ex 9.8., 3 Ex 14. und 24.8., 8 Ex 20.8. I/Alt (FE,PU,SA)
8 Ex 14.9. I/Kalden (HZ,MU,SA)

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

1 Ex 9.2., 13. und 20.4. und 9.8. I/Alt (FA,FE)
1 Ex 15.4., 6.6., 24.7. und 22.9. Walt M (FA,PU, J.WILLY)
1 Ex 22.4. Kiesgrube Eggen (SA)
1 Ex 24.8. I/Kalden (MU,SA)

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

4 Ex 8.7., 9 Ex 10.7. Walt M (PU)
10 Ex 11.8., 1 Ex 1.9. I/Alt (FA,PU)

Flußuferläufer (Tringa hypoleucos)

Das Jahr 1986 war für den Flußuferläufer im Oberallgäu offensichtlich sehr erfolgreich:
An der Iller fanden bis auf die Höhe von Rottach wohl mindestens 5 Bruten statt: Von 11 Ex, die am 29.6. auf der 29 Fluß-km langen Strecke vom Illerursprung bis zur Rottachmündung gesichtet wurden, warnte an 5 verschiedenen Stellen je 1 Ex heftig, sodaß man hier wohl Bruten annehmen darf. (HZ,M.MENNINGER,MU,WA)
Auf dieser Strecke wurden im Juni und Juli sicher 2 Bruten mit je 1-3 juv (bei Altstädten - Tiefenberg) festgestellt (aus 1 Gelege schlüpften im Juni 3 juv) (KG,H.STARK)
ca 3 BP (1 P mit 1 juv 16.6. bei Tiefenbach) an der Breitach von der Klamm bis zur B 19 (4,5 km) (PU,ST)
1 Brut (1 ad mit 1 juv 14.6.) Stillach/Faistenoy (PU,SA)
1 Brut (1 P mit 1 juv 14.6.) Stillach/Renksteg - Ziegelbachbrücke (Oberstdorf-S) (PU,SA)
1 P (Brutverdacht) Schönbach, 940 m (Hirschgund-S) (WA)
Das sind für 1986 etwa 11 bekanntgewordene Bruten im Oberallgäu (WA)
3 Ex 14.4. WiddW (SA)
2 Ex 15.6. Stillach/Fellhornbahn (KG)
3 Ex 2.8., 21 Ex 24.8., 4 Ex 1.9., 3 Ex 6.9., 1 Ex 24.9. und 26.10. I/Alt (FA,FE,HZ,MU,SA)
3-4 x 1.9. I/Kalden (FA)
1 Ex 5.9. I/Immenstadt (MU)
1 Ex 12. und 22.9. Baggersee SF-W (KG)

Zwergstrandläufer (Calidris minuta)

5 Ex 3.9., 4 Ex 6.9. I/Alt (FE,PU)

Temminckstrandläufer (Calidris temminckii)

1 Ex 14.8. I/Alt (PU)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

1 Ex 6. und 7.9. I/Alt (FE,MU)

Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)

1 Ex 3.9. I/Alt (PU)

Silbermöwe (Larus argentatus)

31 Ex rasten und ca 50 Ex kreisen und fliegen nach W 18.1. Gr. Alpsee (HE)
3 immat 20.4. KE(FE)

Sturmmöwe (Larus canus)

1 immat 30. und 31.12. Gr. Alpsee (PU,WA)
1 immat 30.12. Kl. Alpsee (WA)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

ca 40 BP Sachs W (FE)
5 BP KE-Schwab W (R.DREHER)
280 Ex 7.4. I/Alt (FE)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

3 Ex 14.5. Öschlesee (SA)

Ringeltaube (Columba palumbus)

Es ziehen nach W
500 Ex in 3,5 Std. (Zugbreite ca 250 m) 10.10. Piesenkopf (FA,HZ,MU)
4046 Ex (max Schwarmgröße 600 - 700 Ex; Zugbreite 2 km) in 6,5 Std. 13.10., 1300 Ex in 3 Std. 25.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU,SA)
520 Ex in 2 Std. 14.10. Siedelalpe (Gr. Alpsee-N) (FA,HZ,MU)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

1 Ex 2.5. und 6.6. Betz M (FA,PU,WA)
1 Ex 11.5. Loretto (Oberstdorf-S) (ST)
1 Ex 25.8. und 21.9. Walt M (PU)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 juv wird von Wiesenpieper-Paar gefüttert 13.7. Mitterberg Alpe (1250 m) (Gunzesrieder Tal) (K.KOHLER)
1 Ex 27.4. I/Lauben (HF) 1 Ex 26.4. I/Alt (FE)
1 Ex 27.4. Emmereiser M (HE)

Uhu (Bubo bubo)

1 Brut (1 flügges juv) Steinbruch Burgberg (L.HRADEK,G.LINDNER)
1 Ex 2.2. Wald bei Greggenhofen (SC)
1 Ex 17.3. I/Kalden (FE)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

1 ruft 15.2. und 26.4. Stuiben-N (1290 m) (MU,SA)
1♂ ruft (Antwort auf Klangattrappe) 5.3., 1♀ 8.3. Teufelsküche (Kemptener Wald) (PU,SA)
1 ruft 9.3. Schwarzer Grat (1100 m) (HZ,MU)
1♂ ruft 15.4. Burgberger Horn (1400 m) (SA)
2 Ex 9.8. zwischen Imberger Horn und Strausbergsattel (1400 m) (KU)
1 ruft (antwortet auf Klangattrappe) 10.10. Piesenkopf-N (FA,HZ,MU)

© Volkshochschule Kempten download unter www.biologiezentrum.at

Waldkauz (Strix aluco)

1 Brut Betz M (WA)
2♂ rufen 15.2. Sulzbrunn (SA)
1 ruft 4.3. und 5.5. Wengen-O (HZ)
1 ruft 9.3., 2 rufen 2.5. Schwarzer Grat (HZ)
1 Ex 16. und 17.3. I/Alt (FE)
2 rufen 17.3., 3♂ 1♀ rufen 2. und 8.4. Wirlinger Wald (HZ)
1♂ ruft 1.4. Gunzesrieder Tal (1300 m) (SA)
2 rufen 1.5. Buchenberger Wald (HZ)
1 ruft 21.5. KE-Stiftallmey (HZ)
1♂ ruft 22.9. Rohrmoos (1200 m) (SA)
1 ruft 4.10. Einödsbach (1350 m) (KR)

Waldohreule (Asio otus)

1 BP Wirlinger Wald-O (HZ,MU)
1 jagt 1.5. Kemptener Wald (SA)
1 Ex 17.6. Schwarzenberg-O (SA)
1 Rupfung (von Greif) 19.11. Grünhorn (2000 m) (Kl. Walsertal) (ST)

Sumpfohreule (Asio flammeus)

1 Ex 19.4. Emmereiser M (HE)

Mauersegler (Apus apus)

Abzug der KE-Population am 20.7. (KR)
ca 20 Ex 27.4. I/Alt (FE)
1 Ex 30.4. KE-Stadt W (MU)
5 Ex im Überflug nach O 3.5. Schwarzer Grat (HZ)
6 Ex 4.5. KE (WA)
3 Ex 6.5. Alt (WI)
15 Ex jagen am 16.7. über den Gottesackerwänden (ca 2200 m) (WA)
1 Ex 3.9. KE (HZ)
1 Ex 7.9. Alt (WA)

Eisvogel (Alcedo atthis)

1 vermutliche Brut (verkotete Nistróhre 2 m über dem Bach), 1 Ex 11.12. Leubas/Gräbelesmühle (M.BREUNIG)
1 Ex 6.8., 1 juv bettelt, 1 ad am 22.8. Widd W (PU,ST)
1 Ex 20.4. und 3.9. I/Alt (PU,WI)
1 Ex 16.7. I/Krug-O (M.BREUNIG)
1 Ex 1.9. Rottach/Ahegg (MU)
2 Ex 14.9. I/Altwasser Seifen (SC)
wiederholt 3 Ex im August, 1 Ex 22. bis 30.9., 29.11. und 2.12. Kiesgrube östlich der Eschach (Schmiedsfelden-SO) (FA,HZ,MU,W.NITSCHE,PU,SA)
1 Ex 29.9. I/KE-N (M.MENNINGER)
1 Ex Mitte Okt. Oyer W (Börwang-SO) (PENDELIN)
1 Ex 14.10. Baggersee SF-W (KG)
1 Ex 16.10. I/Rottach (M.BREUNIG)
1 Ex 21.11. Illerkanal/Fischen (ST)

Wiedehopf (Upupa epops)

1 Ex 30.4. und 1.5. Walt M (FA,PU)
1 Ex 14.6. I/Blaichach (W.NITSCHE)
1 Ex 23./24.8. I/Alt (FE,MU,SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Grünspecht (Picus viridis)

1 Brut Grünten-S (1350 m) (KR)
2 rufen 30.3. Rappenalptal (HZ)
1 Ex 23.5. Hirschberg (1100 m) (FA)
1-2 rufen 10.10. Piesenkopf (HZ)
1 Ex 16.11. Schwarzwassertal (1500 m) (WA)
"Im Spätsommer und Herbst bis zur Baumgrenze umherstreifend, so im Tannheimer Tal bei Nesselwängle, Oytal, Rappental und Wildental (Kl. Walsertal). Im Wildental noch oberhalb der Hinterwilden Alpe (1777 m)" (KR)

Grauspecht (Picus canus)

1 ruft 22.5. Klammhütte (1620 m) Bärgündele (WA)

Schwarzspecht (Dryocopus martius)

1 BP Sorgschrofen-S (1100 m) (SA)

Buntspecht (Dendrocopos major)

"Ein ♂ kommt am 27.9. vom Schattenberg (Oberstdorf), überfliegt den Seealpsee, hakt in etwa 1900 m NN an einer Latsche fest und fliegt nach kurzer Ruhepause (ca 1 min) hinunter ins obere Oytal." (KR)

Kleinspecht (Dendrocopos minor)

2 Ex 27.4., 1 Ex 26.10. Gries (Krug-S) (FE)
1 Ex 9.10. Walt M (FA,MU)
1♂ 3.12. Grüntensee (HE)

Dreizehenspecht (Picoides tridactylus)

2 Ex und 1 Ex auf 2 km 26.4. Stuiben-N (1360 m) (SA)
2 juv 27.7. Hörnlein (Balderschwang-S) (SA)
1♀ 12.9. Hauchenberg-S (1110 m) (MU)
1 Ex 21.9. Sorgschrofen (KG)
"Am Grünten und Tegelberg nicht selten; einzelne Beobachtungen vom Wannenkopf, Fellhorn und Rappental (Enzianhütte)" (KR)

Wendehals (Jynx torquilla)

1 ruft 27.4. Börwang (WA)
1 Ex 28.4. I/SF (KG)
1 Ex 4.5. KE-O (E.SCHEDEL)
1 Ex räumt 2 Nisthöhlen aus 14.6. Einharz (HE)
1 Ex 24.8. Emmereiser M (HE)
1 Ex 7.9. I/Alt (MU)

Heidelerche (Lullula arborea)

10 Ex 15.10. Walt M (HZ)
1 Ex 24.10. Widd W (SA)
Es ziehen nach WSW:
60 Ex (1x 50 Ex) in 3,5 Std. 10.10. Piesenkopf-N (1450 m) (FA,HZ,MU)
49 Ex in 6,5 Std. 13.10., 95 Ex (1x ca 70 Ex) in 2 Std. 14.10., Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)
1 Ex 14.10. Sf-Hörnle (FA,HZ,MU)

Feldlerche (Alauda arvensis)

ca 120 Ex 2.3. I/Alt (FE)
2 Ex 7.3. Börwang-SW (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 singt 14.6. Bschießer-N (1750 m) (SA)
3 singen 21.6. Haldenwanger Kopf (bis 2000 m!) (SA)
25 Ex 8.11. Ins See (WA)
Es ziehen nach WSW:
507 Ex in 6,5 Std. 13.10., mind 2000 Ex in 3 Std. 25.10.,
26 Ex in 4 Std. 5.11. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU,SA)

Uferschwalbe (Riparia riparia)

bis 5 Ex von Mai - Aug. I/Alt (FE)
2 Ex 1.5. Walt M (FA)
1 Ex 1.5. Rottachmoos (SA)

Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris)

2 Ex 31.3., keine Brut 1986 Steinbruch Burgberg (L.HRADEK,PU)
1 P wiederholt von Ende April bis Mitte Mai Rottachberg-W (L.HRADEK)
2 P wiederholt bei Insektenjagd 22.5. Giebel-O (1550 m) (WA)
2 Ex 8.8. Schröcken (Widderstein-SW) (MU)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

1 BP Sattelalpe (1170 m) (Grünten-NO) (KR)
1 BP Alpe Kehr (1140 m) (Grünten-S) (KR)
1 BP Schwanden (1020 m) (Petersthal-S) (WA)
3 Ex 6.4. Gr. Alpsee (HE)
2 Ex 6.4., 10 Ex 7.4. I/Alt (FE,WI)
2 Ex 6.4. KE-Stadt W (E.MAYRHANS)
1 Ex 6.4. Walt M (HZ,MU)
15 Ex ziehen nach W 13.10. Salmaser Höhe (HZ)
2 Ex 14.10. SF-Hörnle (FA,HZ,MU)
1 Ex 19.10. Börwang (WA)
2 Ex 25.10. Gr. Alpsee (MU,SA)
3 Ex 5.11. Baggersee SF-W (KG)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

einige Ex 14.4. Lauben (HF)
1 Ex 20.4. I/Alt (FE)
1 Ex 22.4. Ahegg (MU)
einige Ex 24.4. Sf (KG)

Schafstelze (Motacilla flava flava)

1 Ex 14.4. Baggersee SF-W (KG)
15 Ex 20.4. I/Alt (FE)
15 Ex 1.5. Walt M(FA)
1 Ex 20.7. Agathazeller M (KG)
2 Ex 12.9. Nied-O (MU)

Bergstelze (Motacilla cinerea)

1 singt 25.6. Stierbach (1350 m) (Bärgündele) (WA)
3 Ex 3.7. Sperrbachtobel (1700 m) (HZ,MU,SA)
33 Ex 29.6. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km) (HZ,MU,WA)

Bachstelze (Motacilla alba)

1 ad füttert 1 flügges juv 27.8. Börwang (WA)
1 Ex 18.5. Gundalpe (1480 m)(Stuiben-NO) (HZ)
3 Ex 9.2., ca 120 Ex 20.4. I/Alt (FA,FE)
300 - 400 Ex 23.10. Walt M (KR)
1 Ex 19.12. I/St.Mang Brücke (WA)

© Volkshochschule Kempten download unter www.biologiezentrum.at

Brachpieper (Anthus campestris)

1 Ex 30.4. Kiesgrube Eggen (SA)

Baumpieper (Anthus trivialis)

1 Brut Grünten (1450 m) (KR)
1 singt 20.5. Laufbichlkirche-S (1500 m) (SA)

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

3-4 BP Walt M (FA,PU)
2-3 BP, 1 Ex 19.11. Betz M (WA)
2-3 BP, 20 Ex 29.3. Rottachmoos (KR,SA)
2 BP Untermaiselstein-N (SA)
2 BP (futtertragend und warnend 19.7.) Thalkirchdorf-W (PU)
1 BP (♂ singt 4.-6.7., am 13.7. füttert das Paar einen jungen Kuckuck) Mitterberg Alpe (1250 m) (Gunzesrieder Tal) (K.KOHLER)
1 singt am NNW exponierten Hang einer Jungviehweide 12.6. Schwanden (1060 m) (Petersthal-S) (WA)
1 singt auf der Kuppe einer Viehweide 1. - 5.7. Schwarzerd-O (940 m) (HZ)
1 singt 1.6. I/Untermaiselstein-N (PU)
Es ziehen nach WSW: (darunter auch Wasserpieper(A. spinoletta))
87 Ex in 3,5 Std. 10.10. Piesenkopf (MU)
225 Ex in 6,5 Std. 13.10. Salmaser Höhe (MU)

Rotkehlpieper (Anthus cervinus)

1 Ex (Brutkleid) 2.5. I/Burgratz (SA)

Wasserpieper (Anthus spinoletta)

8-10 BP auf 10 ha 16.7. Obere Gottesackerwände-NO (1700-1780 m)(WA)
ca 20 Ex balzen 25.4. Hochgrat (SA)
1 singt 2.7. Kreuzeck (2300 m) (MU,SA)
1 Ex warnt 27.9. Seealpsee (1700 m) (KR)
bis zu 12 Ex Jan. - März und Okt. - Dez. I/Alt (FE)
einige Ex 10.1. I/SF (KG)
20 Ex 14.4. Widd W (SA)
1 Ex 1.5. Esch W (HZ)
mind 5 Ex 3.5. Wenger Egg Alpe (1000 m) (HZ)
25 Ex 31.10. Betz M (WA)

Dornwürger (Lanius collurio)

Herr PUDIMAT notierte von Ende Mai bis Ende Juli 1986 im Oberallgäu 38 BP (davon mind 6 ohne Erfolg), dazu noch weitere 15♂ im Brutbiotop. Höchstgelegener Brutplatz: 950 - 1000 m (Rottachberg). Andere Beobachter meldeten weitere 18 BP bzw. Bruten aus dem Oberallgäu für 1986 (KG,KR,MU,SA,ST)
Das sind 56 aufgefundene BP sowie 15♂ im Brutbiotop im Oberallgäu für 1986 (WA)

Raubwürger (Lanius excubitor)

1 Ex 1.1. und 1.12. I/Seifen (HE)
1 Ex 3.2. KE-Rothkreuz (MU)
1 Ex 4.2. Moosbach-S (SA)
1 Ex 1.3. Weidachsee/Blaichach (HE)
1 Ex 18.10. Walt M (FA,HZ,MU,SA)
1 Ex 19.10. - 31.12. Gr. Alpsee (HE)
1 Ex 24.10. Widd W (SA)
1 Ex 25.10. - 13.12. Ins See (MU,PU,SA)
1 Ex 31.12. I/Immenstadt (HE)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)

9 Ex 5.2., 16 Ex 7.2. Sulzbrunn (Sulzberg-NO) (SA)

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

2 BP 30.3. Rappenalptal (1150 und 1270 m) (HZ)
1 BP 27.4. Weißach (1250 m) (SA)
10 - 13 Ex Jan., Feb. und Nov. I/KE-Hegge → Südbrücken (3 km) (KU)
25 Ex (an 13 Stellen) 29.6. I/Ursprung → KE-Hegge (40 km)(HZ,MU,WA)

Alpenbraunelle (Prunella collaris)

1 Ex futtertragend 2.7. Kreuzeck (2300 m) (HZ)
5 - 6 Reviere auf 2,5 km 16.7. Obere Gottesackerwände (1830 - 2030 m) (WA)
4 Reviere auf 3,8 km 13.7. Untere Gottesackerwände (1250-1860 m) (WA)
1 Ex 17.1. Alpsee-W (HE)
1 singt 13.3. Entschenkopf (2020 m) (HZ)
2 singen 18.5. Steineberg (1630 m) (HZ)
1 Ex 15.11. Rotspitz (2034 m) (Hinterstein) (HZ)
2 - 3 Ex 16.11. Ifen (WA)
1 Ex an Fütterung 24.12. Immenstadt (HE)

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

4 singen 20.5. Koblat (ca 2000 m) (SA)
1 Ex 21.3. I/Alt (FE)

Rohrschwirl (Locustella luscinioides)

1 singt 28.6. Betz M (WA)

Feldschwirl (Locustella naevia)

ca 3 BP (7 singen 3. und 9.5., 4 singen 18.5., 1 singt 6.6., 3 singen 17. und 28.6.) Betz M (WA)
1 BP (2 singen im Mai) Walt M (FA,PU,MU)
1 BP Rottachmoos (830 m) (PU,SA)
1 Ex 19.5. Kürbsen (Betz M-N) (E.MAYRHANS)

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)

1 singt 5.7. Walt M (FA,KU,SA)

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

1 Ex 11.5. I/Alt (FE)
3 Ex 20. - 23.5. Oberstdorf-Rubi (ST)
1 Ex 23.5. Tiefenbach/Oberstdorf (ST)
1 Ex 24.5. Illerkanal/Fischen (ST)
3 Ex 1.6. alter Schuttplatz Oberstdorf (ST)

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

3 - 6 singen Mai und Juni Betz M (WA)
1 singt Mai Herr W (MU)

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

1 Ex 29.4. I/Alt (FE)
1 singt 25.6. (1420 m), 1 singt 2.7. (1620 m) Stierbach (Schneck-NO bzw.-O (HZ,WA)
1 singt 2.7. Oberes Bärgündele (1600 m) (MU,SA)

© Volkshochschule Kempten download unter www.biologiezentrum.at

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

1 singt 8.4. Börwang (WA)
1 singt 3.7. Sperrbachtobel (1500 m) (HZ)
2 singen 13.7. Untere Gatterkopfwände-W (1380 m) (WA)
1 singt 3.8. Stuibenfall (1400 m) (Oytal) (KR)

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

1 Nest mit 2 Eiern 15.6. Werd M (SC)
1 singt 26.4. Börwang (WA)
1 Ex 29.4. I/Alt (FE)
1 singt 22.6. Haldenwanger Kopf (1850 m) (SA)

Dorngrasmücke (Sylvia communis)

1 P baut Nest in Brennesseln 18.5. Weiher Eckarts-S (SC)
1 singt 16.6. Vockenthal(Dietmannsried-N) (SA)
1♂ 3. - 17.6. Betz M (WA)

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

1 Ex 23.3. I/Alt (FE)
1 singt 2.4. SF (KG)
1 singt 3.4. Sulzbrunn (SA)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

1 singt 3.4. SF (KG)
1 singt 7.4. I/Alt (FE)

Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli)

1 Nest mit 3 Eiern 15.6. Werd M (SC)
Brutvogel in den Spirkenmooren bei Schwarzenberg (850-880 m) (SA,WA)
2 singen 3.5. Betz M (WA)
1 Ex 14.5. Walzlings (Alt-SW) (FE)

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)

1 singt 27.4. Börwang (WA)
6 singen 29.4. KE-Rottach (WA)
1 singt 14.6. Hinterstein-N (ca 1300 m) (SA)

Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)

1 singt 13.7. Gatterkopf-W (1580 m) (WA)

Grauschnäpper (Muscicapa striata)

1 BP Juni Bärgündelesbach (1310 m) (WA)

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

1 BP KE-Eich (FE)
1♂ 27.4. Haldenwang-W (WA)
1 singt 15.5. Rohrmoos (1300 m) (SA)
1 singt 16.5. Sonnenwand/Rohrmoos (1150 m) (FA)
1 singt (Höhlenanflug) 22.5. Ostrach/Hinterer Erzberghof (1030 m)(WA)

Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis)

1 Ex 6.4. I/Altwasser-Eggen-NO (M.MENNINGER)
1♂ 27.4. Börwang (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

1 Ex 6.3. I/SF (KG)
1♂ 26.3. Reicholzried (WI)

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

ca 6 BP (3 - 4 erfolgreich) Rottachmoos (KR,PU,SA)
2 - 3 Bruten, 21 Ex 1.5., 14 Ex ziehend 25.8. Walt M (FA,PU)
1 Brut (4 juv) Gr. Alpsee-W (HE,PU)
1 BP (Kopula 23.5.) und 1♂ Oberstdorf-Rubi (ST)
2♂ 2♀ 2 juv (aufgelöster Familienverband) 19.7. Thalkirchdorf-W (PU)
1 juv 27.7. Werd M-N (SC)
2 singen 11.5. Herr W (MU)
1 Ex Mai Lorettowiesen (Oberstdorf-S) (ST)
1 singt 1.6. I/Untermaiselstein (PU,SA)
1 singt Juni Ried (Rottachberg-O) (PU)
1 Ex 10.9. SF-O (KG)
1 Ex 12.9. Betz M (WA)

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

1 BP KE-Haubenschloß (KR)
1 P 6.4. KE-Fuchsbühlstr. (M.MENNINGER)
1♂ 22.4. KE-O (E.SCHEDEL)
1♀ 1.5. Thaler Höhe (HE)
1♂ 2.5. Betz M(FA,PU)
1 P 9.5. Emmereiser M (HE)
1♀ 1.9. I/Kalden (FA)
1♂ 29.9. Walt M (HZ)

Blaukehlchen, Weißsterniges (Luscinia svecica-cyanecula)

1♂ 12.4. Schwarz W (KR)
1♀ 31.5., 1♂ 21.6. Gr. Alpsee (HE)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

1 Brut (Nestbau 20.5.; futtertragend 14.7.), 1 weiteres BP wohl erfolglos, Laufbichelkirche-S (ca 1450 m) (SA)
1 P (♂ singt) 2.7. Kemptener Hütte-SO (2000 m) (MU,SA)
1 Ex 20.4. I/Alt (FA)
7♂ 3.5. I/Burgratz (SA)
3 Ex (1♂ im Brutkleid) 12.9. Thaler Höhe (MU,SA)
1 Ex 12.9. Missen (MU,SA)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

6 Ex 7.3. Börwang (WA)
20 Ex 8.3., 1 Ex 9.10. I/Alt (FE)
1 Ex 16.7. Mahdtal (1680 m) (WA)
60 Ex ziehen nach W (in 3,5 Std.) 10.10. Piesenkopf-N (FA,HZ,MU)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

1 Ex 23.7. Giebel-O (1720 m) (WA)
"Bestand weiterhin rückläufig, vor allem wo Habicht und Sperber jagen. Am Grünten nur noch Restbestände im Bereich Parkplatz Königssträßle" (KR)

Singdrossel (Turdus philomelos)

1 Ex 3.8., 1 Ex 15.10. I/Alt (FE)
1 Ex 10.3. Kürnach (W.SPONSEL)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rotdrossel (Turdus iliacus)

1 Ex 6.1. Eckarts-S (SC)
1 Ex 29.3., 8 Ex 4.4. Walt M (FA,SA)
3 - 6 Ex 1.4. Betz M (WA)
1 Ex 13.4. Sulzberg-NO (SA)
3 Ex 10.10. Piesenkopf (MU)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

4 BP auf ca 1 km Länge (980-1020 m) Hochberg (Buchenberg-W) (HZ)
Brutvogel bei Wenger-Egg Alpe (1050 m) (Wengen-N) (HZ,MU)
mind 1 BP Esch W (1000 m) (HZ)
1 flügges juv 12.6. Schwanden (Peterthal-S) (WA)
12 Ex 6.1. Eckarts-S (SC)
1 Ex 5.4., 1♂ 11.4. Walt M (FA,PU,SA)
1♂ 12.4., 8♂ 13.4. Sulzbrunn (SA)
20 Ex 19.4. Emmereiser M (HE)
1 Ex 20.4. I/Alt (FE)
3 Ex 1.5. Thaler Höhe (HE)

Amsel (Turdus merula)

1 Ex 18.5. Steineberg (1550 m) (HZ)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

1 Ex mit Nistmaterial 22.3. Blaichach-S (HE)
1 P baut Nest in Birke 29.3. (später nach Schneefällen aufgegeben) Walt M (PU)
1 P mit Nistmaterial 19.4. Börwang (WA)
19 Familien 29.6. I/Ursprung → I/KE-Hegge (40 km) (HZ,MU,WA)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

4 Ex 2.5. Betz M (FA,PU)

Haubenmeise (Parus cristatus)

1 singt 16.7. Mahdtal (1540 m) (WA)
1 Ex 21.9. Geißalphorn (1950 m) (HZ)

Nonnenmeise (Parus palustris)

1 ad füttert 1 flügges juv 23.7. Giebel-O (1180 m) (WA)

Kohlmeise (Parus major)

1 Ex 23.7. Giebel-O (1520 m) (WA)
12 Ex ziehend nach W 13.10. Hauchenberg-S (HZ)

Kleiber (Sitta europaea)

1 Ex 13.7. Gatterkopf (1650 m) (WA)
1 Ex 23.7. Giebel-O (1520 m) (WA)
1 Ex am 28.9. in einem gemischten Meisenschwarm mit Dreizehenspecht (1700 m) Gimpelhaus (Tannheimer Tal) (KR)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 P füttert in Felswand 13.7., Nest ca 30 m über der Wandbasis (1780 m) Untere Gottesackerwände-Mitte (auf 3,8 km Länge) (WA)
1 P am Nest, ♂ füttert, ♀ im Nest 16.7., Nest ca 35 m über der Wandbasis (1900 m) Obere Gottesackerwände-W (auf 2,5 km Länge) (WA)
1 Ex 26.4. und 23.5. Hirschberg-S (Hindelang) (FA,HE)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 27.7. Neuschwanstein (OAL) (KR)
1 Ex 31.7. Kellespitz (2230 m) (Tannheimer Berge) (MU)
1 Ex 20.9. Östl. Wengenkopf-S (ST)
1 Ex 27.9. Schochen (KR)
1 Ex 11.10. Liechelkopf (2300 m) (KR)
1 Ex 19.10. Rotkopf (2100 m) (Schneck-N) (E.MAYRHANS)
1 Ex an Holzwänden 15.11. Obere Hütte (1499 m) (Hinterstein-S)(HZ,MU)
1 Ex 16.11. Ifen-S (WA)

Waldbaumläufer (Certhia familiaris)

1 singt 23.7. Giebel-O (1520 m) (WA)

Goldammer (Emberiza citrinella)

mind 3 BP Wengen-O (HZ)
1 singt 24.4. Buchenberg-O (870 m) (HZ)
1 singt 25.5. Hellengerst-N (HZ)
1 Ex im Überflug nach W 5.11. Salmaser Höhe (HZ)
ca 25 Ex 5.12. Lanzen (Walt-N) (FA)

Ortolan (Emberiza hortulana)

2 Ex 30.4., 3 Ex 1.5. Walt M (FA,PU,SA)
1 Ex 2.5. I/Burgratz (SA)

Zippammer (Emberiza cia)

1 P 27.4. Emmereiser M (HE)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

1♀ 3.1. Gr. Alpsee (HE)

Buchfink (Fringilla coelebs)

2♀ Jan. und Feb. Börwang (WA)
1 singt 11.2. KE (WA)
Es ziehen nach WSW:
ca 2800 Ex in 2,2 Std. (Zugbreite 250 m) 10.10. Piesenkopf-N (FA,HZ,MU)
ca 1600 Ex in 6,5 Std. (Zugbreite 500 m) 13.10., 1500 - 2000 Ex in 3 Std. 25.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU,SA)
ca 70 Ex in 4 Std. 5.11. Thaler Höhe-O (HZ)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

1♂ 4.4., ca 100 Ex 17.10. Sulzbrunn (SA)
1 Ex 2.10., ca 60 Ex (max) 31.12. Börwang (WA)
1 Ex 6.10. Walt M (FA)
6 Ex ziehend 10.10. Piesenkopf-N (FA,HZ,MU)
8 Ex ziehend 13.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)
8 Ex 14.10. SF-Hörnle (FA,HZ,PU)
mind 300 Ex 13.12. I/Alt (FE)

Zitronengirlitz (Serinus citrinella)

5 - 6 P Rappenseehütte (2090 m) (KR)
mind 5 P Grünten-S (1300 m) (KR)
3 Ex 14.6. Hinterstein-N (ca 1400 m) (SA)
2 Ex 14.6. Ponten (ca 1800 m) (SA)
2 Ex 31.7. Tannheimer Hütte (1710 m) (MU)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Girlitz (Serinus serinus)

Im Gebiet KE-Rottach starker Rückgang gegenüber früheren Jahren (WA)
1 singt 13.7. Rohrmoos (1060 m) (WA)

Grünfink (Carduelis chloris)

fast flügge juv im Nest 13.8. Börwang (WA)

Stieglitz (Carduelis carduelis)

1 Ex an Fütterung 19.2. KE (KU)
1 Ex an Fütterung 19. - 28.2. Börwang (WA)
1 P (♂ singt) 12.6. Petersthal-S (1020 m) (WA)
10 Ex im Überflug nach W in 3,5 Std. 3.10. Schwarzer Grat (HZ)
ca 200 Ex Mitte bis Ende Nov. Sulzbrunn (Sulzberg-NO) (SA)

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

30 - 40 Ex 1. und 2.2. Börwang (WA)
15 - 20 Ex 25.11. Lauben (HF)

Birkenzeisig (Carduelis flammea cabaret)

1 Brut (2 weitere Paare brutverdächtig) Goymoos (KR)
1 Brut Agathazeller M (KR)
1 P mit flüggen juv Anf. Aug. KE-Haubenschloß (KR)

Birkenzeisig Carduelis flammea flammea)

2 - 3 Ex 2. bis 20.2. Börwang (WA)

Bluthänfling (Carduelis cannabina)

1 Brut Grünten-S (ca 1500 m) (KR)
2 - 3 P 27.4. Haldenwang-W (WA)
1 P 14.5. Baggersee SF (KG)
1 P (♀ mit Nistmaterial) 18.5. Kranzegg-NO (HE)
1 P 12.6. Petersthal-S (WA)
8 Ex ziehend nach W in 3,5 Std. 10.10. Piesenkopf-N (HZ)

Karmingimpel (Carpodacus erythrinus)

1 juv ♂ (grün) singt pausenlos 17.6. Betz M (WA)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

1 P füttert 4 flügge juv 16.3. Werd M (SC)
2♂ und 1♀ verwenden Samenhaare vom Rohrkolben als Nistmaterial
31.3. Spirkenwald im Rottachmoos (PU)
1 P (♀ mit Nistmaterial, ♂ singt) 1.4., 1 P füttert 1 flügges juv
2.5., 2 - 3 P Ende März bis Mitte Mai Betz M (FA,PU,WA)
1 P füttert mind 2 flügge bettelnde juv 14.6. Börwang (WA)
28 Ex 22.9. Kreuzthal (FA,HZ,MU,PU)

Schneesperling (Montifringilla nivalis)

2 P füttern rufende juv in der Wand 16.7.; Nester 25 bzw. 30 m über der Wandbasis, Obere Gottesackerwände-O (1830 m bzw 1970 m) (auf 2,5 km) (WA)
An den Unteren Gottesackerwänden (1250 m - 1860 m) konnten auf 3,8 km Länge am 13.7. keine Bruten festgetstellt werden (WA)
1 singt 21.6. Mindelheimer Hütte-N (2150 m) (SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 30.6. Rauhhorn (MU,SA)
4 Ex 1.7. Lahnerkopf (Schrecksee-S) (MU,SA)
4 Ex 2.7. Schneck (2100 m) (HZ,MU,SA)
1 Ex 2.7. Krottenspitzen-NO (2200 m) (HZ,MU,SA)
4 Ex 22.7. Rappensee (2050 m) (HZ)
1 Ex 22.7. Biberkopf-N (2080 m) (HZ)
4 - 5 Ex 16.11. Ifen (WA)

Star (Sturnus vulgaris)

10 Ex 17.2. KE (WA)
10 Ex 18.2. Börwang (WA)
4 Ex 18.2. I/Alt (FE)
2 Ex 18.2. Wildpoldsried (WA)
4 - 5 Ex 19.2. SF (KG)
193 Ex ziehen in 2 Std. nach W 14.10. Siedelalpe (Gr. Alpsee-N) (FA,HZ,MU)

Pirol (Oriolus oriolus)

1♀ 29.5. I/Seifen (PU)

Elster (Pica pica)

1 ruft 30.3. Rappenalptal (1280 m) (HZ,MU,SA)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)

mind 3 P füttern bettelnde juv in Wand 13.7. Untere Gottesackerwände (1620 m - 1830 m) (WA)
1 - 2 P füttern bettelnde juv in Wand (1920 m) 16.7. Obere Gottesackerwände (WA)
40 Ex 27.3., 10 P im Flug 25.4. Siplinger (SA)
22 Ex 22.5. Giebel (WA)
60 - 70 Ex 2.7. Kemptener Hütte (HZ)
36 Ex 16.11. Ifen (WA)
ca 250 Ex 3.12. Fellhorn (SA)

Dohle (Corvus monedula)

6 - 8 BP Kirche Reicholzried (FE)
ca 10 Ex 22.2. Oberstdorf (SA)
40 Ex im Überflug 18.10. Walt M (HZ)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

ca 40 - 45 BP 1986 Stielings (WA)
ca 350 Ex 6.3. Börwang-SW (WA)
400 - 600 Ex im Überflug nach SO 16.3. Waizenried (Börwang-N) (E.MAYRHANS)
Es ziehen nach W:
286 Ex in ca 6,5 Std. 13.10., ca 500 Ex (1 Schwarm) 27.10. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)
ca 150 Ex 18.10. Walt M (HZ)

Rabenkrähe (Corvus corone corone)

1 BP Mai - Juni Bärgündele (1380 m) (WA)

Nebelkrähe (Corvus corone cornix)

ca 30 Ex im Überflug nach W 8.11. Gr. Alpsee (HE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Kolkrabe (Corvus corax)

1 Brut (2 juv), Horst auf Hochspannungsmast seit ca 5 Jahren besetzt, Unterm Buch (Sulzberg-NO) (SA)
2 BP (1 Brut) Rottachberg (KR,MU,SA)
2 - 3 BP Grünten (KR,SA)
1 P Wengener Tal-O (HZ)
1 BP KE-Mariaberg (KR,MU)
1 Brut Burgberger Hörnle (MU)
1 BP I/Alt (FE)
1 BP (Horstbau am 16.2.) Kreuzthal (WI)
1 P Wirlinger Wald (KR)
1 BP Zollhaus (KR)
1 BP Pfarralpe (Gr. Alpsee-N) (HE)
1 BP Emmereiser M (HE)
1 P beim Horstbau 11.3. Tiefenbacher Wald (Oberstdorf-NW) (FA)
1 BP Siplinger Nadeln (SA)
1 P 18.5. Steineberg (HZ)
1 Brut (3juv) Retterschwanger Tal (SA)
1 BP Mindelheimer Hütte (KR)
1 P Nebelhorn (KR)
1 P Rappenseehütte (KR)
1 P 22.5. Wiedemerkopf-W (Bärgündele) (WA)
mind 35 Ex kreisen 10.10. Piesenkopf (FA,HZ,MU)

Berichtigung zu den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1982" erschienen in den Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 26 - Folge 1 35 (Dez. 1983):

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)

10 - 12 Ex im Überflug Anf. Sept. KE (HA)
"Diese Angabe ist falsch, es handelte sich um

Wespenbussarde (Pernis apivorus)".

Berichtigung zu den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1985" erschienen in den Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 27 - Folge 2 : 62 (Dez. 1986)

Auf Seite 62 muß es heißen:

Sterntaucher (Gavia stellata) statt (Gavia immer) !

Anschrift des Verfassers:

Dietmar WALTER

An der Gasse 18

D - 8961 - B ö r w n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: 28_1-2

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1986 -. 37-61