© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten
Jahrgang 29 - Folge 1 : 55 - 92
(Mai 1989) - - ISSN 0344 - 5054



Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu

- Beobachtungen 1988 -

Von Dietmar WALTER, Börwang

Wie in den bisherigen Folgen wurden in dieser Ausgabe wieder seltene Brutvögel, die Ankunfts- und Abzugsdaten auch trivialer Arten, sowie alle Durchzügler des Oberallgäus aufgenommen. Das Material stammt von über 20 Beobachtern, denen ich für ihre Aufzeichnungen herzlich danke!

Künftig sollte noch angestrebt werden, neben der Erstankunft von jedem Singvogel auch den Gesangsbeginn zu notieren. Auch das Schlafplatzverhalten einiger Arten z.B. von Star, Raben- und Saatkrähe, Rauchschwalbe, Wacholderdrossel u.a., besonders quantitative Angaben darüber, sind von Interesse !

Bemerkenswerte Beobachtungen des Jahres1988 waren unter anderem die 61 Eiderenten (Somateria molissima), die sich Mitte September auf dem Niedersonthofener See aufhielten. Dies ist wohl einer der bisher stärksten in Bayern festgestellten Trupps dieser Meeresente !

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Bemerkenswert in anderer Hinsicht ist dagegen das Fehlen von effektiv festgestellten Reiherentenbruten (Aythya fuligula), also von führenden Weibchen. Wenn auch vielleicht dem einen oder anderen eine solche "triviale" Beobachtung als nicht notierenswert erschien, so ist daraus trotzdem auf einen beträchtlichen Rückgang dieser Art als Brutvogel im abgelaufenen Jahr zu schließen! dieser Trend zeichnete sich allerdings schon vor 2 Jahren ab: 1985 - 20 führende Weibchen, 1986 - 4 führende Weibchen und 1987 - 3 führende Weibchen !

Eine Zunahme war dagegen bei den Graureiher-Bruten (Ardea cinerea) festzustellen; dies ist allerdings teilweise auch auf eine verstärkte Beobachtertätigkeit zurückzuführen. Die Sichtbeobachtungen des Gartenrotschwanzes (Phoenicurus phoenicurus) waren 1988 fast doppelt so hoch wie in den letzten Jahren.

Erstaunlich war das Verweilen von bis zu 3 Rauchschwalben noch im November im südlichen Teil unseres Landkreises; 1 Exemplar wurde sogar noch am 3. Dezember gesichtet!

Besonders erfreulich war die Meldung fütternder Blaukehlchen (Cyanosylvia svecica) bei Seifen (Immenstadt-NO), wohl der erste Brutnachweis für unser Gebiet; denn aufgrund der topographischen Verhältnisse kann man fast sicher annehmen, daß die , zwar schon flüggen, Jungvögel auch im Landkreis Oberallgäu erbrütet wurden. (Übrigens wurde bereits im April 1987 an diesem Ort ein männliches Blaukehlchen beobachtet).

Ein fast sensationelle Nachricht war die sichere Beobachtung eines Seidenschwanzes (Bombycilla garrulus) bei Ofterschwang (3 km SW von Sonthofen) am 23. Juni 1988 ! Dies dürfte wohl die bisher einzige Juni-Meldung dieser Art aus Bayern sein !

Die Zahl der neu aufgenommenen Arten (in diesen jährlichen Berichten) war dieses Mal besonders hoch: Brautente, Schrei- bzw. Schelladler, Alpensegler, Bienenfresser und Weißbartgrasmücke. Diese "Rosinen-Arten" sind - so aufregend und prickelnd für den Entdecker - allerdings nicht das Wichtigste um eine lokale Avifauna zu erstellen. Diese lebt vielmehr vom "täglichen (harten) Brot", wie Wasservogelzählungen, Linientaxierungen, Abundanzbestimmungen, Höhenverbreitungen und dergleichen mehr! Als Belohnung für derartige Anstrengungen kann dann manchmal allerdings auch eine der zuvor aufgeführten "Pralinen" verkostet werden!

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

Die Systematik und Nomenklatur der im folgenden aufgeführten Arten orientiert sich an "Die Vögel Europas", PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOM 14. Auflage 1985.

Folgende Abkürzungen wurden verwendet

Beobachter (in Klammern gesetzt):

BR	BRUGGER, Wilhelm	MU	MUTH, Martin
FA	FARKASCHOVSKY, Harald	PU	PUDIMAT, Karl
FE	FEURER, Albert	SA	STADELMANN, Herbert
HE	HEINLE, Roland	SC	SCHÜSSEL, Franz Karl
HF	HAFNER, Arthur	SN	SCHNEIDER, Gerd
HO	HOFMANN, Armin	SP	SPINDLER, Hans
HZ	HERZ, Hubert	ST	STEINHÜBL, Günther
KG	KRIEGL, Jan Magnus	WA	WALTER, Dietmar
KR	KRETLOW, Günther	WE	WERTH, Henning
KU	KUTSCHERA, Arno	WI	WINKLER, Siegfried

ad	erwachsen, ausgefärbt
Alt	Altusried
Betz	Betzigau(er)
BP	Brutpaar(e)
Diet	Dietmannsried
Esch	Eschach(er)
Ex	Exemplar(e)
Herr	Herrenwieser ....
I/...	Iller/mit Ortsangabe
immat	unausgefärbt
Ins See	Inselsee(n) (bei Niedersonthofen)
juv	jugendlich, Junge(s)
KE	Kempten
Krug	Krugzell
M	Moos, Moor
max	maximale Zahl aller Jahresbeobachtungen
mind	mindestens
-N	Nord(en)
Nied	Niedersonthofen(er)
-O	Ost(en)
OAL	Landkreis Ostallgäu
P	Paar(e)
Reich	Reicholzried
-S	Süd(en)
Sachs	Sachsenried(er)
Schwab W	Schwabelsberger Weiher (Kempten)
Schwarz	Schwarzenberg(er)
SF	Sonthofen
W	Weiher
-W	West(en)
Walt	Waltenhofen(er)
Werd	Werdenstein(er)

©Akademie d. Naturwissenschaften Hochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Widd	Widdumer(er)
♂	Männchen
♀	Weibchen
"♀"	weibchenfarbig

Alle Höhen sind in Normalnull (NN) angegeben.

Kilometer-Angaben hinter Fließgewässern geben die tatsächlichen Fluß- bzw. Bach-Kilometer an.

Der "Große Alpsee" bei Immenstadt wurde "Alpsee" genannt.

Sterntaucher (Gavia stellata)

1 Ex 16.11. Grünten See (PU)
1 Ex 26.11.-15.12., 2 Ex 11.12. Nied See (PU,WA)

Prachttaucher (Gavia arctica)

1 Ex 11.11. Teufelssee (Alpsee) (HE)
1 Ex 12.-16.11. Grüntensee (HE)
1 Ex auf schneebedeckter Wiese, wurde am nächsten Tag im Grüntensee (6 km nördlich) freigelassen.
23.11. Untergschwend (1010 m) (Unterjoch-N) (BESLER)
1 Ex 20.11. Nied See (PU)
1 Ex 18.12. Baggersee Blaichach-S (SC)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

mind 5 BP KE-Schwab W (MU,WA)
mind 3 BP Sachs W (WA)
2 BP Manzen W (FE)
1 BP Schwarz W (KR)
1 Brut (3 juv 3.9.) Konstanzer Ach (Ratholz) (SC)
6 balzen 12.4., 4 balzen 26.4. Widd W (SP)
5 Ex 31.1., 11 Ex 21.2., 3 Ex 2.4., 5 Ex 23.10., 4 Ex 4.12. I/KE → Südbrücken (3 km) (KU)
7 Ex 15.2. I/KE- Südbrücken → Nordbrücke (WA)
1-2 Ex 1.1. - 28.3. Baggersee SF-W (KG)
1-3 Ex Baggersee Blaichach-N (KG)

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Je 1 P mit je 4,3,2,1 und 1juv, 1 ad mit 1 juv 22.9., 2 ad füttern je 1 bettelndes juv (noch mit Kopfstreifung) 2.11. (!) Nied See (PU,WA)

8 ad mit 12 juv 20.8., je 1 P mit je 4 und 2 juv, 1 ad mit 1 juv 22.9. Ins See (PU)

1 P mit je 3,2 und 1 juv 26.8., 1 ad mit je 3,1,1und 1 juv 18.9., 1 P mit je 4 und 2 juv, 1 ad mit 1 juv 22.9., 1 ad mit 1 juv (2-3 Wochen alt) 11.10. Alpsee (HE,PU)

1 P mit 1 juv 8.7. Teufelssee (HE)
1P mit 3 juv 25. und 29.6., 2 juv 14.7.-17.8. Widd W (HE,HF PU,SP)
1 P mit 3 juv 8.7. Baggersee Seifen (HE,KG)
1 ad mit 1 pullus am Rücken 3.6. Öschlesee (WA)
1 P balzt 15.4. - 28.6. Sachs W (SP)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

7 Ex 7.1., 4 Ex 12.1., 3 Ex 15.1., 5 Ex 18.1., 3 Ex 26.1., 5 Ex 28.1.-10.2., 24 Ex 30.3., 33 Ex 8.4., 10 Ex 3.6. und Mitte bis Ende Okt., 8 Ex 2.11., 6 Ex 7.11., 9 Ex 10.11.,6 Ex 23.11., 1 Ex 25.11., kein Ex 26. und 28.11., 13 Ex 12.12., 14 Ex 13.12., Öschlesee (WA) Nachtrag: 31 Ex 15.4.

66 Ex 2.11., 76 Ex 10.11., 126 Ex 26.11., 55 Ex 8.12., 56 Ex 15.12., 41 Ex 21.12., 47 Ex 26.12., 27 Ex 28.12. Nied See (KG,WA)

10 Ex 12.2., 11 Ex 2.11., 8 Ex 6.11.,34 Ex 15.12., 1 Ex 26.12. Ins See (KG,WA)

15 Ex 14.10., 23 Ex 2.11., 38 Ex 26.12. Alpsee (FA,HZ,WA)
6 Ex 10.6., 26 Ex 2.11., 8 Ex 26.12. Grüntensee (WA)

Rothalstaucher (Podiceps grisegena)

1 Ex 6.1. Ins See (PU)
1 Ex 12. - 17.9., 2 Ex 23. und 29.9. Grüntensee (HE,PU)
1 Ex 23. - 25.11. Öschlesee (WA)

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

2 BP Grundweiher (Rückholz-N) (OAL) (KR)

2 Ex 12.5., 1 ad 2 juv 12.9., 4 Ex 17.9., 1 Ex 23.9., 2 Ex 26.9., 3 Ex 16. - 30.10., 2 Ex 2. und 16.11., 1 Ex 19.11. Grüntensee (HE,PU,SC,WA) Nachtrag: 1 Ex 29.9.

1 Ex 17.12. Alpsee (HE)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

1 - 5 immat vom 2.1.-31.3., 2 Ex 23.8., 1 Ex 14.9., 16. und 17.10., 13 Ex (Überflug nach W) 30.10., 19 sitzen in Baum 2.11., 1-5 Ex vom 1. - 27.11., 2 Ex 4. und 26.12. Alpsee (FA,HE,KG,MU,PU,SC,WA)

1 Ex 16.1., 6 Ex 19.3., 1 Ex 13.10., 4 Ex 13.11. I/Alt (DENZ,FE, HZ,KG,MU,WA)

7 Ex 15.1.,3 Ex 16.1. - 18.2., 1 Ex 19.3., 4 Ex 5.11., 3 Ex 6.u.7.11., 4 Ex 17.11., 1 Ex 4.12., 2 Ex 31.12. I/Kalden (FE,HZ,KG,MU, PARTECKE,PU,SP,WA,WI)

3 Ex 1.1., 2 Ex 15.4., 13 fliegen nach N 5.9., 8 Ex 7.9.
1 immat 17.12. Nied See (MU,PU,WA)

3 Ex 2.11., 2 Ex 26.12. InsSee (BR,WA)

3 Ex 17.9., 3 Ex und 58 Ex im Überflug nach W 30.10., 4 Ex 5.11., 1 immat 12.11., 21 Ex 16.11. Grüntensee (HE,PU)
2 Ex 12.12., 1 Ex 13.12. Öschlesee (WA)
6 Ex 1.1. KE (MU)
1 Ex 27.3. Baggersee Eggen (PU)
1 juv 4.9. Oyer W (Börwang-SO) (WA)
1 Ex 31.10. Baggersee SF-W (WERTH)

Es ziehen nach W bzw WSW:
25 Ex 24.9. Walt M (KG,MU)
6 Ex 5.10. KE-Mariaberg (MU)
15 - 18 Ex 15.10. Blender (MU)
48 Ex (in 3,25 Std.) 13.10. Osterhofen (Rechtis-SW) (HZ)
1 Ex 15.10. Salmaser Höhe (MU)
11 Ex (in 2,5 Std.)1.11., 20 Ex (in 6 Std.) 27.10. Stoffelberg (SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Rohrdommel (Botaurus stellaris)

1 Ex 14. und 15.9. Teufelssee (Alpsee) (HE)

Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

1 Ex 25.6. I/Kalden (FE,SN)

Seidenreiher (Egretta garzetta)

1 Ex 15.5. Kiesgrube bei Gruppenklärwerk (Krug-S) (PARTECKE)

Silberreiher (Casmerodius albus)

2 Ex 6.6. Moosmühle (Wildpoldsried-NW) (SN)

Graureiher (Ardea cinerea)

57 - 58 Bruten bzw. BP im Oberallgäu:

4 Bruten (3 Horste mit je 2 juv, 1 Horst mit 3 juv 14.5.) Haldenwang-W (HO)
3 - 4 BP I/Alt (FE,SP)
5 besetzte Horste 8.5. Krug-W (FE,HO)
15 besetzte Horste mit mind 38 juv 3.6. Nied See (PU)
9 besetzte Horste 19.6. Sinswang (Oberstaufen-N)(PU)
4 besetzte Horste ,(9 juv 20.6.) Immenstadt (HRADEK,PU,SC)
7 besetzte Horste (15 juv) Baggersee SF-W (HRADEK,KG,WE)
ca 10 BP Fischen, Nähe alter Schuttplatz (ST)

15 Ex 2.1., 12 Ex 16.1., 6.2. und 31.12. I/Alt (FE,WA,WI)
bis zu 8 Ex im Nov. Öschlesee (WA)
6 Ex 26.12. Alpsee (WA)
6 Ex 26.12. Grüntensee (WA)
1-4 Ex ganzjährig im Betz M (WA)
1-3 Ex von Mitte Sept. bis Mitte Dez. im Hindelanger Tal (DENZ)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

1 Ex 28.9. Frauenzell (WI)
1 Ex 9.10. Alt (WI)
1 zieht nach WSW 9.10. Hauchenberg (WA)
1 zieht nach W Osterhofen (Rechtis-SW) (HZ)
2 ziehen nach W 23.10. Hindelanger Tal (PARTECKE,SA)

Weißstorch (Ciconia ciconia)

1 ad 14.4., 4 Ex 24.9. Ins See (PU,SC)
1 Ex 24.4. Werd M-S (HE)
3 Ex im Frühjahr, 1 Ex 11.6. SF (KG)
1 Ex 11.6. Altstädten (WE)
1 Ex 8.5. Ratholz (HE)
1 Ex 18.5. Sachs W (SP)

3 Ex 19.-26.5., 8 Wx 11.8., 1 Ex 2. und 3.10. Walt M (FA,HZ,MU,HO, PU,SEIF)

2 Ex 30.5. und 9.-13.6. Öschlesee-S (KR,SP)
1 Ex 4. und 14.6. Diet-N (SP)
4 Ex im Überflug 10.6. KE (BR)
1 Ex 2 und 31.8. Alt (WI)
3 Ex 14.9., 4 Ex 23.9. Immenstadt-NO (PU,SC)

© Volkshochschule Kematen, download unter www.biologiezentrum.at

Höckerschwan (Cygnus olor)

1 P mit 6 juv 23.5. (5 juv 29.6. und 14.7.) Widd W (HE,HF,HO,SP)
1 P mit 3 juv (1 immutabilis) 9. und 17.6. Schwab W (KG,WA)
1 P mit 5 juv 22.7. KE-Steufzger W (HF)
1 BP Ins See (KG)
1 P mit 4 juv 2.7. Alpsee (HE)

46 Ex 16.1., 30 Ex 18.2., 44 Ex 16.3., 32 Ex auf Wiese 2.4.,62 Ex 20.4
33 Ex 31.12. I/Alt (FE,HZ,HO,WA)

7 Ex 16.1., 9 Ex 18.2., 7 Ex 16.3., 6 Ex 20.4., 39 Ex 24.9.,
42 Ex 14.10., 8 Ex 9.11., 22 Ex 31.12. I/Kalden (FE,HZ,KG,SP,WA,HO)

15 ad 7 immat (max) 14.2. Baggersee SF-W (KG)
22 Ex auf überfluteter Wiese 23.3. I/Krug (SP)
19 Ex 2.11. Grüntensee (WA)
25 Ex 3.2., 19 Ex 15.2. I/KE-Südbrücken ⟶ Nordbrücke (3 km)(WA)

Graugans (Anser anser)

1 BP (5 juv am 28.5.) I/Kalden (HAILER,SP,WA)

29 Ex 3.2., 1 Ex 15.2.-9.3., 18 Ex 23.11., 8 Ex 25.-28.11.,
4 Ex 20.12. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

1 Ex 28.4. Öschlesee (WA)

Brandgans (Tadorna tadorna)

1 ♂ 16.3., 1 juv 18.9., 1 ♀ 27.9., 1 Ex 9.10. (FA,HZ,PU,WI,WA)

Brautente (Aix sponsa)

1♂ 15.-17.2. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

Mandarinente (Aix galericulata)

1♀ 15.2. I/KE St.Mang Brücke (WA)
1♀ (unberingt) 10.11., 1P 29.12. Baggersee Blaichach-N (KG)
1♀ 31.12. Baggersee Rauhenzell-NW (HE)

Pfeifente (Anas penelope)

2♀ 29.1., 1♂2♀ 3.2.I/Alt (SP)
3 Ex 16.9. Nied See (HE)
5 Ex (Schlichtkleid) 23.10., 18 Ex 30.10., 1♂ 3♀ 16.11.
Grüntensee (PU)
1♂ 24.10. Schwab W (WA)
1-2 ♀ 30.10. - 11.11. Baggersee Blaichach-N (KG,WE)
1 Ex 1. -12.11. Alpsee (HE)
1♂ 2♀ 23.11. Öschlesee (WA)

Schnatterente (Anas strepera)

1♀ 17.9., 2 Ex 23.9., 2♀ 1.10., 1♂ 8.10., 1♀ 16.10., 1♂ 29.10.,
2♂ 5♀ 30.10., 10 Ex 31.10., 2 Ex 2.11., 3♂ 4♀ 5.11., 3♂ 2♀ 16.11.,
3 P 19.11. Grüntensee (HE,PU,WA)

2♂ 18.2., 3♂ 1♀ 19.3., 1♂ 16. und 20.4., 2 Ex 17.9., 1 P 18. und
31.12. I/Kalden (FE,HZ,KG,MU,PARTECKE,WA)

1 P 27.5. I/Krug-W (SP)

2 P 16.3., 1 P 26.3. Ins See (HO,PU)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

4 Ex 16.9., 1♂ 16.10. Nied See (HE,PU)
3 Ex 1.11. Alpsee (HE)
1♂ 4♀ 23.10. Widd W (SA)
2 P 22.4. Öschlesee (WA)
2 P 12.10. Schwab W (WA)
1♂ 31.10. Baggersee Blaichach-N (WE)

Krickente (Anas crecca)

1♀ mit 7 juv 11.6. Werd M (SC)
1 begonnenes Gelege (2 Eier) 28.4. Rauhenzeller M (KR)
1 P (Brutverdacht) Walt M (FA)
1 Brutverdacht (1♂ kreist über Schilf 10.6.) Großes Moos (Grüntensee (WA)
214 Ex 18.2., 195 Ex 16.3., 436 Ex 31.12. I/Alt (FE,HZ,MU,WA)
56 Ex 16.3., 75 Ex 31.10., ca 40 Ex 6.11. I/Kalden (HZ,SP)
11 Ex (meist ♂) 24.1. Baggersee Blaichach-S (KG)
7♂ 5♀ (max) 10.11. Baggersee Blaichach-N (KG)
5♂ 16♀ 28.11. Baggersee SF-W (KG)
55 Ex 2.11. Grüntensee (WA)

Stockente (Anas platyrhynchos)

5 - 6 BP (mind 85 Ex auf überschwemmter Wiese, 1♀ auf 4 Eiern in Reisighaufen 23.4., 1♀ mit 9 juv 26.6.) Betz M (WA)
3 BP KE-Rottach (WA)
1♀ mit 3 juv 17.6., 1♀ mit 6 juv 17.7. I/KE-S (KU)
1♀ mit 8 juv 21.5., 1♀ mit 7 juv 17.6. Schwab W (HO,KG)
1♀ mit 6 juv 25.6. Alpsee (KG)
1♀ mit 3 juv 28.5. I/Seifen (HE)
1♀ mit 5 juv 19.6. Wertach/Maria Rain (HE)
1♀ mit 6 juv 3.7. Heubach (Werd M-S) (HE)
1♀ mit 7 juv Baggersee SF-W (KG)
1♀ auf 5 Eiern 3.7. Gießener Bach (Seifen-S) (HE)
1 geraubtes Ei 31.5. Bruckmoos (Hochgreut-N) (WA)
1 P kopuliert (Nicken, Grunzpfiff, Baden) 3.10. Schwab W (WA)

530 Ex 16.1., 227 ♂ 123 ♀ 31.12. I/Alt (FE,MU,WA,HZ)
100 Ex (max) 18.2. I/Kalden (HZ)

87 Ex 31.1., 74 Ex 21.2., 45 Ex 2.4., 14 Ex 12.6., 22 Ex 17.6., 43 Ex 17.7., 55 Ex 28.8., 189 Ex 23.10., 263 Ex 4.12. I/KE-S ⟶ Südbrücken (3 km) (KU)

471 Ex 15.2. I/KE - Südbrücken ⟶ Nordbrücke (3 km) (WA)

ca 150 Ex fliegen am 18.8. zwischen 20 Uhr und 20.35 Uhr nach NNO ab, 195 Ex 17.10., 185 Ex 19.10., 275 Ex 24.10.; 1♂ noch im Schlichtkleid, nur um die Augen einige grüne Federchen 7.11. Schwab W (WA)

82♂ 78♀ 23.11. Öschlesee (WA)
114 Ex 26.12. Grüntensee (WA)
161♂ 119♀ 26.12., 244 Ex 28.12. Nied See (KG,WA)
230 Ex (ca 50% ♂) 9.1., 53♂ 52♀ 26.12., 126 Ex 28.12. Ins See (HO,KG,WA)
47♂ 26♀ 30.10., 157 Ex 29.12. Baggersee Blaichach-N (KG)

Spießente (Anas acuta)

1♂ 19. und 26.3. I/Alt (FE,KG,WA)
1♂ 29.3., 1 P 1.4., 1♂ 2.4. Ins See (HO,KG,WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1♀ 6.11. und 29.12. Grüntensee (WA)
1♂ 18.12. I/Kalden (PARTECKE)

Knäkente (Anas querquedula)

4♂ 1♀ 13.3. I/SF (KG)
2♂ 1♀ 30.3. Öschlesee (WA)
4♂ 3♀ 1.4., mind 5 P 2.4. Ins See (HO,KG)

1♂ 1.4., 6♂ 4♀ 11.4., 2 P 14.4., 1♂ 15.4., 2 Ex (Schlichtkleid) 17.9. Grüntensee (PU,WA)

1 P 12.4. Widd W (SP)
1♂ 20.4. I/Alt (HZ,MU)
2 "♀" 11.10. I/KE-Südbrücken (WA)
1 "♀" 19.10. Schwab W (WA)
1♂ 30.10., 1♀ 31.10. und 6.11. Baggersee Blaichach-N (KG,WE)

Löffelente (Anas clypeata)

5 P 29.3., 1♂ 30.3., 1♀ 20.11. Ins See (PU)
2 P auf überfluteter Wiese 29.3. Sachs W-SO (SP)
2 P 30.3., 3 Ex 16.9. Nied See (HE,WA)
1♂ 9.4. Teufelssee (HE)
1 P 19.4. Baggersee SF-W (KG)
1♀ 17.9., 2♂ 12♀ 30.10., 1♀ 3.12. Grüntensee (PU)
1 juv ♂ 12.10. Schwab W (WA)

Kolbenente (Netta rufina)

1♂ 2.1. Baggersee Sf-W (KG)
5♂ 2♀ 16.10. Alpsee (PU)
1♀ 30.10. Grüntensee (PU)
1 P 20.11., 1♀ 3.12. Baggersee Rauhenzell (HE)

Tafelente (Aythya ferina)

1 einzelnes ♂ gründelt über 1 Std. auf überschwemmter Wiese 18.3. Leubas (WA)
323 Ex (max) 16.1., 105♂ 61♀ 31.12. I/Alt (FE,HZ,MU,WA)
58 Ex 18.2., ca 120 Ex 17.11. I/Kalden (HZ,SP)
14 Ex 31.1., 18 Ex 21.2., 3 Ex 2.4., 2 Ex 4.12. I/KE-S ⟶ Südbrücken (3 km) (KU)
8♂ 3♀ 15.2. I/KE-Südbrücken ⟶ Nordbrücke (3 km) (WA)
46♂ 11♀ 9.3. I/KE-Riederau (HF)
ca 40 Ex 11.11. Widd W (HF,SP)
86 Ex 2.11., 83 Ex 26.12. Grüntensee (WA)
27♂ 19♀ 30.10., 39 Ex 29.12. Baggersee Blaichach-N (KG)
15 Ex (max) 29.2. Baggersee Blaichach-S (KG)
37 Ex (max) 5.2., 20♂ 15♀ 20.11. Baggersee SF-W (KG)

Moorente (Aythya nyroca)

1♂ 2.2. I/Alt (WI)
1♂ 10. und 15.3. I/KE-S (HARSCH,HZ,MU)
3 Ex 27.4. Baggersee SF-W (KG)
1 Ex 23.10., 1♂ 31.10. Grüntensee (HE,PU)

Reiherente (Aythya fuligula)

Keine Meldungen von Bruten für 1988 !
3-4 BP Sachs W (SP)
566 Ex 18.2.,896 Ex 16.3., 98♂ 87♀ 31.12. I/Alt (FE,HZ,MU,WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

155 Ex (max) 16.3. I/Kalden (HZ)
42♂ 18♀ 28.1. I/Krug-W (HF)
50♂ 17♀ 9.3. I/KE-Riederau (HF)

51 Ex 31.1., 119 Ex 21.2., 48 Ex 2.4., 2♂ 17.6., 16 Ex 17.7.,
2 Ex 28.8., 36 Ex 23.10., 33 Ex 4.12. I/KE-S ⟶ Südbrücken (3 km)(KU)

163 Ex 15.2. I/KE-Südbrücke ⟶ Nordbrücke (3 km) (WA)
37♂ 17♀ 23.3. Schwab W (WA)
22♂ auf überfluteter Wiese 24.3. Überbach (Diet-O) (SP)
34 Ex 28.12. Ins See (KG)
52 Ex 26.11. Nied See (WA)
242 Ex 2.11. Grüntensee (WA)
ca 80 Ex 2.11., 138 Ex (über 90% ♂) 26.12. Alpsee (WA)
30♂ 16♀ (max) 10.3. Baggersee Sf-W (KG)

Bergente (Aythya marila)

2 immat ♂ 17.1., 2♂ 6.2. Alpsee (HE,PU)
1♂ 4.4. Widd W (SC)
1♂ 9.10. I/Alt (WI)
2 "♀" 12.11. Grüntensee (PU)
2♀ 23.11. Öschlesee (WA)

Eiderente (Somateria mollissima)

1♀ 9.9. - 11.12. Alpsee (HE,PU)
2 "♀" 17.9., 1 "♀" 16.10. und 17.12. Grüntensee (HE,PU) 1♀ 23.9.
61 Ex (!) (weibchenfarbig, einige juv ♂) 16.9. Nied See (HE)
2♀ 1.10. I/Alt (FE)

1 "♀" 2.10.,3 "♀" 5.10., 3 juv 8.10., 1 juv 12. und 14.10.,
I/KE-S (Hegge) (HARSCH, HO,WA)

1♀ 8.10. I/KE - Südbrücken (WA)
1♀ 9.11. Baggersee SF-W (WE)
1♂ 5♀ (immature Ex zum Jahresende) Hopfensee (OAL) (ZUGLIANI)

Samtente (Melanitta fusca)

1♀ 12.11., 2♀ 1 juv♂ 16.11., 1♀ 12.-19.11. Grüntensee (HE,PU)
2♂ 3♀ 18. und 26.12., 1 immat ♂ 31.12. Alpsee (HE,KG,PU,WA)

Schellente (Bucephala clangula)

2 Ex 2.1., 1 Ex 8.1., 4 Ex 16.1., 2♀ 3.2., 3 Ex 6.2., 1♂ 2♀ 16.2.,
1♂ 3♀ 18.2., 2♂ 3♀ 22.2., 2♂ 2♀ 16.3., 3♂ 2♀ 19.3., 2 P 20.3.,
3 Ex 4.12., 2 Ex 24.12., 1♀ 31.12. (I/Alt (FE,HZ,HO,KG,MU,SP,WA)

2♂ 15.1., 1♂ 16.1., 8♂ 2♀ 18.2., 11♂ 11♀ 16.3., 4♂ 3♀ 19.3.,
3♂ 5.11., 2♂ 31.12. I/Kalden (HZ,KG,MU,PARTECKE,SP,WA)

1♀ 5.1., 2♂ 3♀ 26.3., 2♂ 30.3. Ins See (HO,PU,SA)
1 P 15.12. Nied See (WA)
5♀ 2.1., 1♂ 3♀ 5.1., 1♀ 9.1., 3♀ 16.1., 2♀ 29.1., 1♀ 5.11. und 31.12.
Alpsee (HE)
1♀ 12.11., 2♀ 1.12. Grüntensee (HE,WA)
1♂ 28.1., 4♂ 3♀ 3. und 4.2. Öschlesee (WA)
1♂ 21.2. und 10.3. I/KE-S (HARSCH,KU)
1♀ 1.-6.1. Baggersee Blaichach-S (KG)
1♂ 10.-13.3. Baggersee SF-W (KG)

© Volkshochschule Kempten; Download unter www.biologiezentrum.at

Zwergsäger (Mergellus albellus)

1♀ 5. - 30.1. und 26.12. Ins See (BR,PU,SA,WA)

Mittelsäger (Mergus serrator)

1♂ 16.11. Grüntensee (HE)
1♀ 26.11. Nied See (WA)

Gänsesäger (Mergus merganser)

2♀ mit 13 und 11 juv 21.5. I/Alt (FE)
1♀ mit 6 juv (ca 2 Tage alt) 29.5.-4.6. I/Steg bei Altstädten (STARK)
2♀ mit 7 juv 11.6. I/SF-S (KG)

1♀ mit 6 juv (2 Wochen alt), 1♀ mit 3 juv (4 Wochen alt) sowie 7 einzelne ♀ 2.7. I/Ursprung ⟶ KE-Hegge (HZ,MU,WA)

4 verschiedene Schofe (5,5,6 und 8 juv) 28.5. - 20.8. Iller zwischen Seifen-S und Werd M-S (HE)

1 P besetzt Nistkasten 19.4. I/Ried (Ottacker-W) (PU)
1 Brut Rottach (Rottachberg) (KR)

1♀ mit 1 juv (1 Woche alt) 3.6., 1♀ mit 6 juv 12. und 17.6. I/KE-S (KU,WA)

1♀ 18.5. Unterjoch (MU)
50 Ex 26.12. Ins See (BR,WA)
12♂ 11♀ 16.1., 63 Ex 28.12. Nied See (KG,KU)

14♂ 4♀ 13.2., 3♂ 1♀ 2.11., 35 Ex 16.11., 8♂ 18♀ 20.11., 4♂ 9♀ 1.12., 7♂ 9♀ 26.12., 18♂ 12♀ 29.12. Grüntensee (PU,WA)

1 P 4.2., 8♂ 19 "♀" 28.12. KE-Stadtweiher (HZ)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

1 Ex 12.5. Betz M (WA)
2 Ex 9.6. Obermaiselstein-S (HZ,MU)
1 Ex 1.8. Eschach/Kürnach (PU)
1 Ex 17.9. I/Kalden (MU)
1 Ex 21.9. Eckarts (SC)

Es ziehen nach W bzw WSW:
1 Ex 26.8. KE (PARTECKE)
63 Ex (eventuell auch einige Mäusebussarde) in 6,5 Std. 28.8. Salmaser Höhe (MU,KG)
6 Ex 28.8. Hauchenberg (PARTECKE)
6 Ex 27.8. Rieggis (Stoffelberg-W) (KG)
11 Ex 31.8. Siedel-Alpe (Alpsee-N) (KG)
2 Ex 3.9. Walt M (FA,PU)
mind 105 Ex (von 9 bis 16 Uhr)(davon 33 Wespenbussarde und 3 Mäusebussarde sicher bestimmt) 28.8. Salmaser Höhe (FA,HZ,MU)

Schwarzmilan (Milvus migrans)

1 BP (1 Ex 29.3.) I/Alt (FE,SP)
1 Ex 14. und 19.5. ! Walt M (HO,HZ,MU)
1 Ex 18.4. Eschach/Kürnach (HZ,MU)
1 Ex 21.4. und 22.5., 5 Ex 24.5., 1 Ex 30.5. und 2.6. Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)
1 Ex 25.4. Weitnau (MU)
1 Ex 4.5. Leubas (WA)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 7.5. Rauhenzeller M (SC)
1 frißt an Rinder-Placenta 12.5. Nied See (SA)
3 Ex 24.5. Betz M (WA)
1 Ex 28.5., 11. und 18.6.Widd W (KU,PARTECKE,PU)
mind 4 kreisen 28.5. Sulzberg-W (FA)
1 Ex 29.5. Missen-Wilhams (PU)
1 P 3. und 12.6. I/Eggen (BR,PU)

Rotmilan (Milvus milvus)

1 Ex 20.4., 1 P 25.4. bis 28.6. I/Kalden (HZ,MU,WA,WI)
1 Ex 1. und 25.4. Walt M (FA,PU)
2 Ex 5. und 8.4., 1 Ex 23.4. und 21.6. Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)
2 Ex 25.4. Weitnau (HZ,MU)
1 Ex 25.4. Haldenwang-NW (WA)
1 Ex 30.4. I/Seifen-O (HE)
1 Ex 29.5. Ins See (HO)
1 Ex 29.5. Missen-Wilhams (PU)
8 Ex ziehen nach W 9.10. Siedel-Alpe (Alpsee-N) (PU)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

2 "♀" 9.4., 1♂ 25.4., 1♀ 29.4. Walt M (FA,KR,PU)
1 zieht nach NO 4.4., 1 "♀" 9.4. Missen-Wilhams (PU,SA)
1♂ 9.4. Teufelssee (HE)
2♂ 1♀ 15.4. Sachs W (SP)
1♀ 15.5. I/Eggen (BR)
1♀ 28.5. WiddW (PARTECKE)
1♀ 23.9. Grüntensee (HE)
2 "♀" 9.10. Siedel-Alpe (Alpsee-N) (PU)

Kornweihe (Circus cyaneus)

1♂ 25.4. Walt M (KR)
Es ziehen nach W:
1 "♀" 5. und 15.10. Mariaberg-Blender (MU)
1♂ 19.10. Gottesackerplateau (2000 m) (FA,HZ)
2♂ 6♀ (in 15 min) 26.10. Riedbergerhorn (SA)
1♂ 7♀ (in 2,5 Std.) 27.10. Stoffelberg-W (SA)

Wiesenweihe (Circus pygargus)

1♀ 12.5. Betz M (WA)

Weißbürzelweihe (Circus spec.)

1 "♀" zieht nach W 14.10. Salmaser Höhe (FA)
1 "♀" zieht nach W Gottesacker-O (FA,HZ) 19.10.
2 Ex 5.11., 1 Ex 6.11. Grüntensee (PU)

Habicht (Accipiter gentilis)

1 Brut (2 juv) Alt-S (FE,WI)
1 Brut (1-2 juv) I/Alt (FA,WI)
1 BP Rottachmoos (SA)
Brutverdacht für Sibratshofen, Hauchenberg-N und Siplinger-N (SA)
1 balzt 2.4. Oytal (FA,PU)
Es ziehen nach SW:
8 Ex (in 2,5 Std.) 27.10., 22 Ex (in 6 Std.) 1.11. Stoffelberg-W (SA)
1 Ex 28.10. Gottesacker (SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Sperber (Accipiter nisus)

1 Brutverdacht Ried (Obermaiselstein-S) (SA)
1 P (wiederholt) Oberdorfer Wald (Nied See) (SC)
1 P balzt 2.5. Rottachberg (PU)
1 Ex fast täglich von Juni bis Ende Sept. Oy-NW (GROSSHAUS)
Es ziehen nach WSW:
1 Ex 9.10. Wertacher Hörnle (PARTECKE)
4 Ex (in 3 Std.) 15.10. Blender (MU)
Ansonsten weitere 21 Sichtbeobachtungen aus dem Oberallgäu (FA,DENZ,KG,PU,SP,WA)

Mäusebussard (Buteo buteo)

1 Brut (2 juv) Werd M (SC)
2 BP zwischen Gunzesrieder Säge und Scheidwang Alpe (SA)
1 P (Beuteübergabe) 26.5. Memhölz-N (FA)
7 Ex 19.3. I/Alt (KG,WA)
5 Ex 23.10. Sachs W-N (SP)

92 Bussarde (davon sicher 24 Mäusebussarde) ziehen in 3,2 Std. nach W 13.10. Osterhofen (Rechtis-SW) (HZ)

Nachmittags reger Zug nach SSW 23.10. Rottachberg (WA)
50 ziehen nach SW (in 6 Std.) 1.11.Stoffelberg-W (SA)

6 gewinnen kreisend an Höhe und ziehen nach SW ab 6.11., 2 kreisen im leichten Schneefall und streichen nach SW ab 21.11. KE-Haubenschloß (WA)

Schreiadler (Aquila pomarina)

Herr PUDIMAT gab folgendes zu Protokoll und bemerkte dazu, daß es sich bei dieser Beobachtung auch um einen immaturen Schelladler (Aquila clanga) gehandelt haben könnte!

" Am Sonntag den 30.10.1988 um ca. 11,15 Uhr entdeckte ich am Westufer des Grüntensees einen Greifvogel, der sich in Größe und Färbung von den durchziehenden Bussarden deutlich unterschied. In einer Entfernungvon 350 - 400 m tauchte er vor mir auf, flog in ca. 60 - 70 m Höhe und passierte mich seitwärts in 250 - 300 m Entfernung.

Es war zu der Zeit stark bewölkt und der Greif flog vor einem Bergrücken. Deutlich erkannte ich im Fernglas (10x40) einen Adlerschnabel und die brettartigen Flügel. Als mich dieser mittelgroße Adler passiert hatte, gelang es mir mein Dämmerungsspektiv (30x80) einzurichten. Dabei erkannte ich ganz deutlich eine Kette von hellen Punkten von der Handwurzel ausgehend bis zum Körper.

Der Greifvogel zog im aktiven Flug weiter ohne zu kreisen, deshalb konnte ich keine Zeichnung am Bürzel erkennen. Das Gefieder wies kaum Kontraste auf und war eher einfarbig dunkelbraun. Die Handwurzel war nicht auffällig heller. Eine Verwechslung mit einem dunklen Bussard schließe ich aufgrund des Schnabels, der Flügelform und der Größe aus."

Steinadler (Aquila chrysaetos)

1♂ 3.1. (kreist mit Beizadler) und 4.7., 1♀ (3-4 jährig)31.7., 1 P (Balz) 5.8.,°29. und 31.8. (schlägt Katze) im Westen und Süden von Altusried und Wiggensbach (WI) °1♂ 8.,

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Fischadler (Pandion haliaetus)

1 versucht ca 20 min lang zu fischen, dann Abflug nach Störung 26.4. Widd W (SP)

1 Ex im Überflug 30.10. Grüntensee (PU)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

1 Brut (Kopulation 9.4., bettelnde juv 27.6.) KE-Stadtkrankenhaus (HO,WA)
1 Brut Betz M (WA)
2 BP zwischen Tiefenbach und Obermaiselstein (SA)
1 BP Stillberg (Balderschwang-NW) (SA)
1 BP Hahnenkopf (Oytal) (SA)
1 BP Klupper (Spielmannsau-NW) (SA)
1 BP schöllang (WE)
1 BP Walt M (FA,PU)
1 BP (Kopulation 25.4.) Haldenwang-NW (WA)
1 P mit 1 flüggen juv 6.8. Gigglstein-S (FA,PU)
1 BP Alpsee-N (HE)
1♀ schlägt am 16.6. Beute und deponiert sie in der Zwerchwand (1480 m) (Bärgündele) (WA)/ 1 P balzt 7.5.Schafalpenköpfe-S (FA,PU)

Baumfalke (Falco subbuteo)

1 Brut (2 flügge juv) Dezion (Kimratshofen-SO) (WI)

6 Ex 12.6., 1 Ex 6.8., 1 füttert juv 18.8., 1 ad 1 juv 4.9. I/Seifen (HE)

6 Ex 28.5., 4 Ex 13.6., 7 jagen Libellen 18.6., 5 jagen Libellen 25.6., 4 Ex 14.7., 1 Ex 6. und 14.8.. bettelrufende juv 17.8. Widd W (HE,PARTECKE,PU,SA,SP)

1 Ex auf Schwalben-Jagd 15.9. KE-Nordbrücke (PARTECKE)
1 Ex 19.9. Alpsee (HE)

Ansonsten weitere 22 Sichtbeobachtungen an 13 Orten im Oberallgäu (frühestes Datum 26.4.) (ALBRECHT,FA,GROSSHAUS,HE,HF,KG,KR,SC,MU) SN,SP,WA)

Wanderfalke (Falco peregrinus)

Von 4 kontrollierten BP wurden 1988 im Oberallgäu nur von 1 BP 2 - 3 juv flügge (FA,HZ,MU,SA,WA)

Alpenschneehuhn (Lagopus mutus)

1 P mit 4 flüggen juv 31.7. Häbelesgund (1600 m) (Rotspitz-NO) (ST)

1 P mit 4-5 flüggen juv 4.8. Rappensee (2060 m) (ST)
2 Ex 27.7. Geißhorn (2200 m) (Kleinwalsertal-S) (ST)
10 Ex (Übergangskleid) 19.10. Ifenmulde (Gottesacker) (FA,HZ)
mind 9 Ex 27.12. Hehlekopf-SO (1950 m) (Ifen-SW) (HZ,MU)

Birkhuhn (Lyrurus tetrix)

1♂ balzt im zeitigen Frühjahr, 3♂ balzen 2.4., 2♂ balzen in den letzten Apriltagen, 1♂ 12.11. Grünten-S (KG,KR,WE)

Balzrufe am 2. und 29.4. Hahnenkopf-N (Oytal) (FA,PU)
1♂ balzt 17.4. Wertacher Hörnle (MU,SA)
1♂ balzt 23.4. Bolgen (1600 m) (ST)
1♂ - Rupfung 5.5. Willers-Alpe (1650 m) (Ponten-S) (PU)
2-3♀ 11.5. Stillberg-S (1400 m) (Balderschwang-NW) (HZ)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

12♂ 1♀ balzen 12.5. Piesenkopf (1400 - 1500 m) (SA)
4♂ (1 balzt) auf Fichte 12.5. Spieser-NW (PARTECKE)
5♂ 1♀ balzen 15.5., 2♂ 20.8. Balderschwang-S (FE,SN)
2♂ balzen 1♀ 29.5. Blaicherhorn (Balderschwang-O) (MU,SA)
7-9♂ balzen 30.5. Schwarzwasser Hütte (1650 m) (SA)
1♂ 3.6. Gatterkopf (MU)
3♂ 3♀ 9.10. Stillberg (1500 m) (Balderschwang-NW) (E.DÖRR)
1♂ balzt 23.10. Entschenkopf (1400 m) (SA)
1♂ balzt 28.10. Untere Gottesackerwände (1800 m) (SA)
1♂ balzt 28.10. Obere Gottesackerwände (1900 m) (SA)

Auerhuhn (Tetrao urogallus)

2♂ balzen 3♀ 17.4. Großer Wald (MU,SA)
1♂ balzt 12.5. Piesenkopf (SA)
1♀ 15.5. und 20.8., 2♀ 18.9. Balderschwang-S (SN)
1♀ 3.6. Gatterkopf (MU)
1 juv ♂ - Rupfung 20.7. Wertacher Hörnle-W (PU)
1♂ 1♀ 9.10. Stillberg (1500 m) (Balderschwang-NW) (E.DÖRR)

Wachtel (Coturnix coturnix)

1 Ex 17.5. Walt M (HZ,MU)

4-5 rufen 24.5., 3 rufen 27.5. und 19.6., 4 rufen 26.6.,
2 fliegen auf 7.8. Betz M (SA,SN,WA)

1 ruft 10. und 14.6. Rottachmoos (KR)

Fasan (Phasianus colchicus)

1♀ 2.5. KE-Haubenschloß (WA)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

1 Ex 11.8. Walt M (MU)
1 Ex 15.-22.9. Teufelssee (Alpsee-W) (HE)
1 Ex 15. und 30.10. Alpsee (HE)
1 Ex 17.9. I/Alt (FE)
1 Ex 18.9. Gießener Bach (Seifen-S) (HE)
1 Ex 23.9., 16. und 30.10. Grüntensee (HE,PU)
1 Ex 14.10. Baggersee SF-W (WE)
1 ruft 23.10. Widd W (SC)
1 Ex 14.11. Schwab W (WA)
1 Ex 18.12. Gruppenklärwerk Obere Iller (PU)

Tüpfelralle (Porzana porzana)

1 Ex 26.8. Alpsee (HE)
1 Ex 27.8. und 17.9. I/Alt (FE,KG,PARTECKE)
1 Ex 12.9. Grüntensee (HE)

Wiesenralle (Crex crex)

1 Ex (Sichtbeobachtung) 23.7. Gießener Bach (Seifen-S) (HE)

Teichralle (Gallinula chloropus)

mind 1 BP Manzen W (FE)
mind 1 BP Schwab W (WA)
1 P mit 2 juv 14.8. Widd W (HE)
1 P mit 1 juv 26.8. Teufelssee (HE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

2 juv 12.9. Grüntensee (HE)
1 Ex 3.11., 1 juv 17.11. Mühlweiher/Gräbelesmühle (HF)
1 juv 28.11. I/KE-St.Mang Brücke (WA)

Bleßralle (Fulica atra)

69 Ex (max) 16.3. I/Alt (HZ)
51 Ex (max) 16.3. I/Kalden (HZ)
38 Ex 31.1., 70 Ex 21.2. I/KE-S ⟶ Südbrücken (3 km) (KU)
394 Ex 15.2. I/KE-Südbrücken ⟶ Nordbrücke (3 km) (WA)

573 Ex 2.11.,1144 Ex 12.11., 128 Ex 26.11., 170 Ex 1.12., 285 Ex 26.12. Grüntensee (PU,WA)

50 - 60 Ex 11.11. Widd W (SP)
ca 170 Ex 2.1., 245 Ex 9.12. Baggersee SF-W (KG)
34 Ex 30.10., 216 Ex 29.12. Baggersee Blaichach-N (KG)
81 Ex 18.12. Baggersee Blaichach-S (KG)

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

1 Ex 3.4., 1 BP ab 29.4., 1 Gelege mit 4 Eiern, juv gechlüpft am 23.6. Baggersee Eggen (BR,HZ,MU,SA)

1 Brut (2 juv) Baggersee Seifen (HE,SA)
2 BP (3 juv am 15.5.) Gruppenklärwerk Krug-S (FE,KG,PARTECKE)
1 Ex 19.3., 1 BP (erfolglos) I/Krug-W (FE)
1 Ex 8.5. Herr W (MU)
1 warnt 19.5. Kiesgrube Diet-NO (WA)

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

4 immat 1.10. Grüntensee (PU)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

ca 25 Ex 13.3., 17 Ex 19.3., 10 P versuchen Mitte April zu brüten, 1 totes juv (3 Tage alt) und 1 P warnt heftig 12.5., 8 ad 11 juv 5.6. Betz M (HO,SN,WA)

ca 50 Ex 21.3., 60-65 Ex 30.3., keine erfolgreichen Bruten im Walt M (FA,KR)

4 Ex im März, keine Brut im Werd M (SC)
1 Ex 27.2. I/Alt (FE)
1 Ex 10.3., 15 Ex 14.3. Diet-N (SP)
14 Ex 15.3., 1 Ex 6.12. Leubas-S (WA)
2 Ex 19.3. Nied (KG)
1 Ex 31.3. - 22.4., 3 Ex 30.10. Alpsee (HE)
10 Ex 31.10. Grüntensee (HE)
ca 40 Ex 6.11. Ins See (PARTECKE)
1 Ex 9.11. Greggenhofen (KG)

Zwergstrandläufer (Calidris minuta)

1 Ex 20.8. und 18.9., 1 juv 27.9. I/Alt (FE,PU,WA)

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

1 Ex 8.-10.9. und 22.10. Alpsee (HE)
3 Ex 16.9., 2 Ex 17.9. I/Alt (FE,MU,PARTECKE)
2 Ex 1.10. Grüntensee (PU)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

Kampfläufer (Philomachus pugnax)

1 Ex 20.4. I/Alt (HZ,MU)

Bekassine (Gallinago gallinago)

3 - 4 BP Betz M (WA)

1 revieranzeigendes ♂ , mind 10 Ex 10.9., ca 50 Ex 31.10. Walt M (FA,KG,SA)

1 Ex 10.1., 5 Ex 4.2. Feuchtwiese bei Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)
1 Ex 15.3. Hochrainebach (Immenstadt) (HE)
1 Ex 23.3. Schwab W (HZ,WA)
3 Ex 4.4. Baggersee Eggen (BR)
2-3 Ex (öfters balzend) 7.4. - 12.11. Alpsee (HE)
1 Ex 1.-4.4. Gießener Bach (HE)
2 Ex 16.7. Werd M-N (SC)
2 Ex 23.9. und 1.12. Grüntensee (HE,WA)

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

1 balzt 17.6. Breitenmoos (HZ)
1 Ex 13.8. Kreuzthal (Schwedenschanze) (PU)
1 verletztes Ex Anf. Nov. Kemptener Wald (ANDERS,FE)

Uferschnepfe (Limosa limosa)

5 Ex (Übergangskleid) 26. und 27.3. Seifen (FA,HE,HO,PU)

Großbrachvogel (Numenius arquata)

3 Ex 27.5. Betz M (ANDERS)
6 Ex im Überflug 22.8. Alt (WI)
1 Ex fliegt nach W 10.9. Alpsee (HE)
3-4 Ex fliegen rufend nach SW 16.9. KE-Südbrücken (KU)

Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus)

1 Ex 20.8. I/Alt (FE)

Grünschenkel (Tringa nebularia)

1 Ex 12.8. I/WerdM-SO (HE)
1 Ex 13.8. Baggersee Seifen (HE)
2 Ex 27.8. I/Alt (FE,KG,PARTECKE)

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

2 Ex 2.1., 3 Ex 16.1., 1 Ex 14.2., 2 Ex 19.3., 1 Ex 17.9. und 24.12. I/Alt (FE,HZ,KG,MU,PARTECKE,WA)

1 Ex 18.3. Leubas-S (WA)
2 Ex 2.4. Ins See (HO)
1 Ex 9.4. Teufelssee (HE)
5 Ex 13.8., 1 Ex 29.9. Grüntensee (HE)
1 Ex 13.8. Gießener Bach (HE)
1 Ex 17.8. Walt M (FA,PU)
5 Ex 21.8. Werd M-S (HE)
9 Ex 23.8., 3 Ex 26.8. Alpsee (HE)

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

1 Ex 25.6. und 20.8., 4 Ex 27.8. I/Alt (FE,KG,PARTECKE)
2 Ex 8.5. Herr W (MU)
2 Ex 16.9. Schwarz W (WA)

© Volkshochschule Kempten; Download unter www.biologiezentrum.at

Flußuferläufer (Actitis hypoleucos)

1 BP Stillach/Faistenoy (SA)
1 BP Ostrach/Hinterstein (SA)
1 BP (Balz 22.4.) Bolgenach/Balderschwang-S (MU,SA)
2 BP (2 Ex 25.4., 3 juv (Nachgelege) 2.7.) I/Altstädten (KG,STARK,WE)

1 BP (1 P warnt am 24.6. heftig vom Boden und aus Büschen und Bäumen) I/Altwasser beim Wehr Sondert (Martinszell-S (WA)

2 Ex revieranzeigend Breitach/Ebnath (Oberstdorf-W) (FA)

3 Ex 30.4. und 7.5., 2 Ex 21.5., 1 Ex 28.5., 18 Ex 30.7., 11 Ex 20.8., 16 Ex 27.8., 2 Ex 16.9., 4 Ex 17.9., 1 Ex 20.11. und 4.12. I/Alt (FE,MU,PARTECKE)

3 Ex 5.8., 11 Ex 11.8., 2 Ex 17.9. I/Kalden (MU,SP)
1 Ex 29.1 (!), 3 Ex 23.8. I/Krug-W (SP)
1 Ex 28.4. Öschlesee (WA)
1 Ex 3.6. I/KE-S (Lange Insel) (WA)
1 Ex 29.6. Sachs W (SP)
1 Ex 10.5. und 9.6., 2 Ex 11.6. I/SF-S (KG)

1 Ex 25.6., 22.7. und 15.8., 15 Ex 23.8., 1 Ex 26.8., 2 Ex 10.9., 1 Ex 14.9. Alpsee (HE)

21 Ex (1 Ex warnt I/SF; 1 Fam) 2.7. I/Ursprung ⟶ KE-Hegge (40 km) (HZ,MU,WA)

2 Ex 16.7. - 13.8., 10 Ex 30.7. Baggersee Seifen (HE)
2 Ex 18.8. Gießener Bach (HE)
1 Ex 4.9., 12 Ex 5.9., 2 Ex 26.9. Nied See (HE,PETZ,WA)
1 Ex 12.9.Grüntensee (HE)
21 Ex 14.9. Baggersee SF-W (WE)

Zwergmöwe (Larus minutus)

1 immat 21.8. Baggersee Seifen (HE)
1 Ex 19.9. und 27.11. Alpsee (HE)
1 immat 23.9. Grüntensee (HE)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

50 - 65 BP (mind 120 Ex ab 29.3.) Sachs W (FA,SP,WA)
10 - 15 BP Schwab W (WA)

einzelne bis wenige Ex (wie auch in den letzten Jahren) von Dez. bis Feb. im Oberallgäu (WA)

1 einzelnes ad (Brutkleid) gründelt und stoßtaucht (aus der Schwimmlage) auf überschwemmter Wiese nach Regenwürmern 18.3., 298 Ex (darunter 7 immat) 21.3. auf überschwemmter Wiese Leubas-S (WA)

100 - 110 Ex 11. und 12.3., ca 45 Ex 13.3. SF (KG)
ca 60 Ex 30.3., 440 - 460 Ex 3.4. Öschlesee (WA)

Sturmmöwe (Larus canus)

2 Ex 9.1., 2 ad 15.1., 5 ad 1.2. Öschlesee (KU,WA)
3 ad 21.3. überschwemmte Wiese Leubas-S (WA)
1 ad 31.8. Teufelssee (KG)
2 ad 3 immat 5.11. Grüntensee (PU)
1 ad 16.11. Alpsee (PU)
2 immat 26.11. Nied See (WA)
12 ad 1 juv 15.12. Ins See (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Heringsmöwe (Larus fuscus)

1 ad 1.10. Grüntensee (PU)
1 ad 1 immat 31.12. Alpsee (HE)

Silbermöwe (Larus argentatus)

1 ad fliegt nach O 12.5. Betz M (WA)
1 ad 6 juv 17.7. Alpsee (HE)
1 ad 30.10. Grüntensee (PU)

Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

1 Ex 12.9., 1 juv 17.9. Grüntensee (HE,PU)
2 Ex 27.5. I/Alt (SP)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

1 Ex 4.5. Öschlesee (WA)
4 Ex 22.5. Nied See (BR)

Ringeltaube (Columba palumbus)

2 Ex 18.3. Betz M (WA)
2 Ex 28.3. SF-W (KG)
Es ziehen nach SW bzw WSW:
ca 800 Ex in 2 Std. 5.10. Ahegg-Mariaberg (MU)
ca 450 Ex (ein Trupp) 5.10. KE (WA)
ca 70 Ex 9.10. Sachs W-N (SP)
2826 Ex in 3,25 Std. 13.10. Osterhofen (Rechtis-SW) (HZ)
ca 2000 Ex in 3,25 Std. 15.10. Blender (MU)
Am 15.10. im gesamten Voralpengebiet starker Zug (MU)

Türkentaube (Streptopelia decaocto)

38 Ex sitzen in 3 benachbarten Pappeln 13.1. I/KE (WA)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

1 ruft 9.5. KE-Mariaberg (MU,WA)

Kuckuck (Cuculus canorus)

1 ruft 20.4. Eckarts (SC)
1 ruft 23.4. Moosbach-S (KU)
1 Ex 23.4. I/Alt (FE)
1 Ex 3.6. Vord. Krumbachalpe (1500 m) (Stuiben) (HE)
1 ruft 25.6. Hindelang-N (WA)
1 ruft 30.6. Oytalhaus (WA)

Uhu (Bubo bubo)

1 BP Rottachberg, 1 Ex 28.6. Rottachtobel (SA)
1 BP Steinbruch Burgberg (HRADEK,KG,WE)
1 ruft 4.2. KE-Riederau (ROTTMAR)
1 Ex 29.3. I/Kalden (FE,SN)
1 Ex 1.4., 1 ruft 18.6. I/Hirschdorf (PARTECKE,SA)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

1 ruft 17.4. Großer Wald (MU)
2 rufen 27.10. Höfats-S (1500 m) (SA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Waldkauz (Strix aluco)

1 BP Eckarts-W (SC)
1 ruft tags 18.2. I/Kalden (HZ)
1 Ex 29.3. I/Alt (FE)
1 ruft tags 14.4. Grünten-SO (1240 m) (HZ)
1 ruft 12.5. Ruine Wagegg (WA)

Waldohreule (Asio otus)

1 Brut (1 juv ruft am 26.6.) Betz M (WA)
1 Ex 26.3. Werd M (BR)

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

1 Ex 17.9. Grüntensee (PU)

Mauersegler (Apus apus)

Eine erfolgreiche Felsenbrut im Steigbachtobel bei Immenstadt (STARK)

3 Ex 28.4. Immenstadt (STARK)
vom 28.4. - 26.8. in SF und Umgebung (KG)
einige Ex 30.4., Ankunft der Brutpopulation 3.5. KE (MU)
1 Ex 30.4., 4 Ex 10.9. I/Alt (FE)
1 Ex 30.4. Martinszell (SN)
1 Ex 30.4. Alpsee (MU)

Alpensegler (Apus melba)

1 Ex 1.4. KE-Riederau (BR)
1 Ex 10.4. KE-Stadtkrankenhaus (SA)

Eisvogel (Alcedo atthis)

2 Ex 21.8., 1 Ex 3.9., 2 Ex 16.10. I/bzw Baggersee Seifen (HE,SC)
1 Ex 21.8. und 18.9. Gießener Bach (HE)
1 Ex 12.9. und 12.11. Grüntensee (HE,PU)
1 Ex 22.9. und 6.11. Alpsee (HE)
1-2 ad füttern 2 juv August, 1 Ex 15.9. und 11.10. Baggersee-SF-W (KG,KOCHSCHMID,WE)
1 Ex 28.9. I/Rottach (HE)
1 Ex 23.10. und 26.11. Nied See (HE,SA,WA)
1 Ex 6.11. und 26.12. Ins See (PARTECKE,WA)

Bienenfresser (Merops apiaster)

2 Ex 30.5. Petersthal-N (880 m) (ELINGIUS)

2 Ex wurden bereits wenige Tage vor dem 30.5. im Rottachtal (Nähe Staudamm) beobachtet (WA)

1 Ex 7.8. Alpsee (HE)

Wiedehopf (Upupa epops)

1 Ex 15.4. Gräbelesmühle (Lauben-S) (HF)
1 Ex 16.4. Grüntensee (HE)
1 Ex 18.4. und 30.7. I/Alt (FE)
2 Ex 28.4. Eckarts (SC)
1 Ex 28.7. Kiesgrube Seebach (KOPF)
1 Ex 4.9. Alpsee (HE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Wendehals (Jynx torquilla)

1 Brut (4 juv im Nistkasten) Eckarts-S (SC)
1 Ex 16.4. I/Alt (FE)
1 Ex 23.4. Thaler Höhe (960 m) (HE)
1 Ex Mai I/SF (WE)
1 Ex 17.9. - 2.10. im Garten in Krug (FE)

Grauspecht (Picus canus)

1♂ ruft 18.4., 2 Ex 18.7. Kiesgrube Eschach/Kürnach (HZ,MU,PU)
1 ruft 25.6. Hindelang-N (WA)

Grünspecht (Picus viridis)

1 Brut, 2-3 rufen 12.11. Roßbergalpe-S (Grünten) (KG,KR,WE)
1 Ex 31.3. Burgberg (WA)
1 ruft 11.4. Dummelsmoos (Oberstdorf-N) (HZ)
1 ruft 15.4. Piesenkopf-S (FA)
1 ruft 16.4. Balderschwang (FA)
1 Ex 23.4. und 8.5. Thaler Höhe (HE)
1 Ex 30.4. Hirschberg (FA,PU)
1 Ex 30.5. Hinterstein-SO (SP)
1 Ex 9.10. Reckenberg (Hindelang-W) (DENZ)
2 rufen 1.11. Buralpkopf-S (WE)

Schwarzspecht (Dryocopus martius)

1 Brut Schattenberg (1400 m) (Oberstdorf-SO) (ST)
1 Brut Roßberg-Alpe-S (Grünten) (KR)
1♀ 24.2., 1 Ex 10.6., 1♂ 9. und 12.11.,1 Ex 9.12. Reich M (SP)
1 Ex 29.4. I/Alt (FA)
1 ruft 1.5. Rubihorn-W (1200 m) (ST)
1 Ex 4.6. Hinang (HE)
1 ruft 16.7. Giebelhaus (KG)
1 ruft 8.9. Imberg-SO (KG)
1 Ex 23.10. Gr.Daumen (1400 m) (PARTECKE)
1 Ex 27.10. Schorenmoos (SP)
1 ruft 1.11. Buralpkopf-S (WE)
1 ruft 31.12. I/Kalden (FE,WA)

Weißrückenspecht (Picoides leucotos)

1 P 1.5. Roßberg-Alpe-S (Grünten) (KR)
1♀ 23.5. Spielmannsau-NW (1100 m) (SA)
1♀ 23.5. Riffenkopf-W (Oytal) (SA)

Kleinspecht (Picoides minor)

4 Ex Anf.Januar am Futterhaus in Lauben (HF)
1 Ex 12.4. Altwasser Lauben (HF)
1 Ex 1.4. I/Seifen-O (HE)
1♂ 27.4. I/Reich (KR)
1 Ex 9.6. I/SF-S (KG,WE)
1♀ 12.9. Grüntensee (HE)
1♀ 26.10. Walt M (KR)

Dreizehenspecht (Picoides tridactylus)

1 füttert juv in 3 m hoher Fichtenhöhle 15.6., 2-3 Ex 21.7. Kreuzelspitz (1350 m) (Grünten) (MU)
mind 3-4 trommeln 17.4. Großer Wald (MU)

© Volkshochschule Kempten. Download unter www.biologiezentrum.at

1 trommelt 29.5. Siplinger-S (MU)
1 trommelt 30.5. Retterschwanger Tal (MU)
1♀ 1.11. Hirschberg-S (1260 m) (DENZ)
1 Ex 5. und 12.11. Roßberg-Alpe (1350 m) (Grünten-S) (KG,WE)

Heidelerche (Lullula arborea)

2 ziehen nach WSW 5.10. KE-Mariaberg (MU)
1 Ex im Überflug nach W 19.10. Gottesackerplateau (2000 m) (FA,HZ)

Feldlerche (Alauda arvensis)

1 Ex 15.2. KE-Bachtel W (WA)
1 Ex 20.2., 65 Ex 19.3. I/Alt (FE,WA)
2 Ex 22.2. KE (KU)
1 Ex auf geschlossener Schneedecke 23.2. Spielmannsau (1000 m)(MU)
2 Ex 24.2. Haldenwang (SN)
5 Ex (1 Ex wird von Wanderfalke angegriffen) 28.2. I/SF (KG)
12 Ex 18.3. Leubas-S (WA)
7 Ex 18.3., ca 70 Ex 26.3. Betz M (WA)
ca 100 Ex 21. und 25.3. Probstried-S (KOPF)
ca 100 Ex 26.3. Seifen (FA,PU)
27 Ex 24.9. , 10 Ex 15.10. Walt M (KG)
15 Ex im Überflug 15.10. Betz M (WA)

Regelmäßig überfliegen Trupps mit 2 -10 Ex am 19.10. das Gottesacker-Plateau (2000 m) (HZ)

28 Ex 5.11. Baggersee SF-W (WE)

Uferschwalbe (Riparia riparia)

3 Ex 28.5., 2 Ex 4.9., 10 Ex 14.9. Alpsee (HE)
ca 50 Ex 12.9. Grüntensee (HE)
1 Ex 17.9. I/Alt (MU)

Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris)

1 P 7. und 12.5., bis zu 3 Ex im Juni, Steinbruch Burgberg (HE, HRADEK)
1-2 Ex 12.4. Trettachtal (MU)
2 Ex (4 Beobachtungen im Mai) Rottachberg (HRADEK)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

1 Ex fliegt am 17.6. in Falkenalpe aus und ein (1160 m) (Stuiben-SO) (HE)
1 singt 30.3., 1 Ex 9.4. Börwang (WA)
2 Ex 2.4. Eckarts (SC)
1 Ex 5.4. Langenwang (HZ)
6 Ex 8.4. Öschlesee (WA)
4 Ex 8.4. I/Alt (FE)
1 Ex 9.4. KE (KR)
1 Ex 9.4. Ratholz (HE)
Ab 10.4. in SF und Umgebung (KG)
1 Ex 11.4. Diet-N (SP)
3 Ex 12.4. Haldenwang (WA)
1 Ex 12.4. Widd W (SP)
11 Ex 25.10. Diet-N (SP)
1 Ex 30.10. SF (KG)
4 Ex 30.10. Blaichach-N (KG)
3 fangen Insekten 2.11. Nied See (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

2 Ex 3.11., 1 Ex 16.11. SF (DENZ,WE)
1 Ex 3.12. (!) Eckarts (SC)

Es ziehen nach SW bzw WSW:
12 Ex 27.9. Krottenkopf (2656 m) (MU)

Mäßiger Zug (ca 100 Ex pro Stunde) am 5.10. spärlicher Zug am 10.10. KE-Schwab W (WA)

467 Ex (in 3 Std.) 9.10. Hauchenberg (WA)

Starker Zug nach SSW in Trupps von ca je 20 Ex mittags und nachmittags 10.10. Diet-N (SP)

Es fallen ins Schilf ein:
1100 - 1300 Ex (20,30 - 20,45 Uhr) 17.8., ca 1700 Ex (20,20 Uhr) 28.8., ca 1600 Ex (20,20 Uhr) 30.8., ca 1100 Ex (19,57 - 20,04 Uhr) 7.9. Schwab W (WA)
3000 - 3200 Ex (19,55 - 20,05 Uhr) 4. und 5.9. Nied See -O (WA)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

52 besetzte Nester an einem Bauernhof in Faistenoy (ca 900 m) (Oberstdorf-S (HZ)
1 Ex 24.4. Börwang (WA)
Vom 29.4. - 8.10. in SF und Umgebung (KG)
6 Ex 1.5. Probstried-O (KOPF)
4 Ex 1.5. Diet-N (SP)
5 Ex 8.5. Ratholz (HE)
6 Ex 1.10. Agathazell (DENZ)
1 Ex 10.10. Lauben (SN)
starker Zug nach SW 10.10. Diet-N (SP)

Baumpieper (Anthus trivialis)

1 Ex 11.3. I/KE (WA)
1 singt 14.6. Laufbichelkirche-S (1600 m) (SA)

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

3-4 BP (5 Ex 18.3., 8 Ex 15.10. Betz M(WA)
3 BP Rottachmoos (KR,MU,SA)
mind 4 singen (1 P futtertragend 21.5.) Walt M (FA,MU)
1 singt 1.-14.4. Mittl. Ins See (PU)
2 singen 25.4. Weitnau-O (MU)
2 singen 16.6. Schöneberg (Alt-SW) (SA)
1 singt 4.7. Börlas (PU)
1 Ex futtertragend 4.7. Diepolz (PU)

Es singen am 22.6. und 9.7. in feuchten Senken (meist mit Bach) inmitten von Wirtschaftswiesen: 1 Ex Eschachried (1010 m), 1 Ex Eschach (980 m), 1 Ex Hahnemoos (980 m) (Eschach W-O), 1 Ex Notzen (840 m) (Ermengerst-W) (WA)

12 ziehen nach WSW (in 3 Std.) 9.10. Hauchenberg (WA)
1 Ex 20. und 23.11. Hindelang (DENZ)

Wasserpieper (Anthus spinoletta)

3-5 BP Balderschwang-N (1100 m) (SC)
1 fliegt aus fertigem Nest ohne Eier 15.5. Hochschelpen (1550 m) (Balderscheang-S) (FE,SN)
1 P füttert 11.6. Hörmoos Alpe (1380m) (Hoher Hädrich-N) (HE)

© Volkshochschule Kerpen download unter www.biologiezentrum.at

1-2 singen trotz meterhoher geschlossener Schneedecke 2.4. Ob.Wilhelminen Alpe 1500 m) (Siplingerkopf-SO) (MU)
1 balzt 3.6. Vord. Krumbachalpe (1550 m) (HE)
7 singen am 30.6. von 1280 - 2030 m Lochgern-Kessel ⟶ Höfats-SO (WA)
3 Ex 28.1.,1 Ex 24.2.-14.3.,3 Ex (Brutkleid)30.3.,1 Ex 12.12. Öschlesee (WA)
2-8 Ex Jan. bis April Betz M (WA)
1 Ex 2.2. I/KE (WA)
2 Ex 23.4. Thaler Höhe (1020 m) (HE)
21 Ex 12.10., 2 Ex 7.11. Schwab W (WA)
1 Ex 31.12. I/Alt (FE,WA)

Schafstelze (Motacilla flava)

1♀ füttert 1 flügges juv 3.7. Grüntensee bei Haslach (SC)
1 Ex 9.4. Lauben (SN)
3 Ex 10.4. I/Alt (FE)
1 Ex 15.5. Ermengerst (FA)
2 Ex 30.8. Schwab W (WA)
15 Ex 9.9., 3 Ex 10.9. Teufelssee (HE)
1 Ex 18.9. Gießener Bach (HE)
4 Ex 20.9. I/Seifen-O (HE)
ca 40 Ex 23.9., 2 Ex 24.9. Walt M (FA,KG)
3 Ex 23.9. Grüntensee-S (HE)

Bergstelze (Motacilla cinerea)

1♂ 3.6. Vord. Krumbachalpe (1550 m) (HE)
1 singt 16.6. Stierbach (1420 m) (Bärgündele) (WA)
15 Ex 2.7. I/Ursprung ⟶ KE-Hegge (HZ,MU,WA)
2 Ex 22.7. Lochgern (1390 m) (Höfats-O)(WA)

Bachstelze (Motacilla alba)

Junge der 2. Brut fliegen am 28.8. aus Diet (SP)
1 Ex 2.1., 2 Ex 8.1., 1 Ex 16.1. I/Alt (FE)
1 Ex 7.1., 2 Ex 24.2., 3 Ex 9.3., 10 Ex 11.3., 11 Ex 14.3. I/KE (WA)
1 Ex 29.1. und 9.3. Diet-N (SP)
2 Ex 21.2. I/Seifen (HE)
Vom 28.2. - 2.10. in SF und Umgebung (KG)
32 Ex auf Wiese 17.3. Leubas-S (WA)
200 - 250 Ex 30.3. Walt M (KR)

Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)

1♂ 23.6. (!) Ofterschwang (PARTSCH)
10 Ex 26.12. Werd M (BR)
2 Ex 28.12. KE-Stadtweiher (HZ)

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

26 Ex 2.7. I/Ursprung ⟶ KE-Hegge (HZ,MU,WA)

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

1 singt 16.7. Engeratsgundsee-S (1780 m) (WA)
1 läßt am 15.10. während der Nahrungssuche im Weidengebüsch Herbstgesang (bzw Jugendgesang) ertönen: ein 2-3 sec dauerndes stammelndes Gezwitscher (WA)

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

1 singt 20.3. Börwang-NO (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 27.3. I/Alt (FE)
1 singt 28.3. Börwang (WA)
1 singt 30.3. Nied See (WA)
1 Ex 3.4. Walt M (KG)

Alpenbraunelle (Laiscopus collaris)

1 ad mit 3 juv 16.7. Engeratsgundsee (1890 m) (KG,WA)
1 füttert rufende juv im Gras 1.8. Fiderepaßhütte (ST)
1 singt 5.5. Zirleseck-S (Ponten-SO) (PU)
1 Ex 12.5. Hüttenkopf (1800 m) Gerstruben-W (ST)
1 Ex 29.5. Steinbruch Burgberg (HE)
3 Ex 10.6. Buralpkopf (HZ)
1 singt 16.6. Zwerchwand (1680 m) (Bärgündele) (WA)
4 ad 30.6. Eissee (1880 m) (WA)

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

1 singt 7.5. I/Alt (FE)

Blaukehlchen (Cyanosylvia svecica)

1 P füttert 2 flügge juv im lockeren Altschilf; die Altvögel attackieren und vertreiben 2 Flußuferläufer 18.8. Gießener Bach (708 m) (Seifen) (HE)

1♂ 14.9. Alpsee (HE)

Zwergschnäpper (Erythrosterna parva)

1 ad ♂ auf einer Buche 15.4. Wiggensbach-S (H.ANWANDER)

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

1 P füttert im Nistkasten 14.8. Engeratsgundhof (1150 m) (SA)
1 Brut (Nistkasten) Oberstdorf-S (ST)
1♀ 15.4. Ins See (PU)
1♀ 23.4. Börwang (WA)
1 Ex 24.4. I/Kalden (SN)
1 singt 11.5. Balderschwang (MU)
1 singt 13. - 18.5. KE-Haubenschloß (WA)
1 singt 13.5. Altwasser Lauben (HF)
1 singt 26.5. Trettachtal (MU)
1 singt 27.5. Rohrmoos (HZ,MU)
1♀ 17.9. I/SF (KG)

Hausrotschwanz (Phoenicurusochruros)

1♂ 19.3. Krug (KG)
1♀ 21.3. Diet-N (SP)
1 Ex 21.3. Probstried (KOPF)
1♂ 26.3. Betz M (WA)
1 singt 30.3. Börwang (WA)
2 Ex 30.3. Nied See (WA)
1 Ex 8. und 9.10. SF (DENZ,KG)
2 Ex 14.10. Alt-N (SP)

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

1 P füttert 3 juv 17.6. Falkenalpe (1160 m) (HE)
1♂ 13.4., 1 singt 13. und 18.5. KE-Haubenschloß (WA)
1♂ 14.4. Eckarts (SC)
1♂ 23.4. Börwang (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1♂ 24.4. Baggersee Seifen (HE)
1♂ 12.5. SF (STARK)
1 singt 27.5. Rohrmoos (HZ)
1 singt 29.5. KE-Weidach (HZ)
1 singt 10.6. KE-Lindauerstr. (PARTECKE)
1 Ex 6.9. Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)
1♂ 10.9. Alpsee (HE)
4 Ex 17.9., 1♀ 18.9., 1 "♀" 27.9. I/Alt (FA,KOPF,PU,WA)
1 juv ♂ 5.10. KE (WA)

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

1 P füttert 2 juv 8.7. Alpsee-W (HE)
1 P (♂ füttert) 10.7. Hölle (Ratholz-W) (HE)
mind 2 BP (1 x 3 flügge juv) und 1-2♂ Walt M (FA)
mind 5 BP (12♂ 7♀ revieranzeigend 28.5.) Rottachmoos (KR,SA)
3 singen 15.5. Oberstdorf-S (ST)
1 singt 15.5. Ermengerst-NW (FA)
2 singen 27.5. Obermaiselstein-S (HZ)
6♂ 1♀ 24.4. I/Burgratz (HZ)
2 Ex 8.9. Rohrmoos (ST)
1♂ 1♀ 19.9. Oberjoch (DENZ)
1 Ex 8.10. Walt M (PU)

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

1♂ 26.3. Betz M (am Ort des vorjährigen Brutversuches) (WA)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

1♂ 5.5., 1 singt und attackiert Murmeltier 14.6. Laufbichelkirche-S (1500 m) (SA)
1♂ 2.4., 1 Ex 15.10. Walt M (HO,KG)
1♂ 14.4. Hauchenberg-S (SA)
1 Ex 21.10. Hindelang (DENZ)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

1 singt 15.3. Obermaiselstein-S (HZ)
6 Ex 17.3. Leubas-S (WA)
10 Ex 18.3., 3 Ex 15.10. Betz M (WA)
1 singt 19.3. I/Alt (WA)
1 singt am 31.3. im Ort Burgberg auf alter Weide (WA)
ca 20 ziehen am 2.4. in 1 Std. nach Osten, Bleichhorn-Siplinger (1490 m) (MU)
3 Ex 16.6. Stierbach (1430 m) (Bärgündele) (WA)
5 Ex 22.7. Seilhenker-SO (1540 m) (Stuibenfall) (WA)
4 Ex 12.11. Grünten-S (KG)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

1 P mit 5 Ästlingen 25.4. Schwab W (HO)
2-3 BP Stierbach (1430 m) (Bärgündele) (WA)
40 Ex 31.1., 1 singt 19.3., 1 Ex 31.12. I/Alt (SN,WA)
56 Ex (1 singt) 17.2.,60 - 70 Ex 30.11. Reich M (SP)
210 Ex 6.12. Leubas-S (WA)

In Schwarzerlen, die einen kleinen Baggersee einsäumen fallen zum Schlafen ein, Haldenwang-NW:
120 Ex 27.10., 101 Ex (17,13 -17,25 Uhr) 28.10. (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Ringdrossel (Turdus torquatus)

1 Ex 10.4. Alpsee (HE)
4 singen 14.4. Hauchenberg (SA)
1 Ex 23.4., 2 Ex 8.5. Thaler Höhe (1020 m) (HE)
1 Ex 11.6. Hörmoos Alpe (1330 m) (Hoher Häderich-N) (HE)
8-9 Ex (1 Ex mit Nistmaterial) 16.7. Engeratsgundsee (KG,WA)

Amsel (Turdus merula)

1 singt 15.2. KE-Bachtel W (WA)
1 singt 16.2. Börwang (WA)
1 Ex 16.6. Stierbach (1430 m) (Bärgündele) (WA)

1 Ex mit leisem Jugendgesang (Schnabel wird dabei nicht geöffnet) 1.12. Börwang (WA)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

1 Ex 14.3. I/SF (KG)
4 Ex 18.3. Leubas (WA)
30 - 40 Ex 26.3. Widdum (FA,PU)
12 Ex 26.3. Betz M (WA)
8 Ex 27.3., 1 Ex 2.4. Seifen (HE)
1 Ex 12.10. KE-Haubenschloß (WA)
1 Ex 15.10., 2-3 Ex 12.11. Walt M (FA,KG)
ca 100 übernachten am 1.11. im Auwald, Stillach/Birgsau (PU)
2 Ex 4.11. SF-W (WE)
5 Ex 10.11. Ins See (WA)
2 Ex 22.11. Börwang-NW (WA)

Singdrossel (Turdus philomelos)

1 frißt auf Schnee kriechende Steinfliegen (Capnia nigra) 9.3. I/KE (WA)

12 Ex (1 singt) 18.3., 1 Ex 15.10. Betz M (WA)
1 singt 19.3. I/Alt (WA)

Feldschwirl (Locustella naevia)

1 singt 1.5., 6 singen 12.5., 2 singen 24.5. Betz M (WA)
1 singt 13.5. Ins See (WA)
mind 1 singt 19. und 31.5. Walt M (FA,MU)
1 singt 3.6. Widd W (PU)

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)

1 singt 12.5. Betz M (WA)

Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola)

1 Ex aus bis zu 6 m Entfernung beobachtet 17.9. Alpsee (HE)

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

1 P füttert 3 flügge juv 3.7. Gundbach/Fischen (ST)

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

3 singen 4.5. Öschlesee (WA)
3 singen 12. und 24.5., 4 singen 26.6. Betz M (WA)
4 singen 13.5. Ins See (WA)
9 singen 19.5. Sachs W (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex kilometerweit weg von nächsten stehenden Gewässer 19.5. Diet-NO (WA)
5 singen 9. und 17.6. Schwab W (KG,WA)
2 singen 18.6. Oyer Weiher (Börwang-SO)(WA)

Gelbspötter (Hippolais icterina)

1 singt 8.5. Börwang (WA)
1 singt 3.7. Fischen (ST)

Weißbartgrasmücke (Sylvia cantillans)

1♂ am 1.5. über 2 Std. mit Fernglas und Fernrohr in Weiden beobachtet, Ratholz (730 m) (Alpsee-W) (HE)

Dorngrasmücke (Sylvia communis)

1 Brut (4 juv) Nähe Bahndamm, Werd M-O (SC)
2 singen 23.4. (später verschwunden) Betz M (WA)
1 singt 19.5. Sachs W (WA)
1 Ex 28.5. Rottachmoos (SA)
1 Ex 12.6. Baggersee Eggen (BR)

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

1 BP (1 singt 23.4., 1 Ex 15.10.) Betz M (WA)
1 Ex 30.5. Grünhorn (2000 m) (Ifen-S) (SA)
1 singt 30.6. Widenfeldhütte-W (1500 m) (Gr.Wilder-SW) (WA)

Gartengrasmücke (Sylvia borin)

1 singt 24.4. Walt M (HZ)

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

3♂ 2♀ 8.4. I/SF (KG)
2♂ 1♀ 10.4. I/Rauhenzell (HE)
1♂ 12.4. I/Alt (FE)
1 singt, 1♀ 13.4. Börwang (WA)

1 singt 16.4., 1♂ spottet gewaltig (Singdrossel, Teichrohrsänger, Braunkehlchen usw.), nur die letzten Elemente der Strophe sind arteigene Töne 23.4. Betz M (WA)

1♀ 17.4. Probstried (KOPF)
2 singen 16.6. Zwerchwand (1550 m) (Bärgündele) (WA)
1 singt 30.6. und 22.7. Höfats-SO (1540 m) (WA)

Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli)

4-6 BP Werd M (SC)

18 singen auf 65 ha Fläche 30.5. Bruckmoos (Spirkenhochmoor mit sukzessierten Torfstichen, 840 m NN) (Hochgreut-N) (WA)

2 singen 10.6. Großes Moos (Grüntensee) (WA)
1 singt 11.6. Sommerau (Buchenberg-W) (WA)
2 singen 25.6. Hindelang-NO (1320 m) (WA)

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)

3 singen 18.4. KE-Rottach (WA)
1 singt 30.4. I/Alt (FE)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

1 singt 21.3. Probstried (KOPF)
3 Ex 23.3. Schwab W (WA)
1 singt 26.3. Widdum (FA,PU)
1 singt 26.3. I/Alt (FE)
1 Ex 28.3. I/SF (KG)
3 Ex 29.3. I/Krug-W (SP)
2 Ex 29.3. I/Kalden (SP)
1 singt 30.3. Ins See (WA)
3 singen 30.3. Nied See (WA)
1 singt 30.3. Blaichach (WA)
3 singen 30.3. Bad Oberdorf-SW (HZ)
1 singt 2.6. Grünten (1470 m) (MU)
1 singt 16.6. Zwerchwand (1550 m) (Bärgündele) (WA)

1 verschwindet mit Futter oder Nistmaterial in Latschen, 30.6. Hinterer Wilder-W (1520 m) (WA)

1 singt 30.6. Höfats-SO (1560 m) (WA)
1 singt 30.6. und 22.7. Hinterer Wilder-W (1560 m) (WA)

1 singt Ende Juni bis Mitte Juli von Fernsehantenne (13 m hoch) morgens, mittags und abends sehr lange Strophen (30 - 100 Silben, maximal 110 Silben ohne Unterbrechung) Börwang (WA)

1 singt 16.7. Engeratsgundsee-S (1610 m) (WA)
3 singen 15.10. Betz M (WA)
mind 5 Ex 16.10. I/SF (KG)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

1 singt 28.3. I/Alt (FE)
2 Ex 29.3. Sachs W (SP)
1 Ex 31.3. Alt-N (SP)
1 singt 12.4. KE (WA)

Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus)

2 Ex 28.3. Baggersee SF-W (KG)
1♂ 31.3., 1 singt 3.4. Burgberg (WA)
6 Ex 4.4. Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)
2 Ex 8.4., 1 Ex 9.10. I/SF (KG)
1 P baut Nest 7m hoch in Fichte 23.4. Betz M (WA)
1 Ex 3.10. Börwang (WA)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

1 Ex mit Nistmaterial 20.3. I/Alt (HO)
1 P mit Nistmaterial 29.3. I/Seifen (SC)
1 P Nestbau 2.4. I/Alt (FE)

1 P baut am Nest (Innenausbau), 11m hoch in Eichenstammgabelung, (am 12.5. zerstört) 1.5. Betz M (WA)

1 P Nestbau (17m hoch außen in Fichte) 14.5. KE-Rottach (WA)
1 Fam. 3.6. I/KE-S (WA)
1 Fam. (8 Ex) 9.6. Schwab W (WA)
1 Fam. 10.6. Grüntensee (WA)

16 Familien 2.7. I/Ursprung ⟶ KE-Hegge °(HZ,MU,WA) °=(40 km)

Weidenmeise (Parus montanus)

3 singen 30.3., 1 singt 26.12. Nied See (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Tannenmeise (Parus ater)

1 singt 29.1. KE-Haubenschloß (WA)
1 singt 19.3. I/Alt (WA)

Kohlmeise (Parus major)

1 Familie 30.6. Seilhenker-O (1220 m) (Höfats-NO) (WA)
1 singt 26.12. Ins See (WA)
1 singt 26.12. Nied See (WA)

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

1 Ex 3.6. Gatterkopf (MU)
1 fliegt am 8.9. vom Imberger Horn Richtung Grünten (KG,WE)
1 Ex 1.11. Mindelheimer Hütte-SO (PU)
1 Ex 26. und 29.12., 2 Ex (1 singt) 30.12. Steinbruch Burgberg (DENZ,WA)

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)

1 singt 9.3. I/KE (WA)

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

1 P16.4. Betz M (WA)
6 Ex 12.5. Werd M (SC)
4 Ex 27.9., 1 ruft 14.10. Alpsee (FA,HE)
2 Ex 8.10. Walt M (PU)

Pirol (Oriolus oriolus)

1♂ 16.5. Eckarts (SC)
1 juv 3.9. Baggersee Seifen (HE)

Dornwürger (Lanius collurio)

1 Brut (2 flügge juv) Ölstauden (Manzen W-O) (WI)
1 Brut Betz M (WA)

1 Brut (ad füttern am Nest 8.7.) Kiesgrube zwischen Börwang und Fleschützen (825 m) (WA)

1 P mit juv 16.7. I/Fluhmühle-N (SN)
1 BP Rottachmoos (KR,SA)
1 BP Vorderburg-O (HE)
2 BP Gebiet Widd W (HE)
1 BP Alpsee (HE)
1 BP Schöllang (WE)
1 P kopuliert wiederholt 29.5. Ins See (HO)
1 P 24.5. Haldenwang-N (SA)
1♀ bis 23.9. Käsers (Alt-SW) (ALBRECHT)

Raubwürger (Lanius excubitor)

1 Ex 10.1. Widd W (SC)
1 Ex 16.1. Ins See (PU)
1 Ex 24.1. - 18.3. Betz M (WA)
1 Ex 28.2. SF-W (KG)
1 Ex 10. - 15.3. I/Hegge (KE-S) (HARSCH,MU)
2 Ex 26.3. Baggersee Eggen (BR)
1 Ex 1.4. Baggersee Seifen (HE)
1 Ex 22.10. - 5.11., 1 rupft Beute 31.12. Alpsee (HE,KG)

© Volkshochschule Kempten; download unter www.biologiezentrum.at

1 Ex 5.12. Nied See (KR)
1 Ex 10.12. Salmaser Höhe (850 m) (PU)
1 Ex 17.12. Walt M (PU)

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

1 Ex 16.6. Pointhütte (1350 m) (Bärgündele) (WA)
Es ziehen nach O bzw NO:
mind 21 Ex 16.4. Balderschwanger Tal (FA)
ca 20 Ex 19.4. Alt-SW (ALBRECHT)
33 Ex 30.4. Salmaser Höhe (PARTECKE)

Elster (Pica pica)

1 Ex 13.1. Hehlekopf(1700 m) (Ifen-SW) (SA)
3 Ex 6.4. Grünten-O (1500 m) (HZ)

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

mind 1 BP Kronholz (Börwang-NO) (WA)
1986, 87 und 88 1 P zur Brutzeit im Walt M (KR)

1 Ex Mitte Mai bis Mitte Juni im Rottachmoos, immer wieder in unmittelbarer Nähe eines Bienenstockes (KR)

Wie in allen Jahren zur Zeit der Hasel-Reife (Kerne noch milchig) vom Mariaberg, Wirlinger Wald und Kemptener Wald kommend, in der Stadt Kempten (KR)

Alpendohle (Pyrrhocorax graculus)

7 BP fliegen am 16.6. paarweise zum und vom Vorderen Wilden-W; Brutplätze zwischen 1900 und 2000 m (WA)

10 P 30.6. Hinterer Wilder (1950 m) (WA)
ca 100 kreisen 16.2. Ponten (FA,MU)
ca 70 Ex 7. und 30.3. Hinterstein (FA,HZ,MU)
ca 250 kreisen 2.4. Seeköpfel (Oytal) (FA,PU)
150 - 200 Ex 11.4. Schattenberg (MU)
ca 80 kreisen 11.4. Oberstdorf (HZ)
ca 40 kreisen 16.4. Siplinger-S (FA)
40 Ex 30.6. Rauheck (WA)
ca 30 kreisen 18.10. Ifen (FA,HZ)
12 Ex 3.11., 31 Ex 17.11. Hindelang (DENZ)

Dohle (Corvus monedula)

ca 15 BP (tragen am 1.4. Nistmaterial ein) KE-Spinnerei Kottern (KU)
2 BP Kirchturm Reich (SP)

ca 40 fliegen am 9.8., 55 fliegen am 11.8. zum Schlafplatz I/KE-Kreiskrankenhaus (WA)

54 Ex auf Wiese 8.11., 55 Ex 23.12. Leubas-S (WA)

Es ziehen nach W:
2 Trupp (ca 60 und 20 Ex) 29.10. Alt-SW (ALBRECHT)
3 Ex 1.11. Stoffelberg (SA)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

1400 - 1500 Ex auf Wiese 13.3. Börwang (WA)
mind 80 Ex 18.10., 67 Ex 30.11. SF-W (KG,WE)
ca 140 Ex 1. und 2.12. KE-N (WA)

© Volkshochschule Kempten, Download unter www.biologiezentrum.at

Es ziehen nach W:
ca 620 Ex (1 Trupp) 12.10. KE (WA)
ca 650 Ex (in 2,5 Std.) 27.10., 276 Ex (in 6 Std.) 1.11. Stoffelberg-W (SA)

Rabenkrähe (Corvus corone corone)

34 Ex Nahrungssuche auf Wiese 24.1. und 16.2., 40 Ex 15.10. Betz M (WA)

1 frißt an einer Bezoarkugel im Schnee 15.2. Bachtel W (WA)
1 P Horstbau 30.3. Nied See (WA)
31 Ex auf Wiese 1.12. Diet-N (SP)
2 nehmen im Flug Nahrung von Wasseroberfläche auf 15.12. Ins See (WA)
53 Ex auf Wiese 29.12. Agathazell (DENZ)

Es fliegen zwischen KE-Kreiskrankenhaus und Iller Richtung S zu ihren Schlafplätzen:
9.8. (wolkenlos) 20 - 21,10 Uhr 134 Ex
10.8. (bedeckt) 20,05 - 21,10 Uhr 125 Ex
11.8. (cirrig bewölkt) 19,55 - 21,10 Uhr 158 Ex
12.8. (bewölkt, W-Wind) 19,55 - 20,45 Uhr 130 Ex
13.8. (wolkenlos) 20 - 21,10 Uhr 142 Ex
14.8. (fast wolkenlos) 19,55 - 21,05 Uhr 114 Ex
15.8. (leichte Cirren) 20 - 21 Uhr 104 Ex (WA)

ca 140 kreisen über Schlafplatz 12.11. Börwang-NW (WA)

Kolkrabe (Corvus corax)

1 Brut (futtertragendes ♂ ab 21.3., futtertragendes ♀ ab 17.4) Graben-S (KE-S) (KR)

1 P füttert 3 juv 23.6. Grünten-NW (PU)
1 BP (4 bettelnde juv 12.6.) Hauchenberg (PU,SA)
1 BP (brütet am 29.3.) Ehrenschwanger Tal (MU)
1 BP Hindelang-N (KG,WA)
1 BP Retterschwanger Tal (SA)
1 BP (erfolglos) Stillberg (Balderschwang-NW (SA)
1 BP KE-Mariaberg (KR)
1 P am Horst 10.3. Spitzwand (Rohrmoos-SW) (FA,MU)

1 P befliegt Horst in "Sandwich"-Bauweise: Neuaufbau auf ca 10 cm hoher Schneeschicht auf altem Horst 19.3. Aubachtal (Gunzesried-W) (HZ,MU)

1 Brutverdacht Unterm Buch (Sulzberg) (SA)
1 Brutverdacht Nied-SW (SA)
1 fliegt Horst an 2.4. Höfats-N (FA,PU)
1 P 20.2. Ostertalberg (Stuiben-S) (HZ)
1 P 2.3. Ratholz-S (Alpsee) (HZ)
ca 30 Ex 20.1., 20 Ex 1.11. Hindelang-N (DENZ,SA)
ca 40 kreisen 29.1. Spieser (FA)
mind 24 kreisen 16.2. Jochschrofen (HZ)
ca 20 Ex 21.4. Stuiben (SA)
17 kreisen 14.10. Immenstädter Horn (FA)
ca 25 kreisen 7.11. Mindelheimer Hütte (FA)

Star (Sturnus vulgaris)

ca 90 Ex 8.2., 45 Ex 10.2., ca 30 Ex 28.10. KE (WA)
ca 40 Ex 11.2. Probstried (KOPF)

© Volkshochschule Kematen. Download unter www.biologiezentrum.at

14 Ex 14.2., 3 singen 27.9. I/Alt (FE,WA)
3 Ex 16.2. Betz M (WA)
27 Ex 17.2. Reich M (SP)
9 Ex 7.11. Agathazell (DENZ)
15 Ex 6.12. Leubas-S (WA)

Anfangs ca 100 Ex später ca 50 Ex nächtigen vom 9.Sept. bis Mitte Sept. im Schilf, Alpsee-W (HE)

Schlafplatz Manzenweiher:
980 Ex (von S und SO) fliegen am 10.9. von 19-19,50 Uhr ins Schilf ein (FE)

Schlafplatz Sachs W:
ca 3600 Ex (von S) fliegen am 12.9. von 19-19,40 Uhr ins Schilf ein (FE)

Schlafplatz Öschlesee:
1310 Ex (von ONO und SO) fliegen am 21.9. von 19,10 - 19,25 Uhr ins Schilf ein (Sonne verschwindet am 19,05 am Horizont),
Einige von ONO kommende Schwärme (z.B. einer mit ca 450 Ex) überfliegen den Öschlesee und ziehen zum 6 km entfernten Niedersonthofener See weiter. Manche Schwärme spalten sich über dem See auch auf: z.B. fallen von 230 ankommenden Ex 130 am Öschlesee ein, während der Rest um Nied See weiterfliegt! (WA)

Schlafplatz Nied See:
Es fallen ins Schilf ein (Einflug von NO,O und S):
5.9. (19-19,50 Uhr) 8420 Ex
8.9. (19,10-19,45 Uhr) 8020 Ex

Schlafplatz Schwab W:
Es fallen ins Schilf ein (Einflug von N,O und S):
17.8. (19,55 - 20,30 Uhr) 8530 Ex
18.8. (19,55 - 20,35 Uhr) 9820 Ex
28.8. (19,40 - 20,15 Uhr) 3150 Ex
30.8. (19,30 - 20,05 Uhr) 4040 Ex
7.9. (19,20 - 19,45 Uhr) 3720 Ex
22.9. (18,55 - 19,20 Uhr) 1480 Ex
(Am 30.8. verschwindet die Sonne am Horizont um 19,36 Uhr, am 7.9. um 19,22 Uhr).
Truppgröße am 22.9. nur noch 10 - 50 Ex oder weniger, gegenüber von bis zu 400 Ex im August (WA)

<u>Haussperling</u> (Passer domesticus)

ca 55 Ex (zusammen mit ca 30 Feldsperlingen) lärmen den ganzen Dezember im Holunder-Hartriegel-Gebüsch, Börwang (WA)

<u>Feldsperling</u> (Passer montanus)

1 P brütet seit Jahren im Nistkasten (1988 2 Jahresbruten) Kressen (1000 m) (Oy-NW) (GROSSHAUS)

ca 30 Ex (zusammen mit Haussperlingen den ganzen Dezember in Holunder-Hartriegel-Gebüsch, Börwang (WA)

<u>Schneesperling</u> (Montifringilla nivalis)

1 Ex 19.4. Großer Daumen-S (2000 m) (SA)
1 Ex 30.5., 12-15 Ex 27.12. Hehlekopf (1800 - 1980 m) (Ifen-SW) (HZ,MU,SA)
1 Ex 27.7. Geißhorn (2000 m) (Kl.Walsertal-S) (ST)
1-2 rufen 19.10. Gottesacker (FA,HZ)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Buchfink (Fringilla coelebs)

3 singen 17.2. Kürnach (SPONSEL)
1♀ 17.12. Börwang (WA)

Es ziehen nach W:

Sehr reger Zug am 5.10. (alle 2 min. passieren 30 - 80 Ex auf einer Breite von 250 m), KE-Haubenschloß und KE-Schwab W (WA)

751 Ex in 3 Std. 9.10. Hauchenberg (WA)
Starker Zug 9.10. Wertacher Hörnle (PARTECKE)

Reger Zug am 10.10. (alle 2 min. passieren 30 - 50 Ex auf einer Breite von 250 m) mäßiger Zug am 24.10. KE-Haubenschloß und KE-Bahnhof (WA)

Starker ganztägiger Zug (10-15 Ex pro Trupp) 10.10. Diet-N (SP)
mind 100 Ex ziehen nach W 19.10. Gottesacker (2000 m) (HZ)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

2♂ 4.4. Walt M (HO)
bis zum 8.4. in SF und Umgebung (KG)
3 Ex 10.4., 1 Ex 11.4. KE-Haubenschloß (WA)
3 Ex 15.4. Schwab W (WA)
10 ziehen in 3 Std. nach WSW 9.10. Hauchenberg (WA)
2 Ex 10.10. Diet-N (SP)
8 Ex 15.10. Betz M (WA)
3-4 ziehen nach W 19.10. Gottesacker (2000 m) (HZ)
ca 500 Ex 4.11. Kehralpe (Grünten) (WE)

Girlitz (Serinus serinus)

1 singt 14.4. Schwab W (HZ)
1 singt 16.4. I/Alt (FE)
5 singen (auf 1,5 km Wegstrecke) 24.6. Schwab W (WA)
1 singt 22.7. Schattenberg-W (920 m) (WA)

Zitronengirlitz (Serinus citrinella)

2 Ex 19.4., 3-4 Ex 5.11. Grünten-S (MU,WE)
1-2 P 10.6. Hint.Wiesle Alpe (1250 m) (Buralpkopf-S) (HZ)
4-6 P 10.6. Gündles Alpe-O (Buralpkopf-SO) (HZ,MU)
1-2 Ex 12.6. Sederer-N (Stuiben-W) (MU)
1 ruft 22.7. Trauberg-Alpe (Fürschießer-N) (FA,MU)
1 ad mit 1 juv 25.7. Faltenbachtal (1360 m) (Nebelhorn-SW) (MU)
2 Ex 6.8. Grünten-O (FA,PU)
ca 20 Ex 23.10. Entschenrücken-S (PARTECKE)

Grünfink (Chloris chloris)

ca 60 Ex 24.1., ca 80 Ex auf gemähter Wiese 26.6. Betz M (WA)
Bis zu ca 150 Ex auf gemähter Wiese 8.7. Alt-SW (ALBRECHT)

Stieglitz (Carduelis carduelis)

1 P baut Nest 30.4. Krug (FE)
10 Ex 1.1. Untrasried-NW (KOPF)
1 Ex 4.2. KE (HZ)
4 Ex 22.7. Seilhenker-O (1240 m) (Höfats-NO) (WA)
22 ziehen in 3 Std. nach WSW 9.10. Hauchenberg (WA)
1 Ex 15.12. Ins See (WA)
1 Ex am Futterhaus 18.12. Börwang (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Erlenzeisig (Spinus spinus)

ca 20 Ex an Ampfer 25.9. Riedbergpaß (1400 m) (SC)
80 - 100 Ex 19.10. Ifenmulde (FA,HZ)
20 ziehen nach W 1.11. Stoffelberg-W (SA)

Birkenzeisig (Acanthis flammea)

2 BP Werd M (SC)

Bluthänfling (Acanthis cannabina)

1 P 11.6. Hoher Häderich-N (1330 m) (HE)
1 P 16.7. Laufbichelkirche-O (1520 m) (KG,WA)
5 Ex (1 singt) in Kiesgrube 19.5. Diet-NO (WA)
1 singt 15.6. Buchenberg-O (HZ)
2 ziehen 19.10. Gottesacker (HZ)
1 Ex 11.11. Blaichach-N (KG)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

1 P füttert 3 flügge juv 14.3. Werd Wald (SC)
1 singt 9.1. Blender (PARTECKE)
9 Ex im Überflug 30.6. Kl.Wilder (2100 m) (WA)
11 Ex 22.7. Wildenfeldhütte (1820 m) (Gr.Wilder) (WA)
ca 50 Ex19.10. Auenhütte (FA,HZ)

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

1 BP (1 Partner brütet oder hudert am 7.5. 15 m hoch in noch unbelaubtem Bergahorn I/Fischers) (WA)

3 Ex 30.6. Seilhenker-O (1240 m) (Höfats-NO) (WA)

Es ziehen nach W:
17 Ex in 3 Std. 9.10. Hauchenberg (WA)
8 Ex 14.10. Salmaser Höhe (FA,HZ)

Goldammer (Emberiza citrinella)

1 P füttert 16.7. I/Werd M-S (HE)

Regelmäßiger Brutvogel in den Kiesgruben bei Dietmannsried sowie im Weitnauer Tal, Wengener Tal und von Sonthofen bis Hindelang. Im Illertal zwischen Dietmannsried und Immenstadt ist sie trotz potentieller Bruthabitate sehr selten bis nicht anzutreffen. (SA)

2 Ex 25.2., 3 Ex 26.2. Alt-SW (ALBRECHT)
ca 30 Ex auf Futtersuche am Bauernhof 27.2. Lanzen (Walt-N)(FA)
1 singt 16.6. Hinterstein-SO (910 m) (WA)

Ortolan (Emberiza hortulana)

Bis zu 3 Ex an Fütterung 21.-26.4. Walt M (KR)
1 Ex 24.4. Burgratz (Sulzberg-SW) (HZ,MU,SA)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

1♂ 4.1. Alpsee (SC)
1♂ 21.2. I/Seifen (HE)
1♂ 9.-14.3. I/KE (WA)
2 Ex 19.3. I/Alt (FE,KG,WA)
6 Ex 23.3. Schwab W (WA)
2 Ex im Überflug 19.10. Gottesacker (FA,HZ)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

1♂ 2.11. Öschlesee (WA)
1 Ex 2.11. Grüntensee (WA)
1 Ex 15.12. Ins See (WA)

Anschrift des Verfassers:

Dietmar WALTER
An der Gasse 18
D - 8961 - B ö r w a n g

Eine Falken-Raubmöwe (Stercorarius longicaudus) bei Dietmannsried (Oberallgäu)

Von Dietmar WALTER, Börwang

Am 22. Sept. 1987 bemerkte ich gegen 18,30 Uhr auf der Verbindungsstraße Krugzell - Dietmannsried (10 km nördlich von Kempten/Allgäu) einen möwenähnlichen Vogel, der direkt am Fahrbahnrand einen plattgefahrenen Sperling zu kröpfen versuchte. Bei Annäherung auf knapp 2 m flog der Vogel auf und landete nach 10 m in einer Wiese um jedoch bald darauf wieder im niedrigen Flug (ca. 2 m Höhe) an seinen Kröpfplatz zurückzukehren. In den nächsten 10 min flog er immer wieder einmal, durch Fahrzeuge aufgescheucht, dicht neben und über der Fahrbahn. Beim Landen machte er meist einen sehr unsicheren, geschwächten Eindruck, indem er sich mit ausgestreckten Flügeln nach vorne abstützte, ähnlich dem Manteln eines Greifes. Schließlich wurde die immature Raubmöwe - als solche hatte ich sie inzwischen erkannt - bei einem ihrer riskanten Straßenüberflüge von einem LKW erfaßt und schwer verletzt. Ein zufällig vorbeikommender Tierarzt konnte ihr die erlösende Todesspritze verabreichen.

Die Messungen am toten Vogel ergaben: Flügellänge: 300 mm; Spannweite: 950 mm; Lauflänge: 39 mm; Kopf-Schwanz-Länge (bei normaler Körperhaltung, einschließlich der beiden mittleren Steuerfedern, die die übrigen um 21 mm überragten): 350 mm; Gewicht: 170 g.

Durch Vergleich dieser Daten, sowie der Form und Farbe der Schwanzfedern und des übrigen Gefieders mit den Angaben der ein-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: 29_1

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1988 -. 55-90