

Vogelzug im Oberallgäu - 1989

=====

Von Dietmar WALTER, Börwang

Besonders in den Monaten September und Oktober erfolgt, von den meisten unbemerkt, der herbstliche Vogelzug im Oberallgäu. Wie seit Mitte der 80-er Jahre bekannt, ist die Quantität wie die Qualität der Durchzügler nicht unbeträchtlich! Die Zugdaten der Jahre 1986 und 1987 hat Martin MUTH in dem Aufsatz "Erste Erkenntnisse der herbstlichen Vogelzugbeobachtung im Oberallgäu" zusammengefaßt. (Mitt. Naturwiss. Arbeitskr. Kempten, Jahrgang 28: 97-106). Die Zugdaten des Jahres 1988 wurden in den "Avifaunistischen Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1988" aufgeführt (Jahrgang 29/1 55-90). Da der Umfang des Datenmaterials stark zugenommen hat, werden die Zugbeobachtungen des Jahres 1989 in diesem Beitrag gesondert zusammengefaßt.

Nun liegen auch einige Daten über den Frühjahrszug im Oberallgäu vor. Dieser ist, wie erwartet, viel weniger augenfällig als der Herbstzug. Jedoch dürften sich auch hier, bei intensiverer Beobachtungstätigkeit, sicher noch eine Reihe interessanter Befunde aufzeigen lassen! Über den nächtlichen Vogelzug unseres Gebietes liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Bezüglich des Herbstzuges konnten eine Reihe von Vermutungen erhärtet werden, aber ebenso viele neue Fragen tauchten auf. Unter allen am Tag durchziehenden Arten sind der Buchfink (*Fringilla coelebs*) und die Ringeltaube (*Columba palumbus*) zahlenmäßig mit Abstand am stärksten vertreten. Das hochgerechnete Tagesmaximum für die Ringeltaube lag Mitte Oktober für einen optimalen Beobachtungsort etwa bei 8000 - 10 000 Individuen. Die Gesamtsumme an durchziehenden Ringeltauben betrug zB. am 13.10.1989 an vier, etwa linear in Nord-Süd-Richtung angeordneten Beobachtungspunkten, deren nördlichster und südlichster 35 km entfernt lagen, etwa 24 000 Ex., die der ziehenden Buchfinken bei rund 20 000 Ex. (Beobachtungsdauer jeweils durchschnittlich 8.5 Stunden).

Berücksichtigt man, daß auf dieser genannten Beobachtungslinie 5 - 6 Zugtäler nicht kontrolliert werden konnten, so ergibt sich auf dieser 35 km langen Strecke eine Tagesgesamtmenge von mindestens 60 000 - 70 000 ziehenden Ringeltauben ! Die vergleichbaren Zahlen für den Buchfinken lägen bei ca. 200 000 - 250 000 Individuen pro Tag, da die Beobachtungsbreite für diesen Kleinvogel bei nur etwa 600 - 800 m liegt und diese Art gleichmäßiger verteilt zieht, als die mehr an die Talflanken gebundene Ringeltaube.

Aber auch für die Arten Wiesenpieper (*Anthus pratensis*), Bachstelze (*Motacilla alba*), Bergfink (*Fringilla montifringilla*) und Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) liegen die Tagesmaxima an einem guten Beobachtungspunkt mindestens zwischen 500 und 1000 Individuen.


Einige Arten, wie zB. Mäusebussard (*Buteo buteo*), Sperber (*Accipiter nisus*), Feldlerche (*Alauda arvensis*) und Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) scheinen mehr das flachere, nördlichere Oberallgäu auf ihrem Zug zu durchqueren. Das vorliegende Datenmaterial ist aber immer noch zu lückenhaft um gesicherte Aussagen über den jahres- und tageszeitlichen Hauptzug, sowie über eventuell bevorzugte Routen einzelner Arten zu machen

Im folgenden sind die Einzeldaten für den Frühjahrs- und Herbstzug aufgeführt. Hinter dem jeweiligen Beobachtungsdatum wird in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) angegeben. In der angefügten Kartenskizze des Oberallgäus sind die wichtigsten Beobachtungspunkte verzeichnet.

Abkürzungen:

Hauch	Hauchenberg	FA	FARKASCHOVSKY, H.
Hohe	Hohe Schulter(Hochgreut-S)	HZ	HERZ, H.
KE	Kempten	KG	KRIEGL, J.M.
Pfarr	PfarrAlpe (Gr.Alpsee-NW)	MU	MUTH, M.
Ried	Riedbergpaß	NU	NUNNER, A.
Salm	Salmaser Höhe	PA	PARTECKE, J.
Scheid	Scheidewang-Alpe (Rindalphorn-S)	PU	PUDIMAT, K.
Schmid	Schmidsreute (Wiggensbach-W)	SA	STADELMANN, H.
Stoff	Stoffel-Berg	WA	WALTER, D.
Thal	Thaler Höhe		
Walt M	Waltenhofener Moor		

Landkreis Oberallgäu



Frühjahrszug

Graureiher (Ardea cinerea)

3 Ex 6.3. Wengener Tal (HZ,MU,SA)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

1 Ex 27.3. Iberger Kugel (MU,PA)

3 Ex 16.5. Altusried-SW (PA,SA)

Weißstorch (Ciconia ciconia)

1 Ex 16.5. Altusried-SW (PA)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

118 Ex 13.5. (1,5h) Iller/Kalden (FA,KG,PA,PU)

36 Ex 13.5. (1,5 h), 7 Ex 15.5. Walt M (FA,PU)

32 Ex 15.5. (3 h) Kürnacher Wald (SA)

74 Ex 15.5. (2,5 h) Altusried-SW (FA)

11 Ex 15.5. Oberstaufer (PU)

9 Ex 16.5. (5,5 h) Altusried-SW (PA,SA)

Schwarzmilan (Milvus migrans)

1 Ex 30.3. Buchenberg (HZ,SA)

2 Ex 3.4. Ahegg (MU)

Rotmilan (Milvus milvus)

1 Ex 6.3. Juget (HZ,MU,SA)

2 Ex 15.5. Altusried-SW (PA,SA)

Sperber (Accipiter nisus)

3 Ex 24.3. Oberstaufer (SA)

1 Ex 4.5. (2,5 h) Sorgschrofen (WA)

Mäusebussard (Buteo buteo)

4 Ex 17.2. Aigis (Missen-Wilhams-NW) (SA)

27 Ex 25.2. (4 h) Iberger Kugel (FA,PU)

3 Ex 26.3. (2 h) Kürnacher Wald (SA)

15 Ex (1 Trupp) 13.5. Börwang (WA)

Ringeltaube (Columba palumbus)

2 Ex 25.2., 880 Ex 6.3. (8,5 h), 30 Ex 16.4. (1 h) Aigis (FA,HZ, MU,PU,SA)

1000 Ex 7.3. (9 h) Schmid (MU)

5 Ex 9.3. Rottachmoos (SA)

116 Ex (70 + 46) 10.3. Großer Wald (FA)

180 Ex 26.3. Kürnacher Wald (SA)

14 Ex 26.3. (2 h) Rottachberg-W (WA)

41 Ex 9.4. (4 h) Missen-Wilhams-S (KG)

Mauersegler (Apus apus)

62 Ex (Trupps von 4-22 Ex) 4.5. (2,5 h) Sorgschrofen (WA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 Ex 6.3. Aigis (HZ, MU, SA)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

8 Ex 16.5. Altusried-SW (PA)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1 Ex 28.3. Gunzesried (PA)

20 Ex 9.4. Altusried-SW (SA)

spärlicher Zug (ca 12 Ex/h) Niedersonthofener See (WA) 16.4.

15 Ex 4.5. (2,5 h) Sorgschrofen (WA)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

2 Ex 4.5. (2,5 h) Sorgschrofen (WA)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

3 Ex 26.3. (2 h) Kürnacher Wald (SA)

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

40 Ex 26.3. (2 h) Kürnacher Wald (SA)

38 Ex (Trupps von 1-6 Ex) 26.3. (2 h) Rottachberg-W (WA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

8 Ex 26.3. (2 h) Kürnacher Wald (SA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

1 Ex 4.5. (2,5 h) Sorgschrofen (WA)

Herbstzug

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

1 Ex (mit Bussarden) 30.9. Walt M (FA, MU, PU, SA)

7 Ex 5.10. Immenstadt (MU)

80-100 Ex 11.10. (4 h), 12 Ex 28.10. Illertal/KE (MU, SA)

22 Ex 14.10. (1,5 h) Knottenried (MU, SA)

ca 155 Ex 28.10. (5 h) Schmid (MU, SA)

50 Ex (1 Trupp 36 Ex) 28.10. (5 h) Hohe (WA)

14 Ex 29.10. Öschlesee (SA)

Graureiher (*Ardea cinerea*)

1 Ex 11.11. Ahegg (MU)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 Ex 6.9. Juget (HZ, MU, PA)

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

1 Ex 20.7. Burgberger Horn (SA)

4 Ex 19.8. (2,5 h), 3 Ex 25.8. (2,5 h) Wiggensbach (SA)

8 Ex 22.8. Kranzegg (PU)

5 Ex 23.8. Kürnacher Wald (PU)

11 Ex 25.8. (1,5 h) Hauch (SA)

- 33 Ex 1.9. Salm (PU)
 1 Ex 5.9. KE-Mariaberg (MU)
 5 Ex 6.9., 1 Ex 7.9. Juget (MU)
 4 Ex 27.9. Dietmannsried (SPINDLER)

Schwarzmilan (Milvus migrans)

- 3 Ex 13.8. Altusried-S (MU,SA)

Rotmilan (Milvus milvus)

- 1 Ex 6.9. Iberger Kugel (MU)
 1 Ex 7.9. Juget (MU)
 4 Ex 17.9. Gottesacker-O (MU,PA)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

- 1 "♀" 25.8. Hauch (SA)
 3 Ex 6.9., 1♂ 7.9. Juget (MU)
 2 Ex 16.9. Schmid (MU)
 3 Ex 17.9. Gottesacker-O (MU,PA)
 3 "♀" 17.9. Kranzegg (SA)
 1 "♀" 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ)
 1 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU)

Kornweihe (Circus cyaneus)

- 1 "♀" 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ)
 1 "♀" 13.10. (10,5 h) Scheid (MU)
 1 "♀" 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
 2 "♀" 28.10. Ahegg (MU)
 1 "♀" 28.10. Schmid (MU,SA)

Habicht (Accipiter gentilis)

- 1 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
 1 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)
 1 Ex 23.10. (2 h) Blender (WA)
 1 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Sperber (Accipiter nisus)

- 12 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
 3 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
 5 Ex 17.10. (2 h) Stoff (WA)
 2 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)
 4 Ex 23.10. (2 h), 15 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
 4 Ex 28.10 (5 h) Hohe (WA)

Mäusebussard (Buteo buteo)

- 106 Ex 30.9. (1,5 h) Walt M (FA,MU,PU)
 45 Ex 30.9. (20 min) Börwang (WA)
 8 Ex 6.10. (7,5 h), 4 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
 16-20 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
 1 Ex 13.10. (7 h), 3 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
 77 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
 12 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
 9 Ex 14.10. (1 h) Thal (WA)
 63 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
 21 Ex 23.10. (2 h), 31 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
 12 Ex 24.10. Hauch (FA)
 10 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex 6.9. Juget (MU,PA)
1 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ)

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

5 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
4 Ex 15.10. (2 h) Ahegg (MU)
1 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)
2 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 Ex 11.10. KE-Haubenschloß (WA)

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1-2 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

150-200 Ex 28.10. Altusried (MU,SA)

Hohltaube (*Columba oenas*)

1 Ex (mit 5 Ringeltauben) 28.10. Walt M (FA)
1 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

15 Ex 23.9. Walt M (KG)
1600 Ex 5.10. (8 h) Mittelberg-Alpe (Dreherberg) (MU)
780 Ex 6.10. (7,5 h), 4970 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
8570 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
2054 Ex 13.10. (7 h), kein Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
8485 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
440 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
3265 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
195 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
107 Ex 24.10. Hauch (FA)
18 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Buntspecht (*Picoides major*)

2 Ex 23.8. Gerachsattel (1760 m) (Hoher Ifen-SW) (PA)
1 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)

Heidelerche (*Lullula arborea*)

6-7 Ex 6.10. (7,5 h), 2 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,MU)
2 Ex 14.10., ca 11 Ex 1.11. Walt M (FA)
24 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
17 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

12 Ex 6.10. (7,5 h), 1 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
44 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
102 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
85 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
4 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
3 Ex 23.10. (2 h), 38 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
441 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

"zahlreich ziehend" 2.9. Grüntensee (PU)

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

95-100 Ex 6.10. (7,5 h), 122 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
28 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
24 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
6 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
12 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

200 Ex 7.9. (1,5 h) Juget (HZ,MU)
800 Ex 13.9. (1 h) Ahegg (MU)
600-1200 Ex 16.9. (3 h), 3 Ex 13.10. (9 h) Schmid (MU,SA)
350 Ex 17.9. (10 min) Gerachsattel (Ifen-SW) (MU,PA)
3 Ex 6.10. (7,5 h), 3 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

134 Ex 6.10. (7,5 h), 56 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
90 Ex 11.10. (4 h) Ahegg (MU)
156 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
476 Ex 13.10. (7 h), 30 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
128 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
136 Ex 14.10. (2 h), 45 Ex 24.10. (2,5 h) Pfarr (FA,WA)
54 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
8 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
13 Ex 23.10. (2 h), 17 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
73 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

18 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)
5 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)

Schafstelze (*Motacilla flava*)

mind. 10 Ex 5.9. (2 h) KE-Mariaberg (MU)
1 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)

Bergstelze (*Motacilla cinerea*)

1 Ex 6.10. (7,5 h), 10 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
14 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
4 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

336 Ex 6.10. (7,5 h), 588 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
185 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
199 Ex 13.10. (7 h), 8 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
168 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
291 Ex 14.10. (1,5 h) Knottenried (MU,SA)
71 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
19 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
2 Ex 23.10. (2 h) Blender (WA)
8 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

15-20 Ex 6.10. (7,5 h), 15 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
10-25 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
2 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
2 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

10-20 Ex 6.10. (7,5 h), 2 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

304 Ex 6.10. (7,5 h), 38 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
161 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
10 Ex 13.10. (7 h), 9 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
8 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
5 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
16 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
1 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

178 Ex 17.9. (5 h) Gerachsattel (MU,PA)
35 Ex 6.10. (7,5 h), 90 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
65 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
18 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
24 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
53 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Amsel (*Turdus merula*)

14 Ex 6.10. (7,5 h), 1 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

mind. 1 Ex 6.10. (7,5 h), 1 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
mind. 20 Ex 28.10. (2,5 h), 3-10 Ex 11.11. (3 h) Ahegg (MU,SA)

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

4 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
24 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

3 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

42 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
14 Ex (1 Trupp) 21.10. (4 h) Juget (WA)
bis zu ca 30 Ex ganztägig im Garten 22.10. Börwang (WA)

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

8 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)
5 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)

Tannenmeise (Parus ater)

17 Ex 6.10. (7,5 h), 47 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
502 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
179 Ex 13.10. (7 h), 3 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
10 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)

Blaumeise (Parus caeruleus)

6 Ex 6.10. (7,5 h), 36 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
12 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
119 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
8 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)

Kohlmeise (Parus major)

8 Ex 6.10. (7,5 h), 45 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
93 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
2 Ex 13.10. (7 h), 3 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
2 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
6 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
8 Ex 23.10. (2 h) Blender (WA)
3 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

23 Ex 5.10. (6 h) Mittelberg-Alpe (MU)
8 Ex 6.10. (7,5 h), 2 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
3 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)

Dohle (Corvus monedula)

13 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)
52 Ex 14.10. (1,5 h) Knottenried (MU,SA)
48 Ex 14.10. Rieggis (MU,SA)
29 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
18 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

650 Ex 28.10. (2,5 h) Ahegg (MU,SA)
1770 Ex 28.10. (5 h) Schmid (MU,SA)
2870 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Rabenkrähe (Corvus corone corone)

2 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
2 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Kolkrabe (Corvus corax)

31 Ex (1 Trupp) 17.9. Gerachsattel (MU,PA)

Star (Sturnus vulgaris)

250 Ex 6.10. (7,5 h) Ried (FA,MU)
30 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
23 Ex 13.10. (7 h), 5 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
1 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
73 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Buchfink (Fringilla coelebs)

281 Ex 5.10. (2,5 h) Rechtis-W (HZ)
3870 Ex 6.10. (7,5 h), 5206 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)

5060 Ex 11.10. (4 h) Ahegg (MU)
9000 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
2631 Ex 13.10. (7 h), 146 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
2870 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
1440 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
580 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
188 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
29 Ex 23.10. (2 h), 77 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
604 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

336 Ex 6.10. (7,5 h), 588 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
309 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
36 Ex 13.10. (7 h), 3 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
12 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
4 Ex 14.10. (2 h) Thal (WA)
2 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
42 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Girlitz (*Serinus serinus*)

4 Ex 6.10. (7,5 h), 26 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
10 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*)

15-30 Ex 6.10. (7,5 h), 1 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
7 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)

Grünfink (*Chloris chloris*)

63 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ)
21 Ex 13.10. (7 h), 3 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
25 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
12 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
39 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

62 Ex 6.10. (7,5 h), 201 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
16 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
58 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
21 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
4 Ex 14.10. (2 h) Pfarr (WA)
2 Ex 17.10. (3 h) Stoff (WA)
13 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Erlenzeisig (*Spinus spinus*)

450 Ex 6.10. (7,5 h), 817 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
251 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
131 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
134 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)
3 Ex 27.10. (2 h) Blender (WA)
243 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

4 Ex 6.10. (7,5 h), 196 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
20 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)

Bluthänfling (*Acanthis cannabina*)

31 Ex 6.10. (7,5 h), 178 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
35-50 Ex 14.10. (1,5 h) Knottenried (MU,SA)
7 Ex 21.10. (4 h) Juget (WA)
5 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

27 Ex 6.10. (7,5 h), 11 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
10 Ex 13.10. (10,5 h) Scheid (MU,NU)
41 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
21 Ex 13.10. (9 h) Schmid (SA)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

9 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ)
16 Ex 13.10. (7 h), 5 Ex 21.10. (4 h) Juget (PA,WA)
4♂ 1♀ 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)




30-45 Ex 5.10. (6 h) Mittelberg Alpe (MU)
14 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)
2 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

2 Ex 28.10. (5 h) Hohe (WA)

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

3 Ex 6.10. (7,5 h), 2 Ex 13.10. (8 h) Ried (FA,HZ,MU)
7 Ex 13.10. (7 h) Juget (PA)



Ziehende Schwalben

Links: 2 adulte Rauchschnalben, Mitte:
1 immature Rauchschnalbe, rechts: 2 Mehlschnalben

Verfasser: Dietmar WALTER
An der Gasse 18

D - 8961 B ö r w a n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [30_2](#)

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: [Vogelzug im Oberallgäu - 1989. 39-50](#)