© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentr



Mitt.Naturwiss.Arbeitskr.Kempten
Jahrgang 31 - Folge 2 : 47 - 58
(Februar 1992) - ISSN 0344-5054

Vogelzug im Oberallgäu - 1991

Von Dietmar WALTER, Börwang

Der Herbstzug schien 1991 bei vielen Arten (zB. Finken) zur Hauptzugzeit, also Ende September / Anfang Oktober, nicht so spektakulär (quantitativ) abzulaufen wie das Jahr zuvor. Aufgrund der günstigen Wetterlage ergaben sich dadurch wahrscheinlich nicht so viele Tage mit Zugstau-Charakter, sodaß der Durchzug über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich ablaufen konnte.

Ende September und Anfang Oktober konnte ich einige Male den Umkehrzug studieren, so zB. am 28.9.91 am Riedbergpaß: Am Boden herrschte an diesem Tag bei schwacher Cirren-Bewölkung ein leichter Ostwind, während sich von Westen her eine geschlossene Stratusbewölkung heranschob.

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Der spärliche Vogelzug in Westrichtung, der seit Sonnenaufgang herrschte, kam gegen 8 Uhr fast gänzlich zum Erliegen, während sich nun in den folgenden 1 1/2 Stunden ein leichter Zug nach Osten einstellte. In dieser Zeit zogen 2 Felsenschwalben, 53 Wiesenpieper, 1 Bergstelze, 38 Misteldrosseln, 6 Buchfinken und 2 Stieglitze an mir vorüber.

Überraschend war für mich, daß ich Anfang November (2.11.91) auf der Ellegg-Höhe innerhalb von 3 Stunden immerhin noch 22 ziehende Arten registrieren konnte! Nämlich Baumfalke, Ringeltaube, Buntspecht, Heidelerche, Feldlerche, Wiesenpieper, Bachstelze, Wacholderdrossel, Amsel, Rotdrossel, Blaumeise, Saatkrähe, Star, Feldsperling, Buchfink, Bergfink, Grünfink, Stieglitz, Erlenzeisig, Bluthänfling, Fichtenkreuzschnabel und Kernbeißer.

Während wir jetzt über den Vogelzug im Alpenvorland und den Vorbergen des Oberallgäus in groben Zügen informiert sind, dürfte der Zug im Gebirge bzw. Hochgebirge noch viele interessante Aspekte verbergen! So war ich beispielsweise erstaunt über drei Ringeltauben-Schwärme (95, 420 und 350 Ex), die am 4.10.91 am bzw. über den Widderstein (2533 m NN, Kleines Walsertal) flogen und dabei eine Zughöhe zwischen 2450 m und 2750 m einhielten. Sie schienen dabei aus den Lechtaler Alpen zu kommen, und man könnte spekulieren, daß sie vielleicht das Lechtal oder das Inntal aufwärts geflogen waren.

In dieser Zusammenstellung sind wieder die Einzeldaten tagziehender Vogelarten durch den Landkreis Oberallgäu aufgelistet. Hinter dem Datum ist in Klammern die Beobachtungsdauer in Stunden (h) und meist noch die Angabe Vormittag (V) oder Nachmittag (N) vermerkt. Bei kurzzeitigen Beobachtungen wurde kein Zeitraum angegeben.

Leider ging die Vogelzug-Observation der meisten bisherigen Beobachter 1991 rapide zurück; als Ausgleich dafür gelang es mir meine eigene Beobachtertätigkeit in diesem Jahr auf 110 Stunden zu steigern. Vielleicht finden sich künftig wieder etwas mehr qualifizierte Wissensdurstige, die dieser interessanten Tätigkeit wieder quantitativ nachgehen!

<u>Abkürzungen:</u>

Bör	Börwang
Ell	Ellegg-Höhe (1136 m NN, Grüntensee-W)
Gott	Gottesacker-Gebiet (1830 m - 2033 m NN)
Hohe	Hohe Schulter (941 m NN, Betzigau-O)

Landkreis Oberallgäu

©Bayerische Akademie der Wissenschaften, München; download unter www.biologiezentrum.at



© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Ins See Inselseen (Niedersonthofen)
KE Kempten
(PU) PUDIMAT, Karl
Ried Riedbergpaß (Schönbergalpe 1345 m NN)
Rott B Rottachberg (1116 m NN)
(WA) WALTER, Dietmar
Walt M Waltenhofener Moos
"♀" weibchenfarbig

F r ü h j a h r s z u g (=Heimzug)

Schwarzstorch (Ciconia nigra)
1 Ex 4.4. Rottachspeicher (KUTSCHERA,WA)

Wespenbussard (Pernis apivorus)
4 Ex 19.5. Nagelfluhkette (FARKASCHOVSKY, HOLZER)

Kornweihe (Circus cyaneus)
1♂ 26.4. (2h/N) Ell (WA)

Habicht (Accipiter gentilis)
2 Ex 3.4. (2h/N) Ell (WA)

Sperber (Accipiter nisus)
1 Ex 10.3. (3h/N), 1 Ex 15.3. (3h/N), 3 Ex 17.3.(2h/N) Bör (WA)
1 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
4 Ex 3.4. (2h/N) Ell (WA)

Mäusebussard (Buteo buteo)
1 Ex 19.2. Sulzberg (WA)
2 Ex 2.3. (4h/V), 5 Ex 16.3.(5h/V) Rott B (WA)
13 Ex 4.3., 69 Ex 10.3. (3h/N), 14 Ex 12.3. (3h/N), 8 Ex 15.3.(3h/N), 19 Ex 17.3. (2h/N), 4 Ex 21.3. (1h/N) Bör (WA)
1 Ex 2.4. (5h/V), 4 Ex 3.4. (2h/N), 1 Ex 26.4. (2h/N) Ell (WA)

Fischadler (Pandion haliaetus)
1 Ex von Kolkraben verfolgt 20.4. Wildpoldsried (MAYRHANS)

Kiebitz (Vanellus vanellus)
ca 700 Ex (Trupps von 15-150 Ex) 10.3. (1h/V) Reicholzried (MAYRHANS)
6 Ex (1 Trupp) 15.3. (3h/N), 1 Ex 21.3. (1h/N) Bör (WA)

Hohltaube (Columba oenas)
2 Ex (mit 50 Ringeltauben) 12.3. Walt M (PU)

Ringeltaube (Columba palumbus)
27 Ex 15.3. (3h/N), 129 Ex 17.3. (2h/N), 22 Ex 21.3.(1h/N) Bör (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

79 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
11 Ex 16.3. Ried (FARKASCHOVSKY)
8 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Feldlerche (Alauda arvensis)

4 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

6 Ex 26.4. (2h/N) Ell (WA)
27 Ex 8.5. (1h/N) Dietmannsried (WA)
spärlicher Zug am 9.5. (V) Altstädten (WA)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

spärlicher Zug am 9.5. (V) Altstädten (WA)

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

1 Ex 15.3. (3h/N), 2 Ex 17.3. (2h/N) Bör (WA)
2 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
3 Ex 2.4. (5h/V), 3 Ex 3.4. (2h/V), 2 Ex 26.4. (2h/V) Ell (WA)

Bachstelze (Motacilla alba)

1 Ex 8.3. (3h/N), 4 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
19 Ex 15.3. (3h/N), 1 Ex 17.3. (2h/N), 1 Ex 21.3. (1h/N) Bör (WA)
4 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

4 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

1 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)
17 Ex 17.3. (2h/N) Bör (WA)
2 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

1♂ 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Amsel (Turdus merula)

1♂ 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Tannenmeise (Parus ater)

33 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
100 Ex 2.4. (5h/V, größter Trupp 28 Ex), 15 Ex 3.4. (2h/N) Ell (WA)

Blaumeise (Parus caeruleus)

3 Ex 8.3. (3h/N) Rott B (WA)

Kohlmeise (Parus major)

43 Ex 2.4. (5h/V, größter Trupp 22 Ex) Ell (WA)

Kleiber (Sitta europaea)

4 Ex (2+ 2) 2.4. (5h/V) Ell (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Dohle (Corvus monedula)

17 Ex schrauben sich segelnd und rudernd von ca 150 m auf 300 m über Grund und fliegen dann nach Osten, 26.2. (13 Uhr),
3 Ex (mit Saatkrähen) 15.3. (3h/N) Bör (WA)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

110 Ex 15.3. (3h/N) Bör (WA)

Star (Sturnus vulgaris)

11 Ex 15.3. (3h/N) Bör (WA)
2 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)

Buchfink (Fringilla coelebs)

spärlicher Zug am 27.2. in KE (WA)
75 Ex 15.3. (3h/N), 1487 Ex°(2h/N), 212 Ex 21.3. (1h/N) Bör (WA) °=17.3.
514 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
53 Ex 2.4. (5h/V), 22 Ex 3.4. (2h/N) Ell (WA)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

201 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
2 Ex 17.3. (2h/N) Bör (WA)
53 Ex 2.4. (5h/N) Ell (WA)

Girlitz (Serinus serinus)

2 Ex 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Grünfink (Chloris chloris)

4 Ex 15.3. (3h/N) Bör (WA)
1 Ex 16.3. (5h/V) Rott B (WA)

Erlenzeisig (Spinus spinus)

12 Ex 3.4. (2h/N) Ell (WA)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

8 Ex 8.3. (3h/N) Rott B (WA)

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

5♂ 7♀ 16.3. (5h/V) Rott B (WA)
1♂ 2.4. (5h/V) Ell (WA)

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

2 Ex 15.3. (3h/N), 3 Ex 17.3. (2h/N) Bör (WA)

H e r b s t z u g (= Wegzug)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

9 Ex 14.9. Salmaser Höhe (PU)
50 Ex 15.9., 30 Ex 17.9. Ins See (PU)
10 Ex 22.9., 3 Ex 20.10., 6 Ex 3.11., 13 Ex 11.12. Walt M (PU)
86 Ex 8.10. Walt M (FARKASCHOVSKY)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

9 Ex (1 Trupp) 4.10. (6H/VN, Zughöhe 2150 m) Ried (WA)
11 Ex (1 Trupp) 9.10. (1h/V), 3 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)

Graureiher (Ardea cinerea)

1 Ex 5.10. (3h/N), 6 Ex (1 Trupp) 9.10. (3h/N) Bör (WA)
7 Ex (1 Trupp) 12.10. (4h/V, Zughöhe 2200 m) Ried (WA)

Gänsesäger (Mergus merganser)

1♀ 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

9 Ex 18.8.(N), 3 Ex 20.8. (N), 8 Ex 25.8. (N), 17 Ex 4.9. (N),
4 Ex 20.9. (2h/N) Bör (WA)
8 Ex 19.8., 45 Ex (in 40 min) 25.8. Walt M (PU)
10 Ex 24.8. (2h/N), 46 Ex 25.8. (3h/N), 20 Ex 2.9. (2h/N), 1 Ex 7.9. (2h/N), 1 Ex 21.9. (6h/VN) Ell (WA)

Schwarzmilan (Milvus migrans)

21 Ex 30.6. (0,5h/mittags) Sachsenrieder Weiher (WA)
6 Ex 30.6. (1h/N), 20 Ex 8.8. (1h/N), 23 Ex 9.8. (0,5H/N), 46 Ex 12.8. (1h/N), 60 Ex 16.8. (2h/N),47 Ex 17.8. (1h/N), 11 Ex 24.8. (1h/N),
18 Ex 27.8. (1h/N) Probstried (KOPF)
31 Ex 18.8. (10 min/N), 2 Ex 20.8. Bör (WA)
1 Ex 1.9. (5h/N) Ell (PU)

Rotmilan (Milvus milvus)

4 Ex 16.8. (2h/N), 2 Ex 17.8. (1h/N), 1 Ex 18.8. (1h/N), 6 Ex 31.8. (1h/N) Probstried (KOPF)
2 Ex 3.10. (7h/VN) Ell (PU)
1 Ex 3.10. (2h/V) Hohe (WA)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

2 "♀" 31.8. (5h/N), 1♂ 2♀ 21.9. (5h/N), 1♂ 4 "♀" 4.10. (9h/VN),
7 "♀" 5.10. (8h/VN) Ell (PU)
1♀ 1.9. Grünten (PU)
1♀ 15. und 21.9. Walt M (PU)

Kornweihe (Circus cyaneus)

1♂ 25.8. (3h/N) Ell (WA)
1♂ 24.10. (2h/N) Bör (WA)

Habicht (Accipiter gentilis)

1 Ex 10.10. (1h/N) Bör (WA)
3 Ex 11.10. (2h/N) Blender (WA)
3 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)

Sperber (Accipiter nisus)

1 Ex 2.9. (2h/N), 2 Ex 21.9. (6h/VN), 11 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)
2 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)
3 Ex 1.10. (2h/N), 2 Ex 9.10. (3h/N), 2 Ex 16.10. (1h/N), 1 Ex 22.10. (2h/N), 2 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
2 Ex 4.10. (6h/VN) Gott (WA)
1 Ex 10.10. (1h/V) KE (WA)

© Volkshochschule Lampoldshausen download unter www.biologiezentrum.at

Mäusebussard (Buteo buteo)

7 Ex 20.9. (2h/V), 2 Ex 28.9. (1h/N), 4 Ex 1.10. (2h/N), 29 Ex 5.10. (3h/N), 57 Ex 9.10. (3h/N), 4 Ex 10.10. (2h/N), 13 Ex 14.10. (2h/N), 61 Ex 16.10. (1h/N), 42 Ex 22.10. (2h/N), 36 Ex 24.10. (2h/N), 14 Ex 1.11. (1h/N) Bör (WA)
6 Ex 3.10. Sibratshofen (KRIEGL)
94 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)
4 Ex 16.11. (1h/N) Alpsee (WA)

Fischadler (Pandion haliaetus)

1 juv 7.9. (2h/VN), 1 Ex 28.9. (5h/N), 2 Ex 4.10. (9h/VN) Ell (PU,WA)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

1 Ex 20.9. (2h/N), 1 Ex 9.10. (3h/N) Bör (WA)
1 Ex 28.9. (3h/V) Ried (WA)
8 Ex 4.10. (6h/VN, Zughöhe 2200-2400 m) Gott (WA)
1 Ex 9.10. (1h/V) KE (WA)

Baumfalke (Falco subbuteo)

1 Ex 25.8. (3h/N), 1 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
1 Ex 20.9. (2h/N), 3 Ex 10.10. (2h/N) Bör (WA)

Wanderfalke (Falco peregrinus)

1 Ex 25.8. (3h/N), 1 Ex 2.9. (2h/N) Ell (WA)

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

1 Ex 21.9. (6h/VN) Ell (WA)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

49 Ex 6.11. (1h/V) Sulzberg (WA)

Hohltaube (Columba oenas)

22 Ex 4.10. (9h/VN), 19 Ex 5.10. (8h/VN), 3 Ex (2 mit 60 und 1 mit 55 Ringeltauben) 15.10. (5h/N) Ell (PU,WA)
2 Ex (je 1 fliegt mit 3 bzw 11 Ringeltauben) 5.10. (3h/N), 1 Ex (mit 2 Ringeltauben) 9.10. (3h/N), 4 Ex (mit 36 Ringeltauben) 14.10. (2h/N) Bör (WA)

Ringeltaube (Columba palumbus)

4 Ex 21.9. (6h/VN), 2100 Ex 3.10. (7h/VN), 30 700 Ex 4.10. (9h/VN), 8000 Ex 5.10. (8h/VN), 2133 Ex 15.10. (5h/N), 4 Ex 2.11. (3h/V) Ell (PU,WA)
17 Ex 26.9. (1h/N), 1516 Ex 5.10. (3h/N), 148 Ex 9.10. (3h/N), 2 Ex 10.10. (2h/N), 584 Ex 14.10. (2h/N), 119 Ex 16.10. (1h/N), 149 Ex 22.10. (2h/N), 12 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
6 Ex 28.9. (3h/V), 79 Ex 29.9. (4h/V), kein Ex 12.10. (4h/V) Ried (HOFMANN,WA)
42 Ex 3.10. (2h/V), 124 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
3100 Ex 4.10. (3h/V) Salmaser Höhe (HOFMANN)
120 Ex (1 Trupp) 4.10. (2h/V) Gott (WA)
865 Ex (3 Trupps) 4.10. (6h/VN, Zughöhe 2600 - 2750 m NN) Widderstein (WA)
105 Ex 9.10. (1h/V), 133 Ex 10.10. (1h/V), 35 Ex 17.10. (1h/V)KE(WA)
403 Ex 11.10. (2h/N) Blender (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Buntspecht (Picoides major)

1♀ 21.9. (6h/VN), 1♂ 2.11. (3h/V) Ell (WA)
1 Ex 5.10. (3h/N) Bör (WA)

Heidelerche (Lullula arborea)

1 Ex 4.10. (6h/VN) Gott (WA)
1 Ex 9.10. (1h/V) KE (WA)
2 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
1 Ex 15.10. (5h/N), 1 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
2 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
2 Ex 22.10. (2h/N) Bör (WA)

Feldlerche (Alauda arvensis)

9 Ex 4.10. (6h/VN) Gott (WA)
5 Ex 5.10. (3h/N), 11 Ex 14.10. (2h/N), 225 Ex 22.10. (2h/N) Bör (WA)
28 Ex 9.10. (1h/V), 22 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)
672 Ex 15.10. (5h/N), 7 Ex 26.10. (1h/V), 5 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
558 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
4 Ex 6.11. (1h/V) Sulzberg (WA)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

reger Zug 4.9. Salmaser Höhe (KRIEGL)
7 Ex 7.9. (2h/N), 88 Ex 21.9. (6h/VN), 9 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)
44 Ex 20.9. (2h/N), 21 Ex 26.9. (1h/N), 110 Ex 1.10. (2h/N), 45 Ex 5.10. (3h/N), 20 Ex 10.10. (2h/N), 13 Ex 14.10. (2h/N) Bör (WA)
137 Ex 3.10. (2h/V),2 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
6 Ex 4.10. (6h/VN) Gott (WA)
12 Ex 10.10. (1h/V) KE (WA)

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

reger Zug 4.9. Salmaser Höhe (KRIEGL)
22 Ex 4.10. (6h/VN) Gott (WA)

Baumpieper (Anthus trivialis)

7 Ex (1 Trupp) fliegen nach Rast ab 20.9. (2h/N) Bör (WA)

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

1 Ex 21.9. (6h/VN), 145 Ex 15.10. (5h/N), 3 Ex 26.10. (1h/V), 170 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
15 Ex 3.10. (2h/V), 233 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
13 Ex 4.10. (3h/V) Gott (WA)
160 Ex 5.10. (3h/N), 31 Ex 9.10. (3h/N),28 Ex 10.10. (2h/N), 24 Ex 14.10. (2h/N), 9 Ex 22.10. (2h/N), 1 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
9 Ex 9.10. (1h/V), 3 Ex 10.10. (1h/V), 1 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)
135 Ex 11.10. (2h/V) Blender (WA)
63 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)

Schafstelze (Motacilla flava)

3 Ex 2.9. (2h/N), 11 Ex (1 Trupp) 7.9. (2h/N) Ell (WA)
1 Ex 26.9. (1h/N), 2 Ex 1.10. (2h/N) Bör (WA)
6 Ex 9.10. (1h/V) KE (WA)

Bergstelze (Motacilla cinerea)

1 Ex 26.9. (1h/N) Bör (WA)
2 Ex 3.10. (2h/V) Hohe (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Bachstelze (Motacilla alba)

2 Ex 2.9. (2h/N), 11 Ex 21.9. (6h/VN), 28 Ex 15.10. (5h/N), 4 Ex 26.10. (1h/V), 23 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
12 Ex 1.10. (2h/N), 32 Ex 5.10. (3h/N), 13 Ex 9.10. (3h/N), 26 Ex 10.10. (2h/N), 24 Ex 14.10. (2h/N), 8 Ex 22.10. (2h/N) Bör (WA)
12 Ex 3.10. (2h/V), 133 Ex 16.10.(2h/V) Hohe (WA)
1 juv 4.10. (2h/V) Gott (WA)
8 Ex 9.10. (1h/V), 20 Ex 10.10. (1h/V) KE (WA)
22 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
4 Ex 6.11. (1h/V) Sulzberg (WA)

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

6 Ex 3.10. (2h/V), 1 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
6 Ex 4.10. (9h/VN, nur die ersten 4 Stunden) Gott (WA)
1 Ex 9.10. (3h/N) Bör (WA)
23 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
2 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)
1 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

9 Ex 20.9. (2h/N), 1 Ex 1.10. (2h/N) Bör (WA)
2 Ex 3.10. (2h/V) Hohe (WA)
4 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

1 Ex 1.10. (2h/N) Bör (WA)
2 Ex 3.10. (2h/V) Hohe (WA)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

5 Ex 26.9. (1h/N), 5 Ex 5.10. (3h/N) Bör (WA)
27 Ex 28.9. (3h/V), 89 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
102 Ex 4.10. (3h/V) Gott (WA)

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

45 Ex 26.9. (1h/N), 6 Ex 1.10. (2h/N), 11 Ex 5.10. (3h/N), 46 Ex 9.10. (3h/N), 15 Ex 14.10. (2h/N), 28 Ex 22.10. (2h/N), 13 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
5 Ex 28.9. (3h/V), 19 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
194 Ex 3.10. (2h/V), 94 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
29 Ex 15.10. (5h/N), 15 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
46 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)

Amsel (Turdus merula)

2 Ex 5.10. (3h/N) Bör (WA)
8 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
1♂ 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

22 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Singdrossel (Turdus philomelos)

1 Ex 9.10. (1h/V), 1 Ex 10.10. (1h/V), 3 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)
1 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
6 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Tannenmeise (Parus ater)

3 Ex 5.10. (3h/N) Bör (WA)

Blaumeise (Parus caeruleus)

20 Ex 10.10. (1h/V) KE (WA)
33 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
2 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Kohlmeise (Parus major)

44 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

3 Ex 28.7. (1h/N), 6 Ex 1.10. (2h/N), 7 Ex 9.10. (3h/N) Bör (WA)
2 Ex 10.10. (1h/V) KE (WA)

Dohle (Corvus monedula)

16 Ex 13.10. (V) Dietmannsried (SPINDLER)
2 Ex (mit 20 Saatkrähen) 15.10. (5h/N) Ell (WA)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

140 Ex 12.8. (1h/N), 82 Ex 18.8. (1h/N) Probstried (KOPF)
44 Ex 15.10. (5h/N), 508 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Star (Sturnus vulgaris)

14 Ex 1.10. (2h/N), 35 Ex 5.10. (3h/N), 25 Ex 9.10. (3h/N), 22 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
53 Ex 3.10. (2h/V), 512 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
83 Ex 15.10. (5h/N), 12 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Feldsperling (Passer montanus)

4 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Buchfink (Fringilla coelebs)

2 Ex 26.9. (1h/N), 6 Ex 1.10. (2h/N), 818 Ex 5.10. (3h/N), 375 Ex 9.10. (3h/N), 29 Ex 10.10. (2h/N), 308 Ex 14.10. (2h/N), 13 Ex 16.10. (1h/N), 688 Ex 22.10. (2h/N), 6 Ex 24.10. (2h/N) Bör (WA)
4 Ex 28.9. (3h/V), 456 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
9 Ex 3.10. (2h/V), 1184 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
232 Ex 4.10. (9h/VN) Gott (WA)
185 Ex 9.10. (1h/V), 172 Ex 10.10. (1h/V), 142 Ex 17.10.(1h/V) KE(WA)
71 Ex 11.10. (2h/N) Blender (WA)
2267 Ex 15.10. (5h/N), 2 Ex 26.10. (1h/V), 712 Ex 2.11. (3h/V)Ell (WA)
6 Ex 16.11. (1h/N) Alpsee (WA)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

1 Ex 9.10. (1h/V), 1 Ex 10.10. (1h/V), 2 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)
7 Ex 9.10. (3h/N), 2 Ex 10.10. (2h/N), 8 Ex 14.10. (2h/N), 2 Ex 22.10. (2h/N) Bör (WA)
3 Ex 11.10. (2h/N) Blender (WA)
88 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
68 Ex 15.10. (5h/N), 178 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
107 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

© Volkshochschule Kempten; Download unter www.biologiezentrum.at

Girlitz (Serinus serinus)

2 Ex 15.10. (5h/N) Ell (WA)

Zitronengirlitz (Serinus citrinella)

13 Ex 4.10. (3h/V) Gott (WA)

Grünfink (Chloris chloris)

36 Ex 20.9. (2h/N), 2 Ex 26.9. (1h/N), 4 Ex 5.10. (3h/N),
1 Ex 9.10. (3h/N) Bör (WA)
4 Ex 21.9. (6h/VN), 1 Ex 15.10. (5h/N), 28 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
26 Ex 3.10. (2h/V), 3 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

Stieglitz (Carduelis carduelis)

170 Ex 21.9. (6h/VN), 3 Ex 15.10. (5h/N), 5 Ex 2.11.(3h/V) Ell (WA)
2 Ex 28.9. (3h/V), 31 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
1 Ex 1.10. (2h/N), 2 Ex 14.10. (2h/N) Bör (WA)
3 Ex 3.10. (2h/V), 5 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
2 Ex 10.10. (1h/V), 3 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)

Erlenzeisig (Spinus spinus)

13 Ex 10.10. (1h/V), 7 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)
406 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
15 Ex 15.10. (5h/N), 58 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
37 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

Bluthänfling (Acanthis cannabina)

30 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
3 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
30 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

58 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
32 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

1 Paar 10.10. (1h/V) KE (WA)

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

10 Ex 12.10. (4h/V) Ried (WA)
3 Ex 14.10. (2h/N) Bör (WA)
8 Ex 15.10. (5h/N), 21 Ex 2.11. (3h/V) Ell (WA)
14 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)
1 Ex 17.10. (1h/V) KE (WA)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

5 Ex 16.10. (2h/V) Hohe (WA)

Berichtigungen zu "Vogelzug im Oberallgäu - 1990": Auf Seite 69 sind unter "Girlitz" folgende Angaben zu streichen: 10 Ex 6.10.(6h/ 24 Ex 3.10.(5h/V), 25 Ex 13.10.(7h/VN)Ried (WA). 11 Ex 10.10.(2,5/V), 1 Ex 14.11.(1h/V) Bör (WA)

Verfasser: Dietmar WALTER , An der Gasse 18
DW - 8961 - B ö r w a n g

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: 31_2

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Vogelzug im Oberallgäu - 1991. 47-58