Fraßgänge des **Bunten Eschenbastkäfers** (*Leperisinus varius*) auf Esche
Kronholz (Börwang) – 20.10.2018 – (D. Walter)

Diese nur um 3 mm langen, fleckig braunen Rüsselkäfer (*Curculionidae*) aus der Unterfamilie der Borkenkäfer (*Scolytinae*) legen ihr Brutsystem in Eschen (*Fraxinus excelsior*), gelegentlich auch in anderen Laubbäumen an. (Die Rinde ist auf dem Bild bereits abgefallen).
Nach dem Einbohrloch in die Borke wird ein doppelarmiger Quergang angelegt in den die Eier abgelegt werden. Die geschlüpften Larven fressen senkrecht zu diesem ihre ca. 3 cm langen Gänge in die Rinde und teilweise auch ins Splintholz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten (Allgäu) der Volkshochschule Kempten

Jahr/Year: 2021

Band/Volume: 56

Autor(en)/Author(s): Walter Dietmar

Artikel/Article: Fraßgänge des Bunten Eschenbastkäfers (Leperisinus varius) auf Esche Kronholz (Börwang) – 20.10.2018 105