

## Historischer Vergleich Allgäuer Landschaften (2)

Text und Fotos von Herbert STADELMANN

Standort: Auf dem Falken NW, Gem. Rettenberg, Lkr OA, 750m ü. N.N., 47°35'35" N 10°16'57" E



06.05.2000



17.05.2019

Während der Buchenmischwald am Rottachberg unverändert erscheint, verwandelten sich die Ränder. Nur alle zehn Jahre wird der Aufwuchs in der extensiv genutzten Rinderweide geschwendet. So wurden 2020 die Gehölze wieder deutlich zurückgeschnitten, um die Waldsukzession aufzuhalten.



Standort: Rottachmoos SO Josereute, Gem. Oy-Mittelberg, Lkr OA, 856 m ü. N.N., 47°38'60" N 10°25'9" E



26.03.1989



13.04.2019

Durchströmungsmoore unterliegen in den letzten Jahrzehnten einer starken landwirtschaftlichen Veränderung. Geschützte Feuchtwiesen werden zusammengelegt und intensiviert, wie am frischen Grün zu erkennen ist. Andererseits "verbuschen" vorentwässerte Streuwiesen, wenn sie nicht mehr gemäht werden. In beiden Fällen verlieren sie ihre ökologische Bedeutung für die Artenvielfalt.

Herbert Stadelmann, Klosterwiese 9, 87437 Kempten, [stama@t.online.de](mailto:stama@t.online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 2022

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Stadelmann Herbert

Artikel/Article: [Historischer Vergleich Allgäuer Landschaften \(2\) 51-52](#)