Abend vom 09. November 1964

Herr Weihermüller bringt ein Stück eines Kabels, das für Fernsichtzwecke am Grüntensender verlegt wurde. Es besteht aus einem inneren und einem äußeren Leiter aus Kupfer, die eine treppenartig gebaute Polyesterstütze voneinander getrennt sind. Im Unterschied zu früheren Kabeln bestehen die Leiter heute aus geschlossenen Röhren. Der gesamte Leiter ist durch eine teerartige Masse nach aussen isoliert.

Herr Dr. O. Klement, Kreuzthal-Eisenbach, bringt eine Einführung in die Lichenologie. Anhand von eindrucksvollen Farbdias erläutert er das Zusammenleben von Pilz und Alge und damit die Lebensweise und die Lebensbedingungen der Flechten. Anschließend an seinen äußerst klaren und verständlichen, hochinteressanten Vortrag zeigt Herr Dr. Klement noch Stücke aus seinem umfangreichen Flechtenherbar.

Wir verweisen noch auf den Beitrag "Flechtenleben" von Herrn Dr. O. Klement in dieser Folge!

Abend vom 07. Dezember 1964

Frau Dr. R. und Herr K. Lübenau zeigen Farbdias von Wanderungen in Schwedisch-Lappland, die sie im vergangenen Sommer dort durchgeführt haben. Ergänzend zu den Farbdias, die Landschaft und Pflanzenwelt zeigen, legt Herr Lübenau sein Lappland-Herbar und einige Gesteinsproben vor.

Am 09. Mai 1964 wurde unter Anleitung von Herrn R. Ochsenbauer eine Vogelstimmenwanderung durch die Rottachanlagen b. Kempten, zum Marienberg und in den Kalbsangstobel unternommen.

Am 17. Juni 1964 fand eine Geologisch-botanische Exkursion nach Untermaiselstein und zur Starzlachklamm unter Leitung der Herren Oberstudienrat U. Scholz (Geologie) und Studienprofessor L. Müller (Botanik) statt.

Wir verweisen auf den ausführlichen Exkursionsbericht in dieser Folge!

3. Exkursion in das Alpenrandgebiet an Rottachberg und Grüntenfuß am 17. Juni 1964.

Geolog. Leitung: U. Scholz, botanische Leitung: L. Müller, für agrartechn. Fragen: H. Prinz, Fauna: H. Mendl.

U. Scholz:

Die Exkursion ermöglichte Einblicke in den Aufbau der subalpinen Molasse, führte zur Nahtstelle zwischen helvetischer Kreide und Molasse und bot in der Starzlachklamm einen Aufschluß der jüngsten Schichtfolge der helvetischen Kreide.

1. Standort oberhalb Wolfis auf einer Molasserippe. Vor uns, jenseits der Rottach, liegt der Nord-Westabfall des Rottachberges. Am Rottachberg sind die Kojenschichten (hier vorwiegend grobe Nagelfluhbänke) aufgeschlossen, während das Vorland von deren Liegendem, den Steigbach- und Weißbachschichten aufgebaut wird. Letztere Schichtserien bestehen vorwiegend aus Mergeln und weichen Sandsteinen. Weißbach-, Steigbach- und Kojenschichten bilden den nördlichen Flügel der sog. Rottenbacher Mulde, einer wichti-

gen tektonischen Einheit im Aufbau der ~~zug~~ gefalteten Molasse (subalpine Molasse). Diese Gesteinsserie ist in der Oligozänzeit als sog. Untere Süßwassermolasse abgelagert worden.

Die bekannte Stufung des Rottachberges ist durch die Wechselagerung von härteren Nagelfluh- und weicheren, wasserundurchlässigen Mergel- bzw. Sandsteinschichten bedingt. Die mächtigen Nagelfluhpackungen der Kojenschichten wurden durch die abtragenden Kräfte als Höhenzug (Rottachberg) herausgearbeitet, die weicheren Steigbach- und Weißbachschichten zum welligen Vorland erniedrigt, aus dem nur da und dort härtere Sandsteinschichten als Stufen herausstreichen.

Steigbach- und Weißbachschichten sind jedoch weiter im Südwesten (Immenstädter Nagelfluhkette) als mächtige Nagelfluhfolgen entwickelt. Hier lag nämlich die Mündung eines gewaltigen Alpenstromes, der in der Oligozänzeit von Süden, aus den schon damals bestehenden Alpen, seinen Schutt heranführte. An unserem Standort sind die altersmäßig entsprechenden Schichten vorherrschend sandig-mergelig, nimmt doch die Korngröße vom Zentrum der Aufschüttung nach außen zu ab.

Ähnliche Verhältnisse wiederholen sich in den jüngeren Kojenschichten:

Am Rottachberg bilden sie mächtige Konglomerate, doch jenseits einer Linie, die von Niedersonthofen nach Sulzberg zieht, ist ihr neuerliches Auftreten an Sandsteine und Mergel gebunden.

Wir müssen uns die Zuschüttung des mächtigen, in ständigem Absinken begriffenen tertiären Molassebeckens als einen von Süden nach Norden fortschreitenden Prozess vorstellen. Die Einmündung der tertiären Alpenflüsse mit ihren groben Deltaschottern geschah von Süden her. Die Flüsse pendelten dann auf ihrem eigenen Schutt und schoben die Mündung und damit die größte Schüttung immer weiter gegen Norden vor.

(Die Molasserippe, auf der wir standen, gewährte einen guten Überblick über die Landschaft westlich vom Rottachberg bis hinüber zu den Höhenzügen des Stoffel- und Hauchenberges. Die teils einzeln verstreut liegenden, teils in Ortschaften zusammengefaßten Allgäuer Bauernhöfe fügen sich harmonisch ins Landschaftsbild ein. Der sich aufdrängende Vergleich zwischen diesen schönen Höfen und den mancherorts (besonders im württembergischen Raum) neuerbauten Aus- und Umsiedlerhöfen veranlaßte Herrn K. Lübenau zu der Frage, ob es nicht möglich sei, auch diese neuen Höfe mehr traditionsgebunden, formschöner und damit landschaftsfreundlicher bauen zu können. Der Gedanke, daß in mehreren Jahrzehnten derartig unschöne Bauten im Land stünden, sei für Freunde harmonischer Landschaftsbilder betrüblich.)

Herr H. Prinz führte dazu aus:

Zur Bewirtschaftung der in geschlossener Ortslage befindlichen Höfe - im ehem. Gebiet des Hochstiftes Augsburg die Regel - ist zu bemerken, daß aus arbeitswirtschaftlichen Gründen in vielen Fällen eine Aussiedlung notwendig wird, die aber sehr viel Geld kostet. Dagegen spreche aber, daß die landw. Nutzflächen vielfach sehr hängig und in sich uneben seien und somit den Einsatz arbeitssparender Maschinen nicht ermöglichten. In Zukunft würden wahrscheinlich in Anbetracht des Arbeitskräftemangels und der geringen Rentabilität manche Betriebe aufgelassen und ihren landwirtschaftlichen Nutzflächen anderen Betrieben angegliedert. Die Umstellung von der Milcherzeugung (Kuhhaltung) auf Jungviehhaltung (Weidebetrieb) sei zu empfehlen, wenn die Geländebedingungen einen rationellen

Maschineneinsatz nicht möglich machen. Bei Aussiedlungen würden die zuständigen Stellen sich bemühen, die aus arbeitswirtschaftlichen Überlegungen notwendigen neuen Bauformen möglichst unauffällig in das gewohnte Landschaftsbild einzugliedern. Auf jeden Fall würde - allein aus Kostengründen - zuerst versucht, die bestehenden Höfe durch entsprechenden Umbau den neuzeitlichen Erfordernissen anzupassen. Der Staat leiste hier mit zinsverbilligten und z.T. zinslosen Darlehen wertvolle Hilfe.

Herr U.Scholz:

2. Standort. Molassezug von Greggenhofen und Weiler bei Untermaiselstein.

Vom Kottachberg lösen sich zwischen Humbach und Weiher niedrige Nagelfluhrippen ab, die als Ost-West-streichender Greggenhofener Zug das Illertal abriegeln und damit die Iller zum Ausweichen nach Westen, gegen Immenstadt, zwingen. Trotz geringer relativer Höhe (max. 60 m über das Vorland) bilden die dichtbewaldeten Nagelfluhrippen ein markantes Landschaftsglied. Wo die Straße nördlich Greggenhofens Molasse den Zug quert, kann man das Südostfallen der Nagelfluhbänke deutlich sehen.

Unser besonderes Interesse galt dem Weiher bei Untermaiselstein. Am Nordfuß des Greggenhofener Zuges treten Quellen und damit starke Versumpfungen auf. In einem Winkel zwischen Moränen und Nagelfluh liegt der Mühlweiher, dessen interessante Verlandungserscheinungen schon einmal Ziel einer unserer Exkursionen war.

Herr L.Müller:

Die Verlandung des Moorweihers erfolgt nicht nur vom Ufer, sondern auch von einigen Schwimraseninseln aus. Die größte dieser Inseln war über Bretter hinweg zugänglich. Etwa 10 Meter vom Rande entfernt hat diese Insel eine Bodenstärke zwischen 50 und 100 cm. Dann folgt darunter bis etwa 220 cm freies Wasser und dann kommen Moorablagerungen, die von PAUL um 1930 bis in eine Tiefe von 630 cm gefunden wurden. Erst bei dieser Tiefe ist der eigentliche Seegrund (Bänderton) erreicht.

Im offenen Wasser wachsen: Weiße Seerose (*Nymphaea alba*, LINNE)
Gelbe Teichrose (*Nuphar luteum*, (L.) SM.)
und die See-Binse (*Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA, syn.
Scirpus lacustris, LINNE).

Unmittelbar am Ufer finden wir die Zierliche Segge (*Carex gracilis*, CURT.) und noch etwa 2-3 Meter ans Land gehend die Faden-Segge (*Carex lasiocarpa*, EHRH., *C. filiformis*, auct).

Die Vegetation auf dem Schwingrasen ist sehr artenreich. Reichlich vorhanden sind:

- Gemeines Schilfrohr, *Phragmites communis*, TRIN.
- ✓ Rasen-Binse, Rasen-Haarsimse, *Trichophorum caespitosum*, HARTM.
- ✓ Alpen-Wollgras, *Trichophorum alpinum* (L.) PERS. (*Eriophorum alpinum*, LINNE)
- ✓ Scheidiges Wollgras, *Eriophorum vaginatum*, LINNE
- ✓ Weißes Schnabelried, *Rhynchospora alba* (L.) VAHL
- ✓ Fieber-Klee, *Menyanthes trifoliata*, LINNE
- ✓ Sumpf-Herzblatt, *Parnassia palustris*, LINNE
- ✓ Gemeiner Gilbweiderich, *Lysimachia vulgaris*, LINNE
- ✓ Kelch-Simsenlilie, *Tofieldia calyculata*, (L.) WAHLENBERG
- ✓ Sumpf-(Schlamm-)Segge, *Carex limosa*, LINNE
- ✓ Blumen-Binse (Sumpf-Blasenbinse), *Scheuchzeria palustris*, L.

- ✓ Rundblättriger Sonnentau, *Drosera rotundifolia*, LINNE
- ✓ Bastard-Sonnentau, *Drosera obovata*, MELT. et KCH. =
(*D. rotundifolia* x *D. anglica*)
- ✓ Moosbeere, *Oxycoccus quadripetalus*, GILIB. (*Vaccinium* o., L.)
- ✓ Rosmarin-Heide (Gränke), *Andromeda polifolia*, LINNE
- ✓ Gemeines Heidekraut, *Calluna vulgaris* (L.) HULL.
- ✓ Hain-Gilbweiderich, *Lysimachia nemorum*, LINNE
- ✓ Traunsteiner's Knabenkraut, *Orchis traunsteineri*, SAUT.
- ✓ Sumpf-Läusekraut, *Pedicularis palustris*, LINNE
- ✓ Faulbaum, *Rhamnus frangula*, LINNE

Als Raritäten tauchten auf:

- ✓ Langblättriger Sonnentau, *Drosera anglica*, HUDS.
nur in einem Polster gefunden, ein Elternteil des Bastards
- ✓ Strauß-Gilbweiderich, *Lysimachia thyrsoiflora*, LINNE
- ✓ Fadenwurzlige Segge, *Carex chordorrhiza*, EHRH.
- ✓ Armblütige Segge, *Carex pauciflora*, LIGHTF.
- ✓ Moos-Birke, *Betula pubescens*, EHRH.
- ✓ Latsche (Berg-Kiefer), *Pinus mugo*, TURKA, (*P. montana*, MILL.)
- ✓ Gemeine Fichte (Rottanne), *Picea abies*, (L.) KARSTEN,
(*Picea excelsa*, (LAMK.) L.K.) im Kümmerwuchs
- ✓ Gemeiner Wacholder, *Juniperus communis*, LINNE
- ✓ Sumpf-Bärlapp, *Lycopodium inundatum*, LINNE
- ✓ Sumpf-Weichwurz, *Hemmarbye paludosa* (L.) O.KTZE.,
(*Malaxis paludosa*, (L.) SM.)
- ✓ Sumpf-Glanzkräut, *Liparis loeselii* (L.) RIPH.

Aus vorstehender Pflanzenliste ist ersichtlich, daß wir hier die Charakterarten unserer drei Moortypen (Flach-, Zwischen- und Hochmoor) beisammen vorfinden.

Herr H. Mendl:

An Odonaten wurden im Bereich des Moorweihers folgende Arten beobachtet und z.T. gefangen:

- Mendl
- ✓ *Lestes dryas*, KIRBY (neu gegenüber der Meldung vom Vorjahr (siehe "Mitteilungen" Folge 2/1963(3) und Nachtrag in Folge 1/1964 (4)!).
 - ✓ *Lestes sponsa*, HANSEM.
 - ✓ *Agrion puella*, L.
 - ✓ *Agrion pulchellum*, v.d. LIND.
 - ✓ *Aeschna grandis*, L.
 - ✓ *Anax imperator*, LEACH.
 - ✓ *Cordulia aenea*, L.
 - ✓ *Somatochlora metallica*, v.d. LIND.
 - ✓ *Somatochlora flacomaculata*, v.d. LIND. (es gelang vor allem der Fang von mehreren der äußerst scheuen und schwer erreichbaren Weibchen dieser Art, alle in copula!)
 - ✓ *Libellula quadrimaculata*, L.
 - ✓ *Leucorrhinia dubia*, v.d. LIND. (neu gegenüber der Meldung vom Vorjahr!, siehe "Mitteilungen" Folge 2/1963 (3) und Nachtrag in Folge 1/1964 (4)!).

Im träge fließenden und schmutzigen Moorauslauf wurde an Plecopteren gefunden:

- ✓ *Nemurella picteti*, KLAPÁLEK 1900.

Gliederung der Molasse im Allgäu

Miozän	Obere Süßwassermolasse		Vorlandmolasse, ungefalt, Südrand aufgebogen
	Obere Meeresmolasse		
Oligozän	Untere Süßwassermolasse	Kojenschichten Steigbachschichten Heibachschichten	Subalpine Molasse, gefaltet
	Untere Meeresmolasse	Bausteinschichten Tonmergelschichten	

Die Geologie des Exkursionsgebietes

- I-IV = tekton. Einheiten des Gräntengebietes
- ▨ = Schollenkalke der Kreide
- ||||| = Nummulitenkalke des Tertiärs
- TTTTT = Überschiebungen am Alpenrand - Grenze zwischen Helvetikum und Molasse
- = Nagelfluh vorwiegend
- - - - = Störungslinien in der Molasse
- ↔ = Exkursionsweg

1. Die ... 2. Die ... 3. Die ... 4. Die ... 5. Die ...

Herr U. Scholz:

Wir überquerten die Molasserippen gegen den Ort Greggenhofen. Von diesem Ort streicht ein etwa 1 km langer, 200 m breiter Höhenzug nach Süden ab. Auf seinem Scheitel verläuft die Straße nach Agathazell. Er besteht, wie an verschiedenen Aufschlüssen beobachtet werden kann, aus Kiesen und Sanden in Kreuzschichtung, die von Moränen überlagert werden. Professor E. Kraus deutete diesen Höhenzug als Os. Ose sind subglaziale Schmelzwasserschüttungen, also in Eistunnels unter hydrostatischen Verhältnissen gebildete Ablagerungen. Der einstige Schmelzwassertunnel mag sich im Illergletscher an jener Stelle gebildet haben, wo von dem in breiter Front nach Norden dringenden Gletscher ein östlicher Einstrom in die Rettenberger Senke abschwänkte. Diese Aussparungsbewegungen des Eises, verursacht durch die Stauwirkung des Rottachberges, mögen sich wohl nur in den tieferen Partien des hier über 700 m mächtigen Gletschers voll ausgewirkt haben. Auch bei Weiler stehen interessante eiszeitliche Ablagerungen an, die zu besuchen leider keine Zeit war.

3. und 4. Standort.

Rebellionshügel südlich Agathazell und Steinbruch der Grüntenschanze.

Vom Rebellionshügel bietet sich ein interessanter Einblick in fast alle Bauglieder der Allgäuer Alpen: Molasse im W, N, NO. Flysch im SW, das Kalkalpin als abschließende Kulisse im S und unmittelbar vor uns im SO Das Kreidegebiet des Grüntens. Wir befinden uns hier an einer der wichtigsten Nahtlinien der Alpen: der steilen Aufschiebungsfläche der eigentlichen Alpen (hier das Helveticum) auf die nördlich anschließende subalpine Molasse. Die scharf ausgeprägte Linie zieht vom Gunzesrieder Tal durch die Niederung nördlich Agathazell über den NO-Abfall des Grüntens nach O.

Die "Bausteinschichten" der Unteren Mesozo-Molasse (Murnauer Mulde) sind über Wagneritz östlich vom Standort gut zu erkennen. Sie liefern eines der wenigen brauchbaren Gesteine des Allgäus (Steinbrüche bei Kranzegg). Abgesehen von der aus Molasse aufgebauten NO-Flanke (Breitensteiner Berg) ist der Grüntens aus Schichten der helvetischen Kreide gebildet, die hier zu steilen Sätteln und Schuppen zusammengeschieben wurden. A. Heim unterschied 4 solche tekton. Einheiten im Grüntengebiet. Vor uns, unmittelbar im SO, sehen wir die zweite Einheit, das verquetschte Gewölbe der Schanze.

An dieser Stelle sei eine kurze Untercheidung zwischen Alpen und Molassegebirge eingefügt:

Die Alpen sind aus verschiedenen Bauelementen (z.T. Decken) aufgebaut, weisen vielfältige Gesteine auf, die vom Perm bis zum Eozän in einem Zeitraum von 180 Millionen Jahren in Teilbecken des Tethysmeeres zur Ablagerung gekommen waren. Die Molasse ist hingegen in einer nördlichen Vorsenke gebildet worden, und zwar nach der eigentlichen Alpenfaltung. Ihre Gesteinsfolge ist eintönig, K Nagelfluhen und Mergel. Die Bildungszeit umfaßt Oligozän und Miozän (30 Millionen Jahre). Ihr südlicher Teil, die subalpine Molasse, wurde erst im Pliozän gefaltet.

Unterhalb des Rebellionshügels blickt man in westlicher Richtung über weite Moorflächen, die jedoch heute zum größten Teil abgestockt sind und kultiviert sind. Man nimmt an, daß hier in postglazialer Zeit ein See bestand. Die alten Siedlungen liegen am trockenen Rand des Illertales.

- 10 -

Herr H. Prinz:

Zur Grünfütteretrocknungsanlage bei Agathazell ist zu bemerken, daß bisher nur eine Anlage im Landkreis Sonthofen, zwei im Landkreis Kempten, eine im Landkreis Füssen und drei im Landkreis Marktoberdorf stehen. Wertvolles, junges Grünfütter wird in einer mit Öl geheizten Trommel auf etwa 20 % Wassergehalt getrocknet. Als besondere Vorteile sind der hohe Futterwert des Grünmehls (nur 5-8 % Nährstoffverluste) und die weitgehende Erhaltung des Karotingehaltes als Vorstufe des für die Tiere sehr wichtigen Vitamin A hervorzuheben. Leider halten die hohen Trocknungskosten viele Bauern von der Benützung der Anlagen ab.

Herr U. Scholz:

Ein kurzer Aufenthalt im Steinbruch der Grüntenschanze zeigte uns einige charakteristische, am Aufbau des Helveticums beteiligte Gesteinsschichten: Brisisandstein, Twirren- und Knollenschichten der Mittleren Kreide, Glaukonitreiche (schwarze oder grüne) Kalksandsteine, die für Flußverbauungen und als Straßenschotter gebrochen werden. Sie werden überlagert von den hellen pyrithaltigen Seewerkalken der Oberen Kreide. Leider ist das schönste felsbildende Gestein des Helvetikums, der Schrattenkalk, hier nicht aufgeschlossen.

Herr L. Müller:

Jedes Spältchen im Fels wird hier von Pflanzen besiedelt und wir fanden im Umkreis von einigen Metern

- ✓ Nesselblättrigen Ehrenpreis, *Veronica urticaefolia*, JACQ._{o.o.}
(*V. latifolia*, L. em. SCOP.) /L.
- ✓ Lebendgebärendes Alpen-Rispengras, *Poa alpina* var. *vivipara*
- Zerbrochlicher Blasenfarn, *Cystopteris fragilis*, (L.) BERNH.
- Brauner Streifenfarn, *Asplenium trichomanes*, LINNE,
- Grüner Streifenfarn, *Asplenium viride*, HUDS.,
- Tautenkropf-Leinkraut, *Silene inflata*, SM.,
(*S. cucubalus*, WIBEL),
- ✓ Nickendes Leinkraut, *Silene nutans*, LINNE,
- Rauhhaarige Gänsekresse, *Arabis hirsuta*, (L.) SCOP.,

Überraschend für uns alle waren herrlich-große Exemplare von der Mondraute, *Botrychium lunaria*, (L.) SW.,

Vom oberen Rand des Steinbruchs grüßen uns die

- Fehaarte (Rauhblättrige) Alpenrose, *Rhododendron hirsutum*, L.
- und der Blaußgelbe (Großblütige) Fingerhut, *Digitalis ambigua*, MURR.
(*D. grandiflora*, MILL.).

Nach soviel Geologie und Botanik wurde die Mittagspause in Burgberg als recht erholend empfunden.

Herr U. Scholz:

5. Wanderung in die Starzlachklamm.

Die Vagen wurden in Winkel abgestellt. Der Weg in die Klamm führt nördlich der Starzlach auf halber Höhe. Am Hang sind die Stadschiefer als jüngstes (obereozänes) Glied der helvetischen Schichtfolge aufgeschlossen. Sie bilden das Hangende der weiter im Norden am Scheitel des Höhenzuges ausstreichenden Nummulitenkalke (Mitteleozän). Die Stadschiefer sind leicht verwitternde Mergel-schiefer, quellreich und rutschungsgefährdet.

Nach dem Überqueren des Baches geht dann der Weg im lockeren Buchen-Bergulmen-Mischwald weiter.

Am feuchten Hang gedeihen:

Gemeiner Wurmfarn, *Dryopteris filix-mas* (L.) SCHOTT.
Gelappter Schildfarn, *Polystichum lobatum* (HUDS.) CHEVALL.
(*P. aculeatum*, (L.) ROTH.)

Lanzen-Schildfarn, *Polystichum lonchitis* (L.) ROTH. und
Gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüß, *Polypodium vulgare*, LINNE
sehr gut.

Der Bären-Leuch, *Allium ursinum*, LINNE
wurde uns zuerst durch seinen aufäringlichen Zwiebelgeruch gewahrt
und ein weiteres Liliengewächs,

der Stengelumfassende Knotenfuß, *Streptopus amplexifolius* (L.
DC.), blühte in einigen großen Stöcken dicht am Wege.

Den ganzen Waldweg entlang begleiteten uns

Türkenbund-Lilie, *Lilium martagon*, LINNE,
Schwalbenwurz-Muzian, *Gentiana asclepiadea*, LINNE,
Berg-Flockenblume, *Centaurea montana*, LINNE,
Wolfs-Eisenhut, *Aconitum lycoctonum*, LINNE und
Alpen-Milchlattich, *Cicerbita alpina*, (L.) WALLR.

An den sonnigen Lichtungen blühte das

Rote Waldvögelein, *Cephalanthera rubra* (L.) RICH.,
Blasgelber (Großblütiger) Fingerhut, *Digitalis ambigua*
MURR., (*D. grandiflora*, MILL.) und

✓ Dunkle Akelei (Schwarzviolette Akelei),
Aquilegia atrata, KOCH.

Im Halbschatten gedeihen

Wirbelblättrige Weißwurz, *Polygonatum verticillatum* (L.) AL.
Wald-Sanikel, *Sanicula europaea*, LINNE,

✓ Ahren-Christophskraut, *Actaea spicata*, LINNE,
✓ Braune Haselwurz, *Asarum europaeum*, LINNE und

die hohen Blütenrispen des

Wald-Geißbart, *Aranus dicitus* (WALT.) FERRELD.,
(*A. silvester*, KOSTEL).

An einer kleinen Quelle fielen uns auf lehmigen Boden die

✓ Kelch-Simsenlilie, *Tofieldia calyculata* (L.) WAHLENB.,

✓ Lebendgebärender Knöterich, *Polygonum viviparum*, LINNE

und das insektenfressende

✓ Gemeine (Echte) Fettkraut, *Pinguicula vulgaris*, LINNE auf

Herr H. Mendl:

In Bächen bei Burgberg wurden nachstehen aufgeführte Plecoptere
festgestellt:

Protonemura suberti, ILLIES 1954
- " - intricata, RIS 1902
Amphinemura sulcicollis, STEPHENS 1835
- " - staudfussi, RIS 1902
Nemoura cinerea, RETZIUS 1783
Leuctra inermis, KEMPNY 1899
- " - nigra, KEMPNY 1898

Isoperla rivulorum, E. PICTET 1841

und in der Starzlachklamm trotz eifrigem Suchen nur

Dinoceras cephalotes, CURTIS 1827

und 3 Exuvien einer *Perla*-Spezies.

Im aufsteigenden Gewitter begann die Rückfahrt, bei der während einer kurzen Pause an der Iller bei Seifen ganze Schwärme von

Chloroperla tripunctata, SCOPOLLO 1763

fliegend beobachtet werden konnten.

Herr U.Scholz:

Literatur: E.Kraus, O.M.Reis,
Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern,
Blatt Immenstadt, Mü 1919.
Geologische Übersichtskarte der Süddeutschen Molasse
= 1:300 000 und Erläuterungen, Mü 1955.
A.Heim, Zur Geologie des Grüntens, Zürich 1919.

4. Die Teiche des Gutes Schwabalsberg zwischen Kempten und Heiligkreuz (Bericht über die floristische Begehung am 09.10.1964)

Lorenz Müller und Dr. E.Dörr

Dank einer freundlichen Vermittlung von Herrn Prinz (Landwirtschaftsschule Kempten) und dank des großzügigen Entgegenkommens von Herrn Stockert (Gut Schwabalsberg) war es uns möglich, die abgelassenen Fischteiche dieses Gutes floristisch gründlich zu durchforschen und dabei neue Erkenntnisse über die Vegetation um Kempten zu gewinnen.

Die Gesamtanlage dieses Fischereigutes in der Nähe unserer Stadt besteht aus drei verschiedenen großen Teichen, die zudem kleinere Nebenbecken aufweisen. Im Juni d.J. wurde der oberste (westliche), im Hochsommer der mittlere und Mitte September der untere (große) Teich nach etwa 7-jähriger Pause erstmals abgelassen. Die einzelnen Becken erbrachten denn auch einen unterschiedlichen Grad der Vegetationsbedeckung. Größere pflanzenfreie Flecken - von abgelagerten Wasserpflanzen abgesehen - zeigte nur der zuletzt entwässerte große Teich. Im mittleren Teich waren nur noch kleine Flächen ohne Pflanzenbeseidung. Das im Frühjahr abgelassene Becken des oberen (westlichen) Teiches erschien dem unbefangenen Beobachter kaum mehr als ehemalige Wasserfläche, so stark hatten es Schilf und Rohrkolben bereits überwuchert. Der verschiedenen Vegetationsdichte entsprach die festgestellte Artenzahl. Die meisten Arten entdeckten wir im mittleren Teich, die wenigsten im großen. Der obere (westliche) Teich nahm eine Mittelstellung ein. Hier hatten Schilf und Rohrkolben empfindlichere Schlammbewohner schon weitgehend verdrängt.

Liste der aufgenommenen Arten:

1) Oberer (westlicher) Teich:

Wasserpflanzen: *Potamogeton pusillus*, L., Kleines Laichkraut
Potamogeton lucens, L., Spiegelndes Laichkraut
(beide in einem Graben)
Hippuris vulgaris, L., Gemeiner Tannenwedel
(in Land- und Wasserformen)
Nymphoides peltata (GMEL.) O.KTZE.
(*Limnanthemum nymphaeoides*, LK.)
Rothblättrige Seekanne, Teichblume.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturkundliche Beiträge aus dem Allgäu = Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises Kempten \(Allgäu\) der Volkshochschule Kempten](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [8_2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Abend vom 9. November 1964. 3-13](#)