

Gerhard Landau

"Naturschutz in Nordhessen, Heft 12/1992"

**BEMERKENSWERTE BRUTZEITBEOBACHTUNGEN
IM STADT- UND LANDKREIS KASSEL VON 1988-1991**

Beobachtungsdaten aus dem Berichtsjahr 1991 wurden der Meldestelle erst zu einem Teil zugestellt. Eine komplette Übersicht kann daher hier nicht gegeben werden.

HAUBENTAUCHER

- | | | |
|------|----|---|
| 1988 | 11 | BP (8 Fuldaaue Kassel, 2 Karlsaue Kassel,
1 NSG Ochsenhof) |
| 1989 | 7 | BP, alle Fuldaaue Kassel. 5 Nachbruten werden
festgestellt. |
| 1990 | 8 | BP, Fuldaaue und Kieselsee Bergshausen |
| 1991 | | Erstmals gibt es Brutnachweise aus dem NSG
Hengstwiese, Naumburg |

(Rundau, Landau, Schumann)

ZWERGTAUCHER

- | | | |
|------|--------|---|
| 1988 | 7 | BP, außerdem 2 x Brutverdacht |
| 1989 | 13 -14 | BP, u.a. v. Stellbergsee in der Söhre
(Erstnachweis) |
| 1990 | 11 | BP |

(Lucan, Henkel u.a.)

GRAUREIHER

- | | | |
|------|----|---|
| 1988 | | 2 von 32 BP der großen Weser-Kolonie sind
Bodenbruten!
Ein Einzelnachweis liegt aus dem Bereich Kragenhof
vor. |
| 1989 | 30 | BP Kolonie an der Weser |

(Schumann)

KANADAGANS

- | | | |
|------|--|---|
| 1990 | | Erstmals gelingen Bruten im Berichtsgebiet: Die Nach-
weise kommen vom NSG Hengstwiese und vom Stadtteich
in Naumburg |
| 1991 | | Erneut erfolgreiche Brut im vorgem. NSG |

(Dux, Lucan)

GRAUGANS

- 1989 Erstnachweis einer Graugansbrut im Gebiet: 4 Gössel
werden in der Karlsaue Kassel groß
1990 1 BP in der Karlsaue Kassel mit 6 juv.
1991 1 BP in der Karlsaue Kassel mit 4 juv.
(Runda, Landau, Teubert)

TAFELENTE

- 1988 2 BP mitt 6 bzw. 3 juv. im NSG Kelzer Teiche
1989 1 BP brütet am Unteren Kelzer Teich
(Brinckmeier, Reubert, Schumann)

REIHERENTE

- 1988 5 BP brüten in den NSG Fuldaue Kassel, Rothenberg u.
Kelzer Teiche
1989 2-3 BP werden im NSG Hengstwiese, Naumburg und im
Bereich des Rothenküler Teiches festgestellt. Im
erstgen. Gebiet sind 7 von 8 Küken das Opfer von
Graureihern!
1990 Erstmals ist die Reiherente Brutvogel am Hugenotten-
teich in Mariendorf
1991 3 BP im NSG Rothenberg, Bereiche Rothenküler Teiche
u. Tonkaule
(Behrend, Teubert, H. Wolf u.a.)

WESPENBUSSARD

- 1988- 1989 3 bzw. 2 Nachweise
1990 1 Brutversuch in der Söhre
(Wilke, Kördel)

ROHRWEIHE

- 1988 1-2 BP
1989 1 BP, darüberhinaus besteht Brutverdacht an den Kelzer
Teichen
1990 Es wird wieder ein Brutpaar vermutet
1991 1 BP wird gemeldet (Ob. Essetal)
(Behrend, Reubert, Siebert)

BAUMFALKE

- 1989 Nach Krüger und Wilke kann mit 8 Brutpaaren gerechnet werden. Für die anderen Berichtsjahre liegen nur spärliche Bruthinweise vor.

WANDERFALKE

- 1988-1991 Die Auswilderungen im Kasseler Gebiet werden eingestellt; zum ersten Mal siedelt sich ein Paar in Kassel (Lutherkirche) an und zieht dort auch in den Folgejahren 3 - 4 Junge groß
- 1991 ist ein Totfund in Kassel zu beklagen

(Hammer)

WASSERRALLE

- 1988 1 BP mit anfangs 4 juv. werden am Rothenküler Teich nachgewiesen
- 1989 Zur Brutzeit werden Rallen verhört am Kelzer Teich (wie auch 1988) sowie bei Burguffeln, Hellingenrode und Vollmarshausen
- 1990 1 Brut am Steinertsee in Kaufungen
- 1991 1 BP im NSG Rothenküler Teich bei Burguffeln
(Behrend, Kördel, Teubert u.a.)

KIEBITZ

- 1988 30-40 BP im Kasseler Becken u. Essetal
- 1989 ca.20 BP. Ein hoher Krähenbestand läßt ab 1989 in der Fuldaaue nur noch wenige Jungvögel groß werden.
- 1990 ca.15-25 BP im Gebiet. Die Berichte für 1991 sind unvollständig.
- (Lucan, Jessert, Rundau u.a.)

FLUSSREGENPFEIFER

- 1988 7-8 BP, darunter 4 erfolgr. Bruten im NSG Fuldaaue Kassel. Für dieses Gebiet besteht ab 1989 ebenfalls das Krähenproblem.
- 1989-1990 1-5 Brutversuche bzw. Brutverdacht
(Neumann, Henkel, Kördel u.a.)

BEKASSINE

- 1991 1 Paar hält ein Revier in einer Feuchtwiese in Kaufungen (Kördel)

FLUSSUFERLÄUFER

- 1990 Es besteht aktueller Brutverdacht im Fuldaabschnitt Dittershausen/Dennhausen (Köhler, Muster)

UHU

- 1988 2 BP brüten im Nordteil des Kreises
1989 1 BP Hangbrut im Raum Ahnatal (Brinckmeier, Krüger, Reubert, W. Wolf u.a.)

STEINKAUZ

- 1990/91 Es besteht wieder Brutverdacht im Gebiet. Vorkommen werden aus dem Raum Naumburg/Balhorn/Wolfhagen gemeldet. (Dux, Lucan, Tresio)

RAUHFUSSKAUZ

- 1988 5 Bruten im Bereich der FA Kaufungen
1989 4 Bruten im vorgeh. Gebiet. Neben Ad. werden 13 bzw. 12 (1989) Jungkäuze beringt (Lindner)

EISVOGEL

In allen vier Jahren besteht Brutverdacht; 1990 wird eine mehrfach beflogene Brutröhre im Fuldatal unterhalb von Kassel festgestellt. (Grebe, Gerlach)

MITTELSPECHT

In der Berichtszeit gibt es lediglich 1 - 3 Brutnachweise. (Henkel, Hochrath u.a.)

WENDEHALS

- 1988-1989 Im Beobachtungsgebiet gibt es 7 - 8 Gesangsplätze.
1990-1991 Es liegen 1 Brutnachweis bzw. 1 x Brutverdacht vor.
(Lucan, Nitsche, Teubert)

HAUBENLERCHE

- 1988-89 4 Reviere in Kassel, Lohfelden und Baunatal
1990 kein Brutnachweis im Gebiet
1991 1 Revier in Lohfelden (Brutverdacht)
(Hedewig, Kördel, Gottstein)

UFERSCHWALBE

- 1988 3 Kolonien mit etwa 140 beflogenen Brutröhren
1989 5 Kolonien mit ca. 150 Bruten
1990 1 Kolonie mit ca. 70-100 Brutpaaren
1991 1 Kolonie mit ca. 40 Brutpaaren
(Alle Kolonien befinden sich in den Gemarkungen von
Kaufungen, Lohfelden u. Fuldabrück-Bergshausen
(Henkel, Kördel, Rundau)

GRAUWÜRGER

- 1988 8-9 BP mit Schwerpunkt Immenhausen/Reinhardswald
1989-91 ca.3 Brutreviere
(Behrend, Reubert, Schumann)

WASSERAMSEL

- 1988 ca. 40 Bruten an größeren Wasserläufen im ges.
Kreisgebiet
1989 ca. 50 Brutnachweise werden gemeldet
1990 ca. 25 Bruten werden registriert
(Dellnitz, Kaufmann, Reinhard u.a.)

SCHLAGSCHWIRL

- 1989 Es besteht Brutverdacht im NSG Rothenberg/Tonkaule
(Reubert, Teubert)

SCHWARZKEHLCHEN

- 1988 3-4 BP im Reinhardswald und in Kassel-Niederzwehren
1989 3-5 BP im Reinhardswald

(Schumann, Landau)

BRAUNKEHLCHEN

- 1988 2 BP im ob. Höllebachtal östl. Hohenkirchen mit
flüggen Jungen
1989 3 BP zeigen sich in Hohenkirchen, bei Westuffeln
und Wellerode

(Ress, Neumann, Wilke u.a.)

BEUTELMEISE

- 1988 Es besteht Brutverdacht in 10 Gebieten des Kasseler
Beckens, an Fulda, Weser u. Diemel. Schau- und Brut-
nester können nachgewiesen werden.
1989 Brutverdacht besteht mit 2 -6 Paaren.
1990 Brutverdacht melden Beobachter für Fuldaaue Kassel,
NSG Ochsenhof/Weser und NSG Vollmarshäuser Teiche.
1991 Im Kasseler Becken sind 4 Brutzeitvorkommen nachge-
wiesen

(Haag 1, Hedewig, Modes u.a.)

BIRKENZEISIG

- 1988 6 Brutzeitnachweise im Kasseler Becken
1989 5 Vorkommen im Raum Kassel und Wolfhagen
1990 6 Gebiete mit Brutverdacht (Kasseler Becken)
1991 1 besetztes Nest in Ortslage Großenritte;
Brutzeitbeob. in Kassel-Oberzwehren

(Wolfram, Landau)

PIROL

- 1988 4 Brutzeitvorkommen im Essetal
1989 4 Brutzeitnachweise im Essetal u. Reinhardswald-NW
1990 2 Sommerbeobachtungen in Kassel u. Calden
1991 1 x Brutverdacht f. Langenberge, Gem. Großenritte

(Hüge, Jessert, Krüger u.a.)

TANNENHÄHER

- 1988 In Rothwesten werden flügge Junge beobachtet; Reviere wie schon früher bes. im Kaufunger Wald u. Söhre-Warpel
- 1989 Zur Brutzeit wird die Art auch am Bärenberg festgest.
- 1990 Sommernachweise aus dem südl. Reinhardswald um Immenhausen, desgl. mehrere Brutpaare i.d.Rfö. Wattenbach ermittelt
- (Kördel, Ress, Rundau u.a.)

DOHLE

- 1988 7-8 BP im Staatsforst Naumburg, in Wolfhagen und Kassel
- 1989 6 nachgewiesen BP, davon 4 wiederum in Wolfhagen (Stadtkirche); Brutverdacht in Fuldaaue KS, bei Balhorn u. Weimar
- 1990 Brutzeitbeobachtungen in Kassel, Niestetal und Hofgeismar
- 1991 ca.5 BP Wolfhagen
- (Lucan, H. Wolf u.a.)

KOLKRABE

- 1988 1 BP Reinhardswald
- 1989 2 BP Reinhardswald und Söhre
- (Schumann, Wilke u.a.)

Anschrift des Verfassers:

Gerhard Landau
Jugendheimstr. 14
3500 Kassel-Obzw.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naturschutz in Nordhessen](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [12_1992](#)

Autor(en)/Author(s): Landau Gerhard

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Brutzeitbeobachtungen im Stadt- und Landkreis Kassel von 1988-1991 155-161](#)