

Anas clypeata. Im Mai 1842 brüteten einige Paare Löffelenten am Federsee. Ich beobachtete immer drei Männchen, welche stets zusammenhielten. Endlich fand Landbeck am 26. Mai ein Nest mit zehn Eiern und erlegte das brütende Weibchen.

Nach Landbeck's Beobachtungen brüten am Boden- und Federsee *Scotopax major* und *gallinula* (?), *Totanus hypoleucos*, *ochropus*, *calidris* und *glottis*, *Machetes pugnax*, *Anas ferina*, *leucophthalmos*, *acuta*, *crecca*, *querquedula*, vielleicht auch *marila*. Am Bodensee *Mergus merganser*.

H.

Vogel-Fauna des Wupperthals.

Nach Beobachtungen von Dr. Hopff mitgetheilt

von

Dr. Fuhlrott

in Elberfeld.

I. *Raptatores*. Raubvögel.

Species

Fam. *Strigidae*. Eulen.

Strix aluco, *flammea*, *otus*, *brachyotus*, *noctua*, *Tengmalmi* 6

Fam. *Accipitrinae*. Hächte.

Falco rufus, *pygargus*, *buteo*, *lagopus*, *apivorus*, *milvus*, *palumbarius*, *nisus*, *tinnunculus*, *subbuteo*, *peregrinus* 11

Aquila albicilla, *haliaëtos* 2

II. *Syndactyli*. Heftzeher.

Fam. *Halcyones*. Eisvögel.

Alcedo ispida 1

III. *Zygodactyli*. Paarzeher.

Fam. *Picidae*. Spechte.

Jynx torquilla 1

Picus viridis, *major*, *leuconotos*, *medius*, *minor* 5

Fam. *Cuculidae*. Kuckucke.

Cuculus canorus 1

IV. *Oscines.* Singvögel.

Fam. <i>Corvinac.</i> Raben.	
Corvus Corax, Corone, Cornix, frugilegus, monedula, Pica, glandarius, Caryocatactes	8
Sturnus vulgaris	1
Fam. <i>Laniadae.</i> Würger.	
Lanius excubitor, collurio, minor, ruficeps	4
Fam. <i>Muscicapidae.</i> Fliegenschnäpper.	
Muscicapa grisola	1
Fam. <i>Ampelidae.</i> Schmuckvögel.	
Bombycilla garrula	1
Fam. <i>Turdidae.</i> Drosseln.	
Turdus viscivorus, pilaris, musicus, merula, torquatus, iliacus	6
Oriolus galbula	1
Cinclus aquaticus	1
Fam. <i>Sylviadae.</i> Säger.	
Saxicola rubetra, oenanthe	2
Sylvia tithys, phoenicurus, luscini, rubecula, sibilatrix, arun- dinacea, hypolais, trochilus, hortensis, curruca, cinerea, atricapilla, suecica, rufa	14
Troglodytes vulgaris	1
Anthus campestris, pratensis, aquaticus	3
Motacilla alba, sulphurea, flava	3
Fam. <i>Paridae.</i> Meisen.	
Regulus flavicapillus, ignicapillus	2
Parus cristatus, palustris, ater, major, caeruleus, cyanus, cau- datus	7
Fam. <i>Fringillidae.</i> Finken.	
Alauda arvensis, cristata, arborea	3
Emberiza miliaria, citrinella, hortulana	3
Fringilla domestica, montana, petronia, caelebs, montifringilla, coccothraustes, chloris, carduelis, cannabina, linaria, spinus, citrinella	12
Pyrrhula vulgaris	1
Loxia curvirostra	1

V. *Tenuirostres*. Dünnschnäbler.Fam. *Certhiadae*. Baumläufer.

<i>Sitta europaea</i>	1
<i>Certhia familiaris</i>	1

Fam. *Epopidae*. Wiedehopfe.

<i>Upupa epops</i>	1
--------------------	---

VI. *Fissirostres*. Schwalbenvögel.Fam. *Hirundinidae*. Tagschwalben.

<i>Hirundo riparia, urbana, rustica</i>	3
<i>Cypselus apus</i>	1

Fam. *Caprimulgidae*. Nachtschwalben.

<i>Caprimulgus europaeus</i>	1
------------------------------	---

VII. *Columbae*. Tauben.Fam. *Columbae*. Tauben.

<i>Columba palumbus, oenas, turtur, domestica</i>	4
---	---

VIII. *Gallinae*. Hühner.Fam. *Tetraonidae*. Feldhühner.

<i>Tetrao urogallus, tetrax, bonasia</i>	3
<i>Perdix cinerea, coturnix</i>	2

Fam. *Phasianidae*. Hühner.

<i>Pavo cristatus</i>	1
<i>Gallus domesticus</i>	1
<i>Meleagris gallopavo</i>	1

IX. *Cursores*. Laufvögel.X. *Grallatores*. Sumpfvögel.Fam. *Gallinulae*. Sumpfhühner.

<i>Crex pratensis</i>	1
<i>Rallus aquaticus</i>	1
<i>Ortegometra Porzana, pusilla</i>	2
<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Fulica atra</i>	1

Fam. Gruidae. Kraniche.	
Grus cinerea	1
Fam. Charadriidae. Regenpfeifer.	
Charadrius auratus	1
Vanellus cristatus	1
Haematopus ostralegus	1
Fam. Scolopacidae. Schnepfenvögel.	
Scolopax gallinula, gallinago, major, rusticola	4
Numenius arquatus	1
Fam. Ardeidae. Reihervögel.	
Ardea cinerea, stellaris	2
Ciconia alba	1

XI. *Natatores*. Schwimmvögel.

Fam. Anatidae. Enten.	
Cygnus musicus	1
Anser segetum, cinereus, domesticus	3
Anas boschas, domestica, crecca, querquedula, clypeata, acuta, Penelope, tadorna, fusca, clangula, fuligula, marila	12
Mergus merganser, serrator, albellus	3
Fam. Pelecanidae. Pelikane.	
Phalacrocorax Carbo	1
Fam. Colymbidae. Taucher.	
Podiceps minor, cornutus	2
Fam. Porcellariae. Sturmvögel.	
Thalassidroma pelagica	1
Fam. Laridae. Seeschwalben.	
Larus argenteus, tridactylos*)	2
Sterna hirundo	1

Species 166

*) *Larus tridactylos* wurde im Frühjahr 1849 von mir hier beobachtet.
Fuhlrott.

Bemerkungen.

Die Classe der Vögel ist demnach im Wupperthale durch die daselbst vorkommenden Vögel in 10 Ordnungen, 30 Familien, 61 Gattungen und 166 Species repräsentirt, so dass man, die Zahl der Ordnungen als Einheit genommen und die Bruchtheile nicht mitgerechnet, für diese verschiedenen Abtheilungen des Systems die Verhältnisszahlen 1 : 3 : 6 : 16 erhält.

Wenn man mit ziemlicher Sicherheit die approximative Gesamtzahl aller auf der Erde lebenden Vögelspecies auf 6500 anschlagen darf, so würde die Fauna des $1\frac{3}{4}$ □ Meilen grossen Wupperthals fast den 40sten Teil der Gesamtzahl für sich in Anspruch nehmen. Bedeutender wird sich natürlich das Verhältniss stellen, wenn wir die hiesigen Vögel mit der Gesamtzahl der Vögel von ganz Deutschland vergleichen. Naumann hat in seinem 12bändigen berühmten Werke über die deutschen Vögel 365 Species beschrieben. Nach den Andeutungen, die derselbe in der Vorrede zum letzten Bande seines Werkes gibt, greifen wir nicht zu hoch, wenn wir mit Einschluss der noch nicht beobachteten, aber wahrscheinlich in Deutschland vorkommenden, die Totalsumme aller deutschen Vögel auf 400 anschlagen. Bei dieser Annahme wären in der hiesigen Fauna $\frac{165}{400}$, oder über $\frac{2}{5} = 0,4$ aller deutschen Vögel vertreten, während unter Annahme einer gleichmässigen Vertheilung der deutschen Vögel über das ganze, ungefähr 11,500 □ Meilen betragende Areal Deutschlands und unter Annahme stabiler Wohnplätze, wie sie den Pflanzen und in gewissen Sinne auch den meisten Thierclassen angewiesen sind, bei 400 deutschen Vogelspecies der Antheil für das kleine Areal des Wupperthals nur $\frac{1}{16}$ Species betragen würde. Die obigen Verhältnisszahlen liefern demnach die überzeugendsten Belege für eine ungleichmässige Vertheilung der Vögel und bestätigen zugleich, wie sehr der Reichthum der Faunen gewisser Gegenden durch das Flugvermögen der Vögel begünstigt wird. Aus dem sehr günstigen Verhältniss für die hiesige Gegend (= 0,4 aller deutschen Vögel) dürfte sich ferner ergeben, dass die Vögel, namentlich von den kleinen Sängern die Meisen, Finken und eigentlichen Sänger (die ganze Ordnung der Singvögel zählt in unserm Verzeichnisse 85 Species, wovon auf die drei genannten Familien allein 52 kommen) stark bevölkerte Gegenden und somit die Nähe des Menschen nicht nur nicht scheuen, sondern sogar vorzugsweise gern zum Aufenthalt zu wählen scheinen, wenn in Ansehung der hiesigen Gegend diese Wahl nicht noch mehr bedingt

sein sollte durch die eigenthümlichen Terrainverhältnisse, die in mannigfachem Wechsel zwischen Berg und Thal, mit unzähligen Quellen und Bächen eine üppige Wald-, Wiesen- und Ackervegetation begünstigen und den kleinen Sängern sowohl leichtern Schutz gegen die Raubanfälle grösserer Vögel, als auch die übrigen Bedingungen eines heitern Lebensgenusses zu bieten im Stande sind.

Es ist oben bereits bemerkt, dass in das Hopff'sche Verzeichniss einige Vögel mit aufgenommen sind, die nicht innerhalb der angegebenen Wupperthaler Grenzen, sondern in einiger Entfernung davon beobachtet wurden. Der Verfasser scheint angenommen zu haben, dass diese Luftsegler bei so geringer Entfernung leicht auch die hiesige Gegend hätten berühren können, und ich habe mich um so weniger für befugt gehalten, diese Vögel aus dem Verzeichnisse zu streichen, als ihre kleine Zahl die bereits gezogenen quantitativen Resultate nicht wesentlich alteriren konnte.

Es gehören dahin:

1) *Aquila albicilla* L., der Seeadler. Derselbe wurde bei Solingen, 2 $\frac{1}{2}$ Stunden von hier, erlegt und ist, obwohl in Norden und hauptsächlich in den Küstenländern Europa's zu Hause, vom October bis März fast überall in Deutschland einzeln anzutreffen.

2) *Cygnus musicus* Bechst., der Singschwan, ein nordeuropäischer Vogel, der auf seinem Zuge nicht selten die Rheingegend zu besuchen pflegt und sich einzeln auch wohl in's mittlere Deutschland verliert. Das Hopff'sche Exemplar wurde bei Mettmann, 1 Meile von hier, geschossen.

3) *Larus argenteus* Brönnich., die Silbermöve, vorzüglich häufig an den dänischen Küsten, wurde in der Ruhrgegend erlegt.

4) *Numenius arquata* Lath., der grosse Brachvogel, gehört in den gebirgigen Gegenden Deutschlands zu den Seltenheiten und wurde in der Nähe des Rheins geschossen.

5) *Haematopus ostralegus* L., der Austerndieb, findet sich nicht in Hopff's Verzeichniss, wurde aber in dem kalten Winter 1837 an einem Teiche bei Wülfrath geschossen und mir in einem Exemplare zugestellt.

Zu den zufälligen Erscheinungen in hiesiger Gegend, die an abgelegenen Seen und Sumpfpatrien so arm ist, gehört ohne Zweifel der grössere Theil der aufgeführten Lauf- und Schwimmvögel überhaupt, denen noch beizuzählen sein möchten: der Auerhahn, *Tetrao urogallus*, der Bergzeisig, *Fringilla linaria* und der rauhfüssige Kauz, *Strix Tengmalmi* Gmel. s. *Strix dasypus* Bechst. Das Hopff'sche Exemplar des Auerhahns wurde in dem etwa eine Stunde von Elberfeld entfernten Burgholze erlegt; der Bergzeisig erschien in grosser Zahl im Herbste 1847 in der

Nähe von Wülfrath und ein lebendiges Pärchen davon gelangte in meine Hände; der rauhfüssige Kauz endlich wurde im Herbste 1846 bei Horath, eine Stunde von hier, geschossen, und war der letzte Vogel, den der verstorbene Dr. Hopff mit grossem Vergnügen seiner Sammlung einverleibte. Da der hiesigen Gegend auch die Nadelholzwaldungen fehlen, so vermuthet Dr. Hopff, dass die ihm zugestellte *Loxia curvirostra* ein aus der Gefangenschaft entflohenes Exemplar gewesen sein möge.

Als die seltensten Gäste müssen jedoch der kleine Schwalbensturmvogel, *Thalassidroma pelagica Vigors.*, und der gehörnte Lappentaucher, *Podiceps cornutus Lichtenst.*, angesehen werden. *Thalassidroma pelagica*, der kleinste aller bekannten Schwimmvögel, bewohnt in grosser Menge den nördlichen Ocean zwischen Europa und Amerika, gehört aber auf der deutschen Nordsee, und zumal auf der Ostsee schon zu den Seltenheiten. Nur durch heftige Stürme wird er zuweilen an die deutschen und französischen Küsten verschlagen und dann in einzelnen Exemplaren auch wohl tief landeinwärts getrieben. Das hier beobachtete Exemplar wurde auffallender Weise in der Mitte Elberfelds an der Wupper lebendig gefangen und hielt, so lange es lebte, die Flügel stets wie zum Fluge ausgespannt, in welcher Stellung es deshalb der gegenwärtige Besitzer, Herr Seel sen. hieselbst, hat ausstopfen lassen. In dieser Stellung hält sich der Vogel, wie von Seefahrern oft beobachtet wird, auch trippelnd auf der Oberfläche des Wassers, oder läuft kurze Strecken über dieselbe, wesshalb ihn die Schiffer St. Petersvogel nannten, woraus später der Name Petrell gebildet worden ist. Es ist möglich, dass bei den weiten Luftreisen, die der Vogel bei heftigen Seestürmen zu machen gezwungen wird, die Spannung der Flügel gleichsam zu einer unwillkürlichen Thätigkeit erstarrt, so dass er dann, wie er fliegend lebte, selbst in der Gefangenschaft auch fliegend stirbt.

Podiceps cornutus wurde ebenfalls lebend, aber bereits so entkräftet, dass er sich mit der Hand greifen liess und bald darauf starb, in dem strengen Winter 1837 zwischen Elberfeld und Barmen an der Wupper gefangen und mir zugestellt. Da ich die Schwierigkeiten einer genauen Artbestimmung der Lappentaucher und auch die Seltenheit des Thiers damals nicht kannte, so versäumte ich, den Vogel im frischen Zustande zu beschreiben und sorgte zunächst für die Erhaltung seines schönen Balges, dessen hellweisser Atlasglanz auf der Brust und Bauchseite mich wahrhaft überraschte. Nachdem ich ihn ausgestopft zurückerhalten und dem Cabinet der hiesigen Realschule einverleibt hatte, habe ich später bei verschiedenen Gelegenheiten die Artbestimmung des Vogels, aber bei unzu-

reichenden Hilfsmitteln stets vergebens versucht; und es ist gewiss nicht uninteressant zu bemerken, dass mir in dieser Beziehung auch die auf meinen späteren Reisen von mir besuchten Naturalien-Cabinette keinen Aufschluss gaben, indem ich denselben Vogel zwar sowohl in der grossen Sammlung zu Leyden in Holland, wie in dem Naturaliencabinet zu Clausthal im Harze, aber an beiden Orten leider — ohne Namen wiederfand. Wenn ich daher in meinem Exemplar den Repräsentanten einer neuen, in Deutschland noch unbekanntem Species nicht ferner mehr erblicken konnte, und geneigt war, dasselbe für einen jungen Vogel im Winterkleide zu halten, insofern seine zarten Kopffedern zwar etwas dichter und länger als die Halsfedern, aber selbst aufgerichtet nicht in der Gestalt einer Haube oder eines Federkragens erscheinen, wie sie den reifen Vögeln dieser Gattung fast durchgängig eigen sind, so blieb ich über die vorliegende Species doch noch längere Zeit in Zweifel. Erst der 9te Band des Naumann'schen Werkes über die deutschen Vögel beseitigte meinen Zweifel, indem die hier gegebene ausführliche Beschreibung des jungen *Podiceps cornutus* in seinem ersten Winterkleide durchaus auf meinen Vogel passt, der somit jener Vogel ist, welcher von früheren Ornithologen unter dem Namen *Podiceps s. Colymbus obscurus* als eigene Species beschrieben wurde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1850

Band/Volume: [1_3](#)

Autor(en)/Author(s): Fuhlrott Johann Carl

Artikel/Article: [Vogel-Fauna des Wupperthals 74-81](#)