

Nichts Abweichendes von andern Grasmücken bemerkt. Er scheint die niederen Mimosengebüsche zu bewohnen.

Diese Art könnte identisch mit einer rothköpfigen Grasmücke sein, welche Landbeck in seiner „Systemat. Aufzählung der Vögel Württembergs“ unter dem Namen *Sylvia rubricapilla* beschreibt. Da aber nach ihm Niemand mehr seinen Vogel gesehen hat, derselbe auch nirgends abgebildet ist, vermag ich nichts Genaueres hierüber zu sagen.

Ueber den Namen Naumann's, den ich dem Vogel beilegte, bedarf es Ornithologen gegenüber keiner weiteren Erklärung, da sich jeder nur darüber freuen kann, dem würdigen Vater der Ornithologie eine, wenn auch unbedeutende, Huldigung gebracht zu sehen.

## Diagnosen der in dem ersten Bande der Beiträge zur Ornithologie Africa's von John Wilhelm von Müller enthaltenen neuen Species. \*)

*Aquila Brehmii* v. Müll. ist bereits in diesem Hefte besprochen.

*Spizaëtos zonurus* v. Müller. Sp. supra fuscus, metallice purpureosceus et nonnullis maculis albis pictus, subtus albus scopororum inaculis lanceolatis atrofuscis; remigibus cinereis, apice fuscis, basi albidis vexillo fasciis maculisque irregularibus; cauda elongata, cinerea, fasciis plurimis superioribus obsoletis, extrema latissima. Ex Abyssinia.

*Circaëtos cinerascens* v. Müll. C. cinereus, cauda nigri cum fuscâ solitari lata et radice alba. Ex Sennaar et Fassokl.

*Cypselus aequatorialis* v. Müll. C. magnitudine c. alpini et colore c. murarii. — Ex Abyssinia.

*Orihotomus griseo-viridis* v. Müll. O. subtus cinereus, medio abdominis albo; capite uropygio et dorso fusco-cinereo; stria supro-oculari isabellina; pallio, subscapularibus superioribus tibialibusque laete olivaceis; tectricibus caudae superioribus candidis. Ex Cordofan.

*Calamoherpe longirostris* v. Müll. C. turdoidi similis, rostro cranii longitudine, basi depresso ac compresso; pedibus atrofuscis. Ex Aegypt. infer.

*Sylvia Naumanni* v. Müll. Vid. descriptionem priorem.

\*) Wir beeilen uns um so mehr, die vorläufige Publikation dieser neuen Bereicherung der Ornis aufzunehmen, als manche dieser schönen Species, z. B. *Sylvia Naumanni* sicher, die beiden *Saxicolae* wahrscheinlich auch — wenigstens das Ehren-Bürgerrecht Europa's beanspruchen dürfen.

*Saxicola albicilla* v. Müll. S. loro, regione suboculari et orbiculari nigro; cauda alba, rectricibus duabus intermediis nigris, tertio earum longitudine parte basali cum caeteris rectricibus albis, prima earum et secunda apice nigro maculata; magnitudine *S. stapazinae*. Ex Abyssinia.

*Saxicola atricollis* v. Müll. S. facie, collo, regione orbiculari, pectore interioribus lateribus corporis aliquo nigris; tibialibus albis, basi cinereis; cauda alba rectricibus albis, apice nigro maculatis, intermediis duabus nigris, tertio suarum longitudine parte basali albis; — paulo major quam species anteced. Ex Abyssinia.

*Muscicapa lugubris* v. Müll. M. nigra; vexillis interioribus remigum subtus funereis. Ex Abyssinia.

*Musicapa pallida* v. Müll. M. subra umbrino cinerea; stria supra oculari, annulo circa oculos lateribus colli et corporis, pectore scapularibusque inferioribus rubro-isabellinis; vexillis interioribus remigum eodem colore marginatis; pectore et abdomine immaculato. Ex Abyssinia et Kordofan.

*Ploceus melanogenis* v. Müll. P. subtus sulfureus, supra cinereo-olivaceus; capite sulfureo, loro et regione orbiculari nigro. Ex alpib. abyss.

*Ploceus rufocitrinus* v. Müll. P. subra castaneus; capite et collo nigro; pectore, ventre, lateribus corporis, tibialibusque castaneis; scabularibus inferioribus, abdomine et ano, tectricibus caudae inferioribus citrinis; tectricibus alarum exterioribus nigris, flavo et castaneo bimarginatis. Ex Nubia meridian.

*Ploceus sublarcatus* v. Müll. P. masc. verne: subtus luteus, facie et rostro nigro, vertice et collo anteriore brunneo luteo, nitente; dorso olivaceo, elongatis scaporum maculis umbrino viridibus; uropygio luteo. Hiene: supra laete cinereo viridis; rostro umbrino; stria supra oculari isabellina; pectore et lateribus colli umbrino-flavis; ventre et tectricibus caudae inferioribus albis. — Ex Sennaar et Nubia merid.

*Ploceus leuconotos* v. Müll. Pl. capite, collo et pectore igneo-rubro; loro, regione orbiculari et mente nigro; medio dorsi abdome que albido; remigibus et tectricibus exterioribus igneo-marginatis. Ex Abyssinia.

*Ploceus minutus* v. Müll. Pl. supra viride flavus, subtus citrinus; facie, fronte et gula nigra; nucha et lateribus colli citreo-flavis. Ex Nubia merid.

*Serinus lineatus* v. Müll. F. subra cinereo-viridis, subtus flavus, maculis scaporum nigris, capite cinereo-viridi. Ex Abyssinia et terra Cafforum.

*Fringilla Müllerii*, Baldamus. Fr. subtus citrinus, supra cinereo-viridis,

maculis scaporum umbrinis; capite, collo et regione orbiculari nigris, nucha citrina; ex Kordofan.

*Fringilla alboela*, \*) v. Müll. Masc. supra et subtus citreo-flavus, scapularibus albimarginatis; remigibus et rectricibus atro-brunneis, laete flavo-brunneis et albis marginibus; rostro nigro. Fem. supra et subtus laete viridis; remigibus cinereo-brunneis albide marginatis, rostro brunneo, basi lactiore. Ex Africa meridionali.

*Pyrenestes?* Gray, *Carpodacus Bp.*, *lacteus* v. Müll. P. isabellino-griseus; remigibus atro-castaneis; rectricibus duas intermedias exceptis, apice albo maculatis; cauda alas paula (2'') superante. Ex Abyssinia.

*Alauda rutila* v. Müll. A. supra ferruginea, subtus alba; pectore maculis rubeo-isabellinis sparso; stria supra oculari et collo albo; pinnulis polii et tectricium alarum in vexillo interiori maculo longitudinale nigro externe albo marginulato; rectricibus duabus exterioribus albis in vexillo interiori maculo longitudinali nigro, duabus sequentibus nigris, albo marginatis, caeteris castaneo-rubris. Ex. Aegypt. infer.

*Charadrius isabellinus* v. Müll. Ch. vexillo exteriori remigum primae ordinis a sexta maculo basilari albo; rectricibus quatuor exterioribus albis, tercia earum et quarta maculo longitudinali brunneo-cinereo ad scaporum latus, quinta et sexta pallidiore; cauda alis longiore. Ex Sennaar.

*Ardea ocularia* v. Müll. A. vertice et regione orbicularis nigro, regione oculari et mente albo; collo purpureo-brunneo, antice pallidiore, maculis longitudinalibus ambrinis; alis et scapularibus virido-cinereis metallicis; medio dorsi albo, cum striis lanceolatis nigris; alis subtus cinereis; tectricibus inferioribus cinnamomeis, tectricibus caudae inferioribus albis, maculis brunneis sparsis. Ex Sennaar merid.

## Bemerkungen über einige Vögel; vorzugsweise über die Fortpflanzung der *Turdus pilaris*. Linn.

Von

**Otto von Boenigk,**

Lieut. im K. Preuss. V. Jägerbataillon.

Im zweiten Hefte dieses Bandes hat uns Herr Rector Pässler aus Rosslau seine Beobachtungen über: „Abweichungen einiger Vögel im Nestbau“

\*) Wir können übrigens die Vermuthung nicht unterdrücken, dass diese auch im Berliner Museum unter dem Namen *F. euchlora*, Lichtst., aufgestellte, aber bisher noch nicht beschriebene Art vielleicht ein Albino sein dürfte.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Naumannia. Archiv für die Ornithologie,  
vorzugsweise Europas](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [1\\_4](#)

Autor(en)/Author(s): Müller John Wilhelm von

Artikel/Article: [Diagnosen der in dem ersten Bande der Beiträge zur  
Ornithologie Africas von John Wilhelm von Müller enthaltenen neuen  
Species. 27-29](#)